

## Notes bibliogràfiques

**Lista inèdita de Homópteros (Hemípteros) de Catalunya.** ASCENSIO CODINA. Boletín de la Sociedad Entomológica de España. T. III -Núms. 5-6 (Mayo-Junio), 1920, p. 100-4.—L'arranjament dels Homòpters (*Rhynchota Homoptera-Auchenorrhyncha*) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que va prodigant dades interessants especialment per a la zoogeografia generalment poc coneguda d'aquests insectes, ha motivat aquesta llista amb la finalitat de que els noms de les formes que resulten inèdites per a la nostra faunula no perdin el dret de la prioritat per a l'autor si el Catàleg general de l'ordre del Rhynchots de Catalunya que pausadament va formant-se, tardés en publicar-se.

Les formes inèdites per a Catalunya d'aquesta llista que sumen 41, i de les quines, unes 25 ho son probablement àdhuc per a la península ibèrica, són:

|  |  |
|--|--|
| B. = Barcelona. G. = Girona. Ll. = Lleyda. T. = Tarragona. |  |
| <i>Tibicina quadrisignata</i> Hag.                         | Ll. : Pobla de Segur. T. : Montsant.   |
| <i>Melampsalta picta</i> Germ.                             | Ll. : Cervera.   |
| » ( <i>Pauropsalta</i> ) <i>tibialis</i> Pnz.              | B. : La Garriga.   |
| <i>Philænus leucophthalmus biguttatus</i> F.               | G. : Setcases.   |
| » » <i>populi</i> F.                                       | B.: St. Julià de Vilatorça. G. Ent. d'Olot; Empalme. Ll. : Les (Vall d'Aran); St. Guim; Alós d'Isil (Vall d'Aneo). |
| <i>Euacanthus acuminatus</i> F.                            | Ll. : Les.   |
| <i>Idiocerus adustus</i> H. S.                             | Ll. : Les.   |
| » <i>lituratus</i> Fall.                                   | T. : Arnes.  |
| » <i>confusus</i> Fl.                                      | Ll. : Alós d'Isil.   |
| <i>Pediopsis virescens graminea</i> F.                     | T. : Arnes.  |
| » <i>Megerlei</i> Fieb.                                    | B. : Manresa.  |
| <i>Agallia sinuata</i> M. R.                               | B. : La Garriga.   |
| <i>Acocephalus albifrons</i> L.                            | Ll. : Les.   |
| <i>Selenocephalus griseus</i> F.                           | B. : Manresa.  |
| <i>Graphocrærus ventralis</i> Fall.                        | Ll. : Cervera.   |
| <i>Goniagnathus guttulinervis</i> Kbm.                     | B. : La Garriga.   |
| <i>Athysanus stactogalus</i> Fieb.                         | B. : Manresa.  |
| » <i>pallens</i> Zett.                                     | Ll. : Les.   |
| » <i>dilutus</i> Kbm.                                      | Ll. : Cervera.   |

|   |  |
|---|--|
| <i>Thamnotettix fuscovenosus</i> Ferr.  | B. : Montalegre.                         |
| » <i>dilutior</i> Kbm.                  | G. : Hostaléts de Bas.                   |
| <i>Balclutha punctata</i> Thnb.         | Catalunya.                               |
| <i>Eupteryx aurata</i> L.               | G. : Setcases. Ll. : Les.                |
| » <i>collina</i> Fl.                    | B. : Ciutat (Gràcia).                    |
| <i>Chanithus pannonicus</i> Germ.       | B. : La Garriga.                         |
| <i>Oliarus Panzeri</i> P. Löw.          | Ll. : Cervera.                           |
| <i>Hyalesthes luteipes</i> Scotti Ferr. | B. : Castelletfèls (dunes). T. : Arnes.  |
| <i>Cixius pilosus</i> Oliv.             | G. : Ent. d'Olot. Ll. : Cervera.         |
| » <i>venustus</i> Germ.                 | B. : Montserrat; St. Julià de Vilatorca. |
| » <i>Heydeni</i> Kbm.                   | B. : Montserrat. [torta.                 |
| » <i>simplex</i> H. S.                  | Ll. : La Seu d'Urgell.                   |
| <i>Tropidocephala elegans</i> O. Costa. | B. : Manresa.                            |
| <i>Stenocranus minutus</i> F.           | Ll. : Leš.                               |
| <i>Helicoptera advena</i> Spin.         | B. : St. Julià de Vilatorca.             |
| <i>Hysteropterum angulare</i> Fieb.     | T. : Arnes.                              |
| » <i>impersum</i> Fieb.                 | T. : Arnes.                              |
| » <i>fuscovenosum</i> Fieb.             | B. : Montserrat.                         |
| » <i>reticulatum</i> H. S.              | G. : Ent. d'Olot.                        |
| » <i>nervosum</i> Fieb.                 | B. : Montserrat.                         |
| <i>Tettigometra brunnea</i> Sign.       | B. : La Garriga.                         |
| » <i>picta</i> Fieb.                    | B. : Gavà. G. : Olot.                    |

Ultra les novetats citades s'ha constatat àdhuc que *Gargara genistae* F., *Grypotes puncticollis* H. S. i *Cixius pinicola* Fieb. citats tots ells de des de molt temps en la nostra literatura no consten en el catàleg de B. Oshanin «Catalog der paläarctischen Hemipteren (Heteroptera, Homoptera-Auchenorrhyncha und Psylloidea)», 1912, amb la dada zoogeogràfica de Península Pirenaica ni menys amb la de Sud d'Europa. D'entre les formes inèdites d'ara tenim que *Idiocerus confusus* Fl. és conegut per primera volta del Sud d'Europa, *Atysanus dilutus* Kbm. té una nova localitat reveladora d'una àrea zoogeogràfica més extensa puig sols és citat d'Alemanya (amb Dinamarca i Països Baixos) com *Helicoptera advena* que sols ho és de Sardenya i *Tettigometra brunnea* Sign. que ho és no més que de Sicília i d'Algèria.

El nombre de formes estudiades i determinades actualment d'*Homoptera - Auchenorrhyncha* arriba a 94; totes es conserven en el Museu. L'únic document bibliogràfic en forma de Catàleg que conservem a Catalunya, es el «Catálogo de los Insectos de Catalunya», 1879, p. 83 - 6, d'En Manuel Martorell i Penya on s'en contenen fins 66 formes. En aqueix catàleg, p. 84, veig citat *Dictyophora pannonica* Creutz. que probablement és el *Chanithus pannonicus* Germ. de la meua llista. Desgraciadament en les col·leccions de dit Sr. no hi ha cap exemplar d'aquesta espècie per a acla-

rir-ho. Altres dades es troben disseminades en les llistes del Sr. Cuni o en els treballs més especials sobre Hemípters dels Srs. I. Bolívar i C. Chichote qual bibliografia es puntualitza.

La cassa intensiva d'aquests elegants insectes està donant els millors resultats i les novetats es continuen, de fairsó que un'altra llista inèdita parella ja és començada i no ha de tardar en publicar-se. La col·laboració intel·ligent i entusiasta del especialista Dr. V. Lallemand m'ha sigut d'un gran socors. — (*Anàlisi de l'autor*).

**Observaciones sobre la procedencia española de muchos apidos descritos por Pérez en «Espèces nouvelles de melliferes de Barbarie.»** José M.<sup>a</sup> DUSMET. Boletín de la R. Sociedad Española de Historia Natural. T. XX—Núms. 5-6 (Mayo-Junio) 1920, p. 168-9. —L'autor, l'intel·ligent himenopteròleg aragonés i estimat company que es distingeix en l'estudi dels Apíds (*Apidae*) ibèrics i amb l'exquisida companyia del qual he fet profitoses excursions entomològiques pel Pireneu gironí, romp una justa llança en favor del dret de prioritat zoogeogràfica catalana per a 26 d'entre les 267 espècies d'Apíds descrites en dit treball per l'il·lustre Prof. Jean Pérez de Burdeos com a *Diagnoses préliminaires*, anc que advertint, de pas, que posteriorment indicarà les localitats i altres dades en un treball més extens que no es creu s'hagi publicat. El Sr. Dusmet presum que en quant a 26 espècies, en menys, van ésser descrites sobre exemplars de Catalunya; i com que *Barbarie* o Barbaria, com éll molt atinadament apunta, és nom genèric que es refereix al Nord d'Àfrica, resulta un embull i cal desfer l'equivoc, que fa pensar involuntàriament en la coneguda frase: «Àfrica comença en els Pireneus» essent nosaltres, doncs, els primers africans. Fonamenta dit senyor la seva presumció en que Pérez estava de molts anys en relacions científiques amb els nostres excel·lents exploradors de Catalunya En Pere Antiga i En Josep M.<sup>a</sup> Bofill i Pichot. L'últim publicà en 1904-5 el fascicle XIX Fam. *Apidae* del Catàleg de Insectes de Catalunya que va repartir-se com encaix del nostre BUTLLETÍ i trobem que 26 de les espècies preliminarment descrites per Pérez en la seva obra són a Catalunya i, d'elles, tres dedicades a l'Antiga. No és doncs versemblant, diu el Sr. Dusmet, que li dediqués espècies trobades a l'Àfrica, sinó que eren catalanes i li semblen masses les 26 per a trobar-se en ambdues localitats.

En treballs més recents de J. D. Alfbien (*Beitrag zur Kenntniss der Bienenfauna von Algerien*. Mem. S. E. Belg. Bruxelles, 1914) i de Edw. Saunders (*Hymenoptera aculeata collected in Argelia by Eaton and Morrice*. Trans. Entom. Soc. London, 1908) es citen d'Argèlia 11 espècies descrites per Pérez com de Barbaria, que es troben àdhuc a Catalunya. Les altres 15 espècies, descrites en 1895, es troben com també les 11 an-