

URGINEA UNDULATA (Desf.) Steinh.

Especie nueva para el Continente europeo

por

CARLOS PAU

Explorando las cercanías de Alginet (Valencia) D. Federico Moroder, en compañía de D. Eduardo Boscá, el año 1911, porque la cosa data de algunos años, descubrieron una planta, de la cual me comunicaron cebollas con hojas, que me pareció especie nueva para la Península; pero, como se me remitió sin flores ni cápsulas no se podía asegurar si correspondía a la *Urginea undulata* como indicaban sus características hojas. Volvieron varias veces y varios años los hermanos Moroder a la localidad citada en busca de cápsulas, para conocer las semillas que caracterizan al género, y jamás pudieron descubrir la más insignificante muestra.

El año 1912 me procuraron un centenar de cebollas que todavía cultivo y el día 26 de Agosto de este año he logrado ver florido un sólo pie, que es el estudiado. Recientemente, el amigo Emilio me manda de Alcira varios pies en fruto, lo que aumenta su área y nos proporciona materiales de comprobación, y con lo que va a resultar, una especie frecuente en Valencia, y quizás en Alicante y Murcia. Seguramente, por la tardía floración pasó desapercibida.

Las hojas aparecen apenas maduran las cápsulas; y perfectamente desarrolladas, reproducen exactamente la estampa de Desfontaines; pero, el dibujo de las cápsulas, como es sabido, no corresponde a la *undulata*; si bien la descripción de la *Fl. Atlant.* I. p. 300: «Capsula obtusa, triangularis» conviene a la *undulata*, pero no a la figurada en la estampa 88.

Desfontaines (1. c.) da la parte media de las lacinias perigoneales «intensius coloratis»; que otros autores traducen por «una línea rojiza en el nervio dorsal». Nuestro único ejemplar valenciano, que logramos observar en flor, carecía de tal coloración. El color de sus lacinias

era uniforme, lilacino; y solamente el angosto nervio dorsal era verde; y estas lacinias se presentaban en todas las flores observadas, arqueadas y reflejas como en el Lirio Martagón.

Considerando esta forma diferente del tipo africano, habrá que darle un nombre nuevo; y proponemos el de *caeculi* (Urgínea del ciegucecito), ya que una tremenda desgracia privó de la vista a su descubridor, D. Federico Moroder. Sírvale, así sea de bien triste consuelo este epitafio, que su amigo Pau ofrece a su memoria científica.

En Alcira se encuentra asociada con las *Scilla intermedia* y *Sc. autumnalis* las que acabo de recibir en flor. La *intermedia* la descubrí en esta localidad entre las varias plantas que traje para cultivarlas. Fué indicada por primera vez en Cartagena; y se trata de una especie nueva igualmente para la Europa continental. Será probable la existencia en España de la *Urgínea fugax*.

Segorbe, 19 de Octubre de 1916.

SCOTODIPNUS CATALANES

por

RICHARDO ZARIQUIEY

En Agosto de 1915 cogimos en el Montseny el primer *Scotodipnus* y en Septiembre del mismo año el segundo en Vallgorguina. El primero estaba debajo de una piedra, no demasiado grande, en las inmediaciones de la riera de Gualba (cerca de Santa Fe) y el segundo en detritus de hojas junto a la carretera de San Celoni a Arenys de Mar, en las cercanías de Vallgorguina.

Animados por el encuentro de estos dos *Scotodipnus* y estimulado nuestro amor propio por una carta del Sr. Bolivar en la que nos decía a ver si conseguíamos encontrar el *Scot. Ganglbaueri*, que desde que Breit encontró cuatro ejemplares en el Tibidabo en 1907 y que