

Lo *Coccytes Glandarius*, L. a Catalunya

(Nota ornitológica)

En lo mes d'abril de l'any 1909, se presentaren en les montanyes vehines del poble de Santa Coloma de Gramanet, uns aucells de bastant tamany y que per llur crit estrident y característich, prompte n'hagueren esment els guardes dels vedats d'aquella encontrada. Un d'ells me comunicá la presència de dits aucells, encomanatlí me'n cassés un pera poguer identificar l'especie. Després d'algun temps m'enviaren un mascle del *Coccytes glandarius* L. cassat en lo vedat del turó del Pollo.

Enterat de les costums parassitaries de dit aucell y de la diversitat de criteris que sobre les meteixes han mantingut gran nombre de ornitolechs, decidí comensar mes observacions y heus aquí els datos que puguí recullir:

En la segona quinzena d'abril, se presentaren alguns individus dels *Coccytes glandarius*, L. coincidint llur aparició ab l'época que nien les garces, molt abundoses en aquell terme, principalment en les oliveres y bosch baix. Els *Coccytes* prengueren aquella regió per hostatje, sens dupte pera cumplir la suprema lley de la reproducció. Aquesta suposició no tardá gayre en confirmarse, puig al destruir alguns nius de garces s'hi trovaren en tres d'ells y a cada un, dos ous mes petits que'ls altres, resultant esser de l'aucell en qüestió. Mes tard me portáren un exemplar jove de *Coccytes* que encar no havia abandonat lo niu, tenint les plumes caudals tot just sortides y les del vertex negres ab l'extremitat blanca (caracter que no he vist en cap de les descripcions del aucell jove).

Aquesta troballa me posá de manifest la reproducció del *Coccytes* en la població vehina; essent de remarcar l'haverse repetit sa aparició en la primavera del següent any y darrerament en 1911 també ne vegerem alguns exemplars.

L'incubació dels ous d'aquesta au per les garces, fou observada primerament pel naturalista alemany Miég. Brehm conta que en son viatge per Espanya, li fou comunicada també aques-

ta nova a Madrid, per un expert observador relacionat ab els naturalistes de aleshores la qual nova ell creya inèdita.

Aquest parassitisme del *Coccystes* no sol s'extén a les garces, se citen també altres espècies de corvits, entre elles la garsa de mauritania (*Pica mauritànica*, Malh.) la garsa blava (*Cyanopica cyanea*, Pall.) y en son país originari casi tots els ous s'han trovat en nius del gènere *Corvus*.

A Catalunya sols se presenta molt rarament; Vayreda, l'observá en la província de Girona y nostre consoci D. Lluís Soler ne prepará un exemplar cassat a Gavá, causant gran extranyesa entre'ls cassadors del terme. Aquest exemplar se trova avuy en la colecció de nostre ornitolech y benvolgut consoci D. Emili Tarré.

En les regions meridionals d'Espanya hi es mes frequent contantse entre les aus de cria anual.

IGNASI DE SAGARRA.

Abril 1912.

Fauna ictiològica de Catalunya

Catàlech rahonat dels peixos observats
en el litoral y en les aygues dolces catalanes

PER

AGUSTÍ M.^a GIBERT

(Continuació)

Género, THYNNUS.

Thynnus Thunnina, CBp.

Syn.: *Thynnus thunnina*, Günth., Canestr., Cuv. et Valenc.,
Thynnus Leachianus, Riss.; *Scomber Commersonii*, Riss.

Nom vulgar: Arbecona, Tarragona; Tunyina, Barcelona;
Albecora, Costa de Llevant; Bacorete, Goles de l'Ebre.