

es citada per en Barceló y Combis en son «Catálogo metódico de los peces de Baleares», ahont se l' hi dona el nom de *gata-moixa*.

El Sr. Romani (A.) presenta alguns reptils cassats per ell á Capellades, que determinats per el Sr. Zulueta resultan esser la *Rinechis scalaris* Bonap. y *Cœlopeltis Monspesulanus* Bonap. sobre les quals fa algunas observacions.

Y no haguenthi res més per tractar, s' aixeca la sessió á les 11 y 35 minuts.

---

## COMUNICACIONS

---

### CONTRIBUTIONS Á LA FAUNE MALACOLOGIQUE DE LA CATALOGNE

PAR

P. FAGOT

En 1884 (Annal. Malac. p. 169-194) nous avons donné le compte rendu de notre excursion dans la vallée de la Noguera Pallaresa et au Montserrat.

En 1887 nous avons publié dans la «Crónica Científica» de Barcelone le resultat de nos recherches dans la Vall d'Arán. A ce sujet nous croyons devoir faire observer que cette région appartient géographiquement et au point de vue de la repartition des espèces au versant français, quoiqu'il depende administrativement de la Catalogne.

Dans le courant du mois d'Août 1891, désirant continuer dans cette province si intéressante nos recherches conchyliologiques, nous avons à l'avance projeté une excursion que nous avons effectué dans l'ordre suivant.

Partis le 19 de l'Hospitalet, vallée de l'Ariège, le dernier village français, nous avons franchi le col de San Jan pour atteindre Soldeu, Encamp et Andorra, n'ayant rien trouvé dans cette partie si pittoresque.

Le 20 nous avons parcouru la route d'Andorra à la Seu

d' Urgell, par Sant Juliá de Loria, vallée de la Valira et dans cette dernière localité nous avons été assez heureux pour retrouver la plupart des mollusques cités par le regretté Bourguignat ainsi que quelques autres que nous ferons connaître.

A la Seu d'Urgell la Valira se reunit à la Segre. Nous avons descendu le cours de ce fleuve jusqu' à Oliana en traversant le magnifique défilé d'Organyá, riche au point de vue des espèces, ainsi que le village de Nargó et le col de ce nom.

Le 22 d'Oliana à Tuxent par Sant Just et Sant Pastor, Cambrils, le col de Cambrils, Llinás et la Collada d'Ares. Nous arrivons à Tuxent le 22 au soir dans la vallée de la Vansa.

Le 23 Dimanche nous prenons un jour de repos à Tuxent et nous en profitons pour effectuer quelques recherches dans les environs de ce gros bourg.

Le 24 de Tuxent á Josa et nous allons parcourir la Serra de Cadí faisant l' ascension du Puig de la Canal Baridana, où le thermomètre marquait seulement 5° á 11<sup>h</sup> du matin, redescendant au col de Tanca-la-Porta, la Font del Faig, et Greixa.

Le 25 de Greixa à Bourgmadame par le col de Jous, le sommet du Padró des Cuatre Batlles (alt. 2.690 m. point culminant de la *serra*, temp. 7° á 3<sup>h</sup> du soir), Alp et Bourgmadame.

Les seules personnes qui à notre connaissance ont exploré cette région sont Bourguignat (Moll. de Sant Juliá de Loria) et Coronado père et fils au mois d'Août 1860, de Nargó á la Seu d' Urgell (Excursión malacológica efectuada por los doctores D. Francisco Javier Coronado y Ruipérez y D. Francisco de Asís Coronado y Balus, in. «Crónica Científica» et tir. à part, 7 p., 1891).

## I. DESCRIPTION D'ESPÈCES NOUVELLES

### HELIX ORGANIACA

Testa supra depressa subtus convexa, umbilicata (umbilicus parvus, infundibuliformis) parum nitida, sub-opaca, corneo

cinerea, superne costis albis sinuosis eleganter ornata, inferne minus costulata;—apice sub-prominulo, lævigato, corneo, fulvo;—anfractibus  $5 \frac{1}{2}$  lente ac regulariter crescentibus, sutura maxime impressa separatis ultimo quod altinet majore ad aperturam sub carinato ac subito maxime inflexo; apertura obliqua sub-rotundata; peristomate acuto; marginibus aproximatis fere continuis, margine columellari ad umbilicum reflexo.

Alt. 7.) diam. 15—Alt. apert. 5 millim.

Calcaires du défilé d'Organyá, vallée de la Segre (altitude de 550<sup>m</sup> environ).

Coquille presque plane en dessus, plus concave en dessous, pourvue d'un ombilic mediocre en forme d'entonnoir, peu brillante sub-opaque couleur de corne cendrée ornée à sa partie supérieure de côtes blanches onduleuses, moins costulée à sa partie inférieure, sommet peu proeminent, lisse corne fauve; 5 tours  $\frac{1}{2}$  subconvexes à croissance lente et régulière à l'exception du dernier qui est relativement plus grand, sub-carené au voisinage de l'ouverture et brusquement incliné; ouverture oblique presque ronde à péristome tranchant et à bords très convergents, le bord columellaire étant réfléchi vers l'ombilic.

Nouvelle espèce du groupe de l'*Helix Oreina* voisine des *Helix Ripacurcica* Bofill de Las Escalas de Sopeira (863 m) et *Montsicci* Bofill du Portell du Montsech (800 m) et près du village de Blancafort (450 m) mais très distincte ainsi qu'on peut s'en convaincre par la lecture des diagnoses (1).

(Continuará)

(1) Contrib. faune malac. Catalogne, in. Bull. Soc. Malac. Franç., t. 3, p. 194, 1886; et loc. cit. p. 276, t. 7, 1890.