

Les aletes nedadores són entre vermellores i groguenques.

La *C* és espatulada i composta de 14 radis.

Les *P* són grans, punxegudes, en forma de vela llatina i compostes de 13 radis. Són d'una coloració groguenca.

Hàbitat: Sempre es troba als forats que deixen les grans pedres.  
Crida l'atenció la lentitud dels seus moviments.

## II

### Aus capturades a Menorca i que no figuren al «Catàleg» d'HERNÁNDEZ PONSETÍ

*Milvus niger*, 1911.

*Turdus aureus*, gener 1911.

*Hydrochelidon hybrida*, abril 1912.

*Pratincola rubetra* KOCK, maig 1912.

*Thalassidroma pelagica* SELBYEHNI, juny 1912.

*Oxilophus grandarius* DEGL. et GERBE. Un ♂, en poder del mestre de Sant Climent.

*Emberiza citrinella* L., gener 1914.

*Curruca conspicillata*, desembre 1913.

*Larus minutus*, gener 1914.

*Hirundo rustica*, completament blanc (cas d'albinisme). Trobat en un niu, Creu d'En Ramis, estiu 1914.

*Regulus ignicapillus*, octubre 1916.

*Colymbus glacialis*, gener 1916.

*Muscicapa nigra*

*Puffinus arcticus*

*Sterna anglica*

*Emberiza cinclus* L.

*Ciconia alba*. Albufera, maig 1919.

*Trichodroma muralis*, novembre 1920.

*Hoematopus ostralegus* L., abril 1921.

*Palidna cinclus*, *Palidna torquata*, abril 1921.

*Sula bassana* BRISS. Murella Nou, 8-II-1929. Un altre exemplar a Capifort, pocs dies després.

*Vultur monachus*, novembre 1929.

*Egretta gazzetta*, 1932.

La totalitat, o gairebé la totalitat dels exemplars esmentats es conserven al Museu d'Història Natural de l'Ateneu de Maó.