

ta nova a Madrit, per un expert observador relacionat ab els naturalistes de aleshores la qual nova ell creya inedita.

Aquest parassitisme del *Coccyzus* no sol s'extén a les garses, se citen també altres especies de corvits, entre elles la garsa de mauritania (*Pica mauritanica*, Malh.) la garsa blava (*Cyanopica cyanea*, Pall.) y en son pais originari casi tots els ous s'han trovat en nius del genre *Corvus*.

A Catalunya sols se presenta molt rarament; Vayreda, l'observá en la provincia de Girona y nostre consoci D. Lluís Soler ne prepará un exemplar cassat a Gavá, causant gran extranyesa entre'ls cassadors del terme. Aquest exemplar se trova avuy en la colecció de nostre ornitolech y benvolgut consoci D. Emili Tarré.

En les regions meridionals d'Espanya hi es mes frequent tantantse entre les aus de cria anual.

Abril 1912.

IGNASI DE SAGARRA.

Fauna ictiológica de Catalunya

Catálech rahonat dels peixos observats
en el litoral y en les aygues dolces catalanes

PER

AGUSTÍ M.^a GIBERT

(Continuació)

Género, THYNNUS.

Thynnus Thunnina, CBp.

Syn.: *Thynnus thunnina*, Günth., Canestr., Cuv. et Valenc.,
Thynnus Leachianus, Riss.; *Scomber Commersonii*, Riss.

Nom vulgar: Arbecona, Tarragona; Tunyina, Barcelona;
Albecora, Costa de Llevant; Bacorete, Goles de l'Ebre.

Thynnus thynnus, Günth.

Syn.: *Thynnus vulgaris*, CBp., Canestr., Cuv. et Valenc., Guichen.; *Thynnus mediterraneus*, Riss.; *Scomber thynnus*, Lacep., Riss., Bonnat., Linn., Bloch, Brunn.; *Thynnus*, Duham., Bell.

Nom vulgar: Tunyina, Barcelona, Tarragona.

A les petites o de cria, vulgarment se les coneix ab el nom de Golfàs.

En l'almadrava del cap del terme, Hospitalet-Atmetlla (Tarragona), pèl Maig se'n pesquen moltes de 1 kilogram de pes y pèl Septembre escassament de mitg kilogram; aixó á part de la matansa que segons les anyades, com en l'almadrava de Rosas, se'n fà de molt més grosses: llevades de 200, 300 y 600.

Thynnus alalonga, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Orcynus alalonga*, Riss.; *Orcynus alalonga*, CBp., Canestr., Günth.; *Scomber alalonga*, Riss., Bonnat.; *Scomber germo*, Lacep.; *Germon*, Duham.; *Alilangh*, Duham.; *Alalungha*, Cetti.

Nom vulgar: Zanja, Goles de l'Ebre.

Especie molt rara, nova per Catalunya. Abunda més vers les aygues de Ponent y de l'Estret.

Género, PELAMYS.

Pelamis sarda, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Pelamis sarda*, Guichen., Willugh., CBp., Günth., Canestr.; *Thynnus sardus*, Riss.; *Thynnus pelamis*, Riss., Brunn.; *Scomber mediterraneus*, Del.; *Scomber sarda*, Lacep., Riss., Bloch, Rosenthal.; *Pelamis*, Salvian., Bell.

Nom vulgar: Bonitu, Barcelona, Taragona; Bonitol, Menorca.

A darrers d'Agost y á primers de Setembre se'n pesquen moltíssims á l'art.

Sub-família dels Carangini.

Género, TRACHURUS, Cuv.

Trachurus Trachurus, Günth.

Syn.: *Caranx trachurus*, CBp., Schlegel, Lacep., Riss.; *Trachurus trachurus*, Canestr.; *Scomber trachurus*, Bonnat., Linn., Bloch, Brunn.; *Trachurus*, Rond., Bell., Salvian., Willugh., Gesner.

Nom vulgar: Surell, Surelló el petit, Tarragona, Barcelona, Menorca.

Abunda molt. El Surell pescat al bou te 0'40 m. o 0'50 m. de llarch.

Género, CARANX, Cuv.

Caranx suareus, Riss.

Syn.: *Caranx suareus*, Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Surella, Tarragona.

Especie nova per Catalunya. En Febrer y Mars de 1911 se'n pescaren moltes en les aygues de la part occidental de Catalunya.

Sub-família dels Centronotini.

Género, NAUCRATES, Rafin.

Naucrates ductor, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Naucratus ductor*, CBp., Günth., Canestr., Guichen.; *Nancratus fanfarus*, Rafin., *Centronatus conductor*, Lacep., Riss., *Gasterosteus ductor*, Bonnat., Linn., Brunn.; *Scomber ductor*, Bloch.

Nom vulgar: Bairó, Tarragona; Pampol, Barcelona, Menorca; Biró, Costa de Llevant.

Aquest petit peix, gufa y fidel company del tauró, segueix als barcos de navegació d'altura y al arribar a port embesteix com esmaperdut a les platges y fins se deixa agafar ab les mans.

Género, LICHIA, Cuv.

Lichia glaucus, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Lichia glauca*, Günth., Canestr.; *Lichia glaucus*, CBp., *Lichia glaycos*, Riss.; *Centronatus glaycos*, Riss.; *Caranx glaucus*, Lacep.; *Glaucus* (Derbio), Rond.

Nom vulgar: Palomida, Tarragona; Columida, Barcelona; Palomida, Palomina. Menorca.

Lichia amia, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Lichia amia*, Guichen., Agass., CBp., Günth., Canestr.; *Lichia lysan*, Lacep., Riss.; *Centronotus vadigo*, Lacep., *Caranx amia*, Lacep., *Scomber amia*, Linn.; *Amia*, Salvian.; *Lampuga*, Bell.

Nom vulgar: Palomida, Tarragona; Colomida, Barcelona; Palomida, Surell de penya, Menorca.

Lichia vadigo, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Centronotus vadigo*, Riss.; *Lichia vadigo*, Riss., CBp., Günth., Canestr.; *Centronotus glaycos*, Lacep.

Nom vulgar: Lexola, Tarragona; Lexa, Costa de Llevant.

Especie no citada en cap Catálech de peixos de Catalunya.

A vegades se'n agafen moltes a palangra.

Género, SERIOLA, Cuv.

Seriola Dumerilii, Riss.

Syn.: *Seriola Dumerilii*, Günth., CBp., Canestr., Cuv. et Valenc., Guichen.; *Caranx Dumerilii*, Riss.

Nom vulgar: Verderol, Tarragona; Sirvia, Sirviola, Verderol, Menorca.

Género, TEMNODON, Cuv. et Valenc.

Temnodon saltator, Cuv.

Syn.: *Scomber plumbeus*, Mitchill; *Gasterosteus saltatrix*, Linn., Bonnat.; *Pomatomus*, Skib, Lacep.; *Cheilodipterus hep-*

tacanthus, Lacep.; *Saltatrix*, Catesby.; *Temnodon saltator*, Valenc., S. Berthel, Guichen., Nordm., CBp., Günth., Verrany., Steindachn., Canestr., Brit. Capel., Giglion., Perugia.

Nom vulgar. Tsernia. Tarragona.

Especie nova per Catalunya.

En pocs dies de diferencia (Agost 1910) en la pescateria de Tarragona, ne vegerem dos exemplars pescats a les xarxes, que pesaven quiscun 15 kilograms.

Sub-familia dels Zeini.

Género, ZEUS, Arted.

Zeus faber, Linn.

Syn.: *Zeus faber*, Bloch, Rosenthal., Agass., CBp., Günth., Schlegel., Canestr., Bonnat., Lacep., Riss., Cuv. et Valenc., Guichen.

Nom vulgar: Gall, Barcelona, Tarragona; Gall de St. Pere, Menorca.



Zeus pungio, Cuv. et Valenc

Syn.: *Zeus pungio*, CBp., Günth., Guichen,

Nom vulgar: Gall, Tarragona.

Especie nova per Catalunya.

Pescat a l'art, en 10 de Juny de 1911, n'adquirirem un bell exemplar.

Sub-família dels Caprini.

Gènere, CAPROS, Lacep.

Capros aper, Lacep.

Syn.: *Capros aper*, CBp., Günth., Canestr., Riss., Guichen.; *Perca pusilla*, Brunn.; *Zeus aper*. Linn.; *Aper Rondeletii*, Willugh.

Nom vulgar: Gallet, Barcelona; Xavo, Tarragona.

Sub-família dels LAMPRINI.

Gènere, LAMPRIS, Retzius.

Lampris guttatus, Retzius.

Syn.: *Lampris luna*, Günth., Canestr.; *Lampris lauta*, Lowe; *Chrysotosus Luna*, Lacep., Riss.; *Lampris guttatus*, Cuv. et Valenc., CBp., Schleg.

Nom vulgar: Llampuga, Tarragona. Espècie rara y nova per Catalunya. Abunda mes en aygues de les Mallorques.

Sub-família dels BRAMINI.

Gènere, BRAMA, Schneid.

Brama Raii, Schneid.

Syn.: *Sparus castaneola*, Lacep., Riss.; *Brama Raii*, Riss., Bloch, Rosenthal, CBp., Günth., Canestr.; *Sparus brama*, Bonnat; *Brama marina cauda forcipata*, Willugh.

Nom vulgar: Castanyola, Barcelona, Tarragona.

Peix de fonera abundant, que se de pescarse a fons fixo d'aygues, ni mes ni menys. Desapareix o emigra una llarga sèrie d'anyades y retorna després altra vegada. Dintre la seva massa muscular, quasi en tots ells hi viu un tricocefal tal volta nou: verm nematodes en forma de petita carabassa vinatera, llarch de 0'07, m., glutinos y de color blanch-groch de canari.

Sub-família dels CENTROLOPHINI.

Género, CENTROLOPHUS.

Centrolophus pompilus, CBp.

Syn.: *Centrolophus morio*, Cuv. et Valenc.; *Centrolophus niger*, CBp., Lacep.; *Centrolophus pompilus*, Günth., Canestr., Guichen., Cuv. et Valenc.; *Centrolophus pompilius*, Riss.; *Pompilus*, Couch, Rond.; *Coryphæna pompilus*, Lacep., Riss., Linn.; Serrá de Provença, Duham.

Nom vulgar: Trotilu, peix de brom, Barcelona; Negret, Negritu, Tarragona.

S'en agafen pel Mars y Abril barrejats entre les moles de surell.

Género, STROMATEUS.

Stromateus Fiatola, Linn.

Syn.: *Chrysostromus fiatoloides*, Lacep.; *Stromateus fiatola*, Lacep., Riss., Cuv. et Valenc., Guichen., Bonnat., CBp., Günth., Canestr.; *Hepatus*, Gesner; *Stromateus*, Rond., Gesner, Aldrov., Willugh.; *Fiatola*, Rond., Gesner; *Callichthys*, Bell.

Nom vulgar: Palomida, Barcelona, Tarragona.

Stromateus Microchirus, Günth.

Syn.: *Fietola fasciata*, Riss.; *Seserinus microbirus*, Cuv. et Valenc.; *Seserinus Rondeletii*, Cuv. et Valenc., Cuv.; *Stromateus microchirus*, CBp., Canestr.; *Centrolophus microchirus*, Bonelli; *Seserinus*, Rond., Gesner.

Nom vulgar: Pampul pudent, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

Sub-família dels CORYPHÆNINI.

Género, CORYPHÆNA.

Coryphæna hippurus, Riss.

Syn.: *Coryphæna pelágica*, CBp., Günth., Canestr., Riss.; *Lampugus pelagicus*, Cuv. et Valenc.; *Coryphæna hippurus*,

Lacep., Riss., Cuv. et Valenc., Guichen., Linn., Bloch, CBp., Günth., Canestr.; *Equiselis*, Rond.

Nom vulgar: Doradu, Tarragona; Llempuga, Menorca.

Sub-família dels Xipheini.

Género, XIPHIAS.

Xiphias gladius, Linn.

Syn.: *Xiphias gladius*, Cuv. et Valenc., Guichen., Lacep., Bloch, Rosenthal., CBp., Günth., Schleg., Canestr.; *Xiphias piscis*, Willugh.; *Xiphias*, Bell.; *Gladius*, Salvian.

Nom vulgar: Peix espasa, Tarragona; Emperador, peix espasa, Menorca.

Sub-família dels Echeneini.

Género, ECHENEIS, Arted.

Echeneis remora, Linn.

Syn.: *Remora*, Couch., Yarr., Rond., Aldrov.; *Echeneis remora*; Lacep., Riss., Bonnat., Bloch, Rafin., Cuv., Rosenthal., Costa, CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Pegas, Tarragona; Rémora, Barcelona.

Les serps y els aucells

Es cosa ben comprovada y qué cap naturalista posa ya en dupte, qué si per casualitat un aucell se trova en presencia d'una serp, l'aucell, com si's sentís possehit d'una forsa irresistible que l'atragués cap a la serp, s'hi acosta poch a poch, tot piulant y saltant de branca en branca o a petites voladetes, fins que per a la fi acaba per ser presa de las seves dents. Lo poble ignorant, aficionat de sí a lo meravellós, creu que la serp té la propietat de xuclar l'aucell de la mateixa manera que lo