INCERTES

tipus 1 A 1

tipus 2 A 1

2 A 2

tipus 3 A 1

ALFONS I

Catalunya

1 A 1

2 A 1

3 A 1

Provença

4 A 1

5 A 1

4/6 A 1

6 A 1

7 A 1

Aragò

8 A 1

9 A 1

PERE I

Catalunya

10 A 1

11 A 1

Provença

12 A 1

12 B 1

13 A 1

Aragó

14 A 1

15 A 1

JAUME I

Catalunya

16 A 1

16 B 1

17 A 1

17 B 1

18 A 1

19 A 1

20 A 1

21 A 1

Valencia

22 A 1

23 A 1

24 A 1

Provença

25 B 1

26 A 1

Aragó

27 A 1

28 A 1

LÀMINA XXXIV. COMTALS I REIALS

RAMON BERENGUER V de PROVENÇA

29 A 1

30 B 1

Les monedes d'un nou temps :

JAUME I

1 GROS

PERE II

2 PIRRAL

4 PIRRAL D'OR

3 GRANAT

SECCION III

EL COEFICIENTE ENTRE EL NUMERO DE EJEMPLARES Y EL NUMERO DE CUÑOS; ALCANCE DE SU CONTENIDO DE INFORMACION ESTADISTICA

por Francisco Javier Mora Mas

INDICE

1. Introducción y finalidad
2. Fundamento analítico
3. Efecto de la antigüedad
4. Contenido estadístico del coeficiente
5. Algunas aplicaciones ilustrativas

ANEXOS

1. Probabilidad que en una muestra resulte un determinado valor para el coeficiente ejemplares por cuño.
2. Tablas I/VII.- Campo de variación del "coeficiente ejemplares porcuño". "r"; número original de cuños, $n = 5, 10, 15, 20, 25, 30$ y 40 .
3. Valor límite inferior del "coeficiente" para estimar que todos los cuños se hallan presentes en la muestra.
4. Referencias y notas.

* * *

1. INTRODUCCION Y FINALIDAD

Entre los estudios numismáticos que interesan sobre cualquier 'tesorillo' de monedas antiguas figura la tarea de distinguir la impronta de los diversos cuños, de anverso y de reverso, que se emplearon en la respectiva acuñación; casi sistemáticamente se procede al análisis y a la catalogación de los distintos cuños que se han manifestado en el hallazgo

Las monedas del hallazgo que son ejemplares de una misma acuñación se agrupan y, como si fuera una característica propia del 'tesorillo', se establece el valor de un indicador denominado 'coeficiente de ejemplares por cuño' (Villaronga); este 'coeficiente' es el coeficiente que resulta de dividir el número de ejemplares por el número de cuños distintos manifestados en aquéllos. Para designar el 'coeficiente' otros autores han empleado nom-

A : VECTOR DE "C-1" EJEMPLARES

B : VECTOR DE "C" EJEMP

1) $a(d-1) \times (1 - \frac{d-1}{n})$

2) $a(d-1) \times (1 - \frac{d-1}{n})$

3) $a(d) \times (\frac{d}{n})$

4) $a(d) \times (1 - \frac{d}{n})$

$$b(d) = a(d-1) \times (1 - \frac{d-1}{n}) + a(d) \times \frac{d}{n}$$

n : nro. original de cuñas

Figura n° 1

bres equivalentes, tales como 'relación' ('relationship specimens-dies', Crawford; 'ratio coins-dies', Lyon) y 'valor índice' ('index figure', Robinson).

Obsérvese que el 'coeficiente ejemplares por cuños' es un valor que tiene parte de variabilidad aleatoria, debido a que la manifestación de un cuño concreto cualquiera en la muestra (conjunto de ejemplares en el hallazgo) está supeditado a las múltiples circunstancias del azar y también a la limitación del volumen de la muestra; sin embargo, el 'coeficiente' contiene también cierta parte de determinismo, pues es evidente que la menor o mayor cantidad de cuños originales empleados en la acuñación influye en la proporción de los distintos cuños identificados en el hallazgo; por lo tanto, ciertos valores del 'coeficiente' serán más probables que otros.

La finalidad de la presente comunicación es la de analizar el alcance determinístico del contenido de la información estadística del 'coeficiente' para su adecuada utilización.

2. FUNDAMENTO ANALITICO

La posibilidad de llevar a cabo el análisis es concomitante con la posibilidad de simular la formación aleatoria de las muestras, según el azar natural, y el consiguiente estudio de la variación probabilística del 'coeficiente'. Sin embargo, el análisis y la composición apriorística del fenómeno no nos permite obtener la matemática que proporciona directamente el resultado final de una larga simulación. Podemos decir que el fundamento analítico de este trabajo se basa en la "simulación matemática apriorística".

El procedimiento de simulación matemática de la formación de las muestras se presentó en una comunicación anterior (ref. n°1) y resuelve el problema para toda acuñación y muestreo realizado bajo condiciones normales; consiste en ajustar adecuadamente un proceso estocástico markoviano. Recordamos que las condiciones normales aludidas son:

1) Que con cada cuño se haya acuñado una cantidad de monedas sensiblemente igual, 2) que la cantidad de monedas por cuño sea muy grande, y 3) que la formación de la muestra haya sido hecha al azar.

En la fig. 1 se representa en la parte superior el vector 'A' de los elementos de la probabilidad total correspondiente a una muestra de 'c-1' ejemplares, cada elemento de probabilidad 'a(d)' nos da el valor de la probabilidad de que en la muestra haya 'd' cuños distintos; debajo se halla el vector 'B' correspondiente a la muestra con 'c' ejemplares, o sea con uno más que en el anterior. Mediante flechas se muestra cómo se divide un elemento de probabilidad del vector 'A', al añadir al azar otra moneda a la muestra, véase la clave 's' de la figura, y cómo luego se componen estas divisiones para pasar a constituir los elementos de probabilidad del vector 'B', véase la clave 't'. Este mecanismo nos permite establecer una fórmula para el cálculo de la probabilidad de que nos resulte un determinado valor para el 'coeficiente', a partir de las probabilidades de la estructura de la muestra inmediata inferior en número de ejemplares; la fórmula se detalla en el anexo n°1. Así, pues, a partir de la muestra más pequeña, constituida por un sólo ejemplar, donde el único elemento de probabilidad es del 100 % para 1 cuño (los demás elementos son nulos), se puede calcular progresivamente los elementos de probabilidad de todo vector correspondiente a cualquier tamaño de muestra.

Con la aplicación de este procedimiento ha sido posible la preparación de las tablas que se muestran en el anexo n°2; cada tabla corresponde a un número 'n' que representa a la cantidad original de cuños empleados por la

ceca, y nos resume la actuación estadística del 'coeficiente' mediante tres valores para cada tamaño 'c' de la muestra:

r_{inf} : valor límite inferior,

r_{max} : valor más probable, y

r_{sup} : valor límite superior

Los valores límite se han establecido bajo la condición de que los eventuales otros valores más distanciados (por debajo del valor límite inferior o por encima del valor límite superior) no alcancen la suma de probabilidad del 5 % en cada extremo.

Por ejemplo, en el caso de suponer que la ceca haya empleado 40 cuños originales en la acuñación (véase la tabla del anexo nº2.7) y que la muestra contenga 20 monedas, se tiene la siguiente variación para el 'coeficiente':

- valor límite inferior, $r_{inf} = 20/18 = 1,111$

- valor más probable, $r_{max} = 20/16 = 1,250$

- valor límite superior, $r_{sup} = 20/13 = 1,538$

Concretamente, para este caso se tienen las siguientes probabilidades:

- $\text{prob} (r=r_{max}) = 26,73 \%$

- $\text{prob} (r_{inf} \leq r \leq r_{sup}) = 95,76 \%$

- $\text{prob} (r \geq r_{inf}) = 1,18 \%$

- $\text{prob} (r \leq r_{sup}) = 3,06 \%$

Con lo que se ha explicado tenemos resuelto el problema de determinar el campo de variación del 'coeficiente ejemplares por cuño', bajo supuesto de conocer el número total de los cuños originales empleados en la acuñación.

3. EFECTO DE LA ANTIGUEDAD

Cuando los ejemplares de una acuñación se lanzan a la circulación, no se hallan precisamente bajo unas constantes condiciones de conservación, como cuando las monedas se hallan guardadas en un museo; en la circulación ordinaria la misión de cada moneda es facilitar el desarrollo económico con la ampliación de las posibilidades de las transacciones comerciales. Esta misión implica la iterativa transferencia de los ejemplares de unas manos a otras, en representación de una transferencia de valor.

La acumulación del repetido cambio de mano de las monedas, que no poseen características selectivas, origina fenómenos aleatorios varios entre los que se pueden citar:

1. La pérdida de peso, o desgaste de los ejemplares,
2. La tendencia a la distribución aleatoria uniforme de los ejemplares en la zona de circulación, y
3. La eliminación o pérdida de ejemplares.

El desgaste provoca evidentemente una disminución de peso en cada moneda; cada disminución aislada es inapreciable, pero una vez acumuladas pueden sumar diferencias de peso detectables. La pérdida de peso del ejemplar es una variable aleatoria que depende, también, de la intensidad de la cir-

culación acumulada sobre el mismo ejemplar. Como consecuencia se tiene, al cabo de un tiempo, una disminución en el peso medio de los ejemplares del colectivo y un aumento de la dispersión del peso del ejemplar tomado al azar; ambas modificaciones paramétricas son tanto más significativas cuanto más prolongado haya sido el tiempo de circulación monetaria acumulado.

La circulación aleatoria natural de las monedas es semejante al movimiento browniano de las partículas físicas y origina una tendencia a la distribución uniforme en toda una zona socio-económica, de manera, que todo cuño original tiene igual probabilidad que otro de la misma acuñación de identificarse en cualquier punto de la zona. Cabe, sin embargo, la disminución progresiva de la densidad de ejemplares por localidad o punto de la zona debido a la tendencia permanente de la ampliación de los límites de la zona, y de la aparición de nuevas acuñaciones; pero esta circunstancia no modifica la tendencia a la uniformidad del contenido aleatorio. Así, pues, el conjunto de monedas de una localidad, un lote cualquiera, cada fracción tomada al azar, etc. constituyen muestras aleatorias sujetas a la distribución uniforme original.

La pérdida de ejemplares a lo largo del tiempo, bajo la consideración de la hipótesis de no selectividad, no modifica la mencionada tendencia a la uniformidad; simplemente, cada extravío da lugar a una disminución de la densidad del número de ejemplares en el lugar correspondiente; este efecto se suma al de la ampliación de la zona circulatoria.

En conclusión, decimos que no corresponde la utilización simple del "coeficiente" observado en los hallazgos de monedas para situar la antigüedad de la formación de los mismos. En todo caso caben correlaciones indirectas debidas a otras causas.

4. CONTENIDO ESTADÍSTICO DEL "COEFICIENTE".

La estructura estadística de todo hallazgo de monedas antiguas, supuesto formado bajo las condiciones de normalidad, constituye simplemente un "punto estadístico" tomado al azar del volumen original de la emisión, independiente del tiempo que haya transcurrido. Así pues, la estructura estadística formada por los cuños en la muestra depende sólo de dos parámetros: 1) del número "n" de cuños originales empleados en la acuñación y 2) del número "c" de ejemplares que componen la muestra, hallazgo o tesorillo.

La información que proporciona la propia muestra disminuye con la disminución del número de ejemplares, tanto es así que cuando la muestra se reduce a un solo ejemplar la información sobre otras posibilidades es nula; en efecto no se puede hacer ninguna otra previsión con relación a otros posibles cuños.

Estimamos que se pueden iniciar investigaciones estadísticas con vaga precisión en los resultados cuando la muestra se compone de 5 a 10 ejemplares y se pueden dar resultados bastante preciso cuando se supera el mínimo de 10 ejemplares en la muestra.

Cuando el "coeficiente" vale la unidad y la muestra contiene más de un ejemplar tenemos cierto indeterminismo que nos dice que es muy probable la existencia de más cuños, pero no nos concreta sobre cual es la cantidad más probable.

Cuando el "coeficiente" vale 6 o un número más grande se puede afirmar que prácticamente todos los cuños originales se hallan presentes en la

COEFICIENTE "Y"
EJEM. / CUÑO

200

150

100

50

NUMERO DE EJEMPLARES EN LA MUESTRA, "C"

Figura n° 2

muestra. En el anexo n°3 se expone el razonamiento de esta regla aproximadamente.

La misma regla sirve para determinar el inicio de la significatividad de los resultados de las investigaciones según sea el tamaño de la muestra; en efecto, cuando el número de ejemplares se halla comprendido entre 6 o 10, se inicia la posibilidad apriorística de que el coeficiente varíe entre 1 y 6.

En la figura n°2 se muestra gráficamente la variación del "coeficiente" con el volumen de la muestra para dos acuñaciones: 1) $n = 20$ cuños, y 2) $n = 40$ cuños; los valores han sido tomados de las correspondientes tablas del anexo n°2 y la discontinuidad de la variación ha sido sustituida por líneas continuas aproximadas. Ambas líneas continuas representan los valores límite, inferior y superior, que como máximo excluye el 5% en cada extremo de los posibles valores más distanciados, por debajo o por encima del respectivo límite. De la observación de la figura resulta lo siguiente:

1) La amplitud de la variación del "coeficiente" según el tamaño de la muestra, determina una zona de aspecto fusiforme; cuando el número de ejemplares de la muestra es del mismo orden de magnitud que el número de cuños originales, la amplitud viene a ser máxima.

2) Cuando el tamaño de la muestra crece, después de duplicar el número de cuños originales, aproximadamente, la zona de variación tiende a convertirse en una línea asintótica a la recta que pasa por el origen, según la ecuación $r = c/n$. Cuando el "coeficiente" supera el valor 4 su contenido es prácticamente determinístico.

3) Cuando el "coeficiente" se halla comprendido entre 2 y 4, se puede utilizar el mismo para estimar el número original de cuños introduciendo pequeñas modificaciones.

4) Los "coeficientes" comprendidos entre 1,250 y 2,000 son muy imprecisos para que de ellos se hagan deducciones directas para el número original de cuños; en estos casos es necesario recurrir a procedimientos estadísticos más exhaustivos.

5) Los valores comprendidos entre 1,000 y 1,250 corresponden generalmente a casos de muestras pobres en ejemplares, generalmente con menos de 10 monedas; la problemática de estos casos ya ha sido señalada. Sin embargo, si la muestra rebasa el número de 10 ejemplares, el "coeficiente" nos dice que el número de cuños originales empleados por la ceca fué muy grande.

5. ALGUNAS APLICACIONES ILUSTRATIVAS

Veamos ahora la aplicación de las anteriores reglas para la utilización del "coeficiente ejemplares por cuño" con dos ejemplos concretos. Ambos se refieren a hallazgos de monedas antiguas cuyos datos se hallan en trabajos numismáticos ya publicados.

Primero nos referimos a la publicación "En torno a un hallazgo de denarios de Beligio" (referencia n°2), de donde proceden los datos de la siguiente tabla:

		<u>"c"</u>	<u>"d"</u>	<u>"r"</u>
1.1)	denarios Beligio I , anverso	22	12	1,833
	idem. , reverso	"	11	2,000
1.2)	denarios Beligio II , anverso	55	8	6,875
	idem. , reverso	"	7	7,857
1.3)	denarios Beligio III , anverso	143	8	17,875
	idem. , reverso	"	12	11,917
1.4)	denarios Bolscan I , anverso	4	4	1,000
	idem. , reverso	"	4	1,000
1.5)	denarios Bols. II-III, anverso	9	9	1,000
	idem. , reverso	"	9	1,000
1.6)	den. Bols. III (Granada), anv.	149	63	2,365
	idem. , rev.	"	61	2,443

Las acuñaciones n°s 1,2) y 1,3) muestran valores altos para el coeficiente, lo cual hace suponer que todos los cuños originales se hallan presentes en las muestras.

Por el contrario, las muestras n°s 1,4) y 1,5) son de escaso volumen, el valor del coeficiente no puede ser utilizado para hacer previsiones; pero nos dice que el número de cuños originales puede ser muy grande.

De las muestras n°s 1.1) y 1.6) se pueden hacer estimaciones bastante precisa sobre el número original de cuños recurriendo a procedimientos estadísticos apropiados (ref. n°1).

Obsérvase como las conclusiones para los hallazgos n°s 1.4) y 1.5) se confirman, en cierta manera, con el hallazgo n°1.6). La ceca Bolscan debió ser más importante que la ceca Beligio.

La segunda aplicación se refiere a unas monedas de bronce ibéricas aparecidas en Azaila (Teruel); los datos han sido extraídos del trabajo "Tesoros de Azaila" (ref. n°3), los cuales se resumen en la siguiente tabla;

<u>ref.</u>	<u>Ceca</u>	<u>"c"</u>	<u>"d"</u>	<u>"r"</u>
2.01)	CELSE	224	55	4,074
2.02)	ILDUCOITE	13	6	2,167
2.03)	ARCEDURGI	23	6	3,833
2.04)	SETEISCEN	48	22	2,182
2.05)	LAGINE	33	21	1,517
2.06)	SALDUIE	32	21	1,424
2.07)	OTOBESCEN	5	3	1,667
2.08)	BEIIGIOM	60	47	1,277
2.09)	ILTIRDA	101	74	1,365
2.10)	SECAISA	17	14	1,214
2.11)	OROSI	6	5	1,200
2.12)	BILBILIS	10	9	1,111
2.13)	BOLSCAN	28	26	1,077
2.14)	TERGACOM	1	1	1,000
2.15)	CONTEBACOM	10	6	1,667
2.16)	ALAUN	1	1	1,000

De las acuñaciones 2.14 y 2.16 no se pueden hacer estimaciones alguna sobre el número original de cuños.

En los casos n°s 2.07), y 2.11), 2.12) y 2.15) nos hallamos con escasos números de ejemplares y las previsiones con relacion al número original de cuños son muy vagas. Por ejemplo se puede decir que el valor del coeficiente 1,111 para la ceca BILBILIS significa que el número original de cuños empleados fué muy grande.

Para la ceca BOLSCAN, con ref. n°2.13), con número de ejemplares ya significativo, se puede estimar con más propiedad, con un número elevados de cuños originales, del orden de uno o dos centenares. Similar ocurre con la ref. n°2.10).

Para las acuñaciones n°s 2.05), 2.06), 2.08) y 2.09) se pueden hacer estimaciones bastante precisas sobre el número original de cuños empleados procedimientos estadísticos adecuados; por ejemplo, mediante la simulación estocástica de la formación de las muestras, bajo supuestos previos.

Para los casos n°s 2.01), 2.02), 2.03), y 2.04), con coeficientes comprendidos practicamente entre 2,000 y 4,000, se puede hacer una deducción bastante directa del número original de cuños, considerando que se debe añadir un 10% más sobre el número de los identificados.

* * *

Se da por finalizado este trabajo más propio de un análisis estadístico que de una investigación numismática, pero ha sido enfocado especialmente para que sea de utilidad a tales investigadores. Se hace un ruego a los es-

pecialistas numismáticos para que sepan disculpar las posibles impropiedades técnicas que se puedan haber deslizado. Este trabajo quiere ser una colaboración en el intento de extraer el determinismo de la presentación aleatoria de los acontecimientos numismáticos.

Sociedad Española de Investigación,
Estadística e Informática

Barcelona

PROBABILIDAD DE QUE EN UNA MUESTRA RESULTE UN DETERMINADO VALOR PARA EL COEFICIENTE EJEMPLARES POR CUÑO.

Nomenclatura:

- n : número total de cuños originales de la acuñación,
 c : número de ejemplares, monedas, que constituyen la muestra,
 d : número de cuños distintos presentes en la misma muestra,
 r : coeficiente ejemplares por cuño,
 $r(c,d) = c/d$,
 $p_n(c/d)$: probabilidad de que se presente el valor c/d para el coeficiente.

La probabilidad del coeficiente " $r(c,d)$ ", se puede calcular a partir de las probabilidades de los coeficientes:

$$"r(c-1,d-1)" \quad \text{y} \quad "r(c-1,d)"$$

mediante la fórmula (véase la fig. nº 1 del texto y la referencia nº 1):

$$p_n(c/d) = \left(1 - \frac{d-1}{n}\right) \cdot p_n\left(\frac{c-1}{d-1}\right) + \left(\frac{d}{n}\right) \cdot p_n\left(\frac{c-1}{d}\right)$$

El vector de probabilidades de la muestra de un solo ejemplar tiene un solo elemento de probabilidad al 100% (los demás elementos son nulos), o sea: $p_n(1/1) = 1$

Con la aplicación iterativa de la fórmula al vector de la muestra de tamaño $c=1$, se puede calcular la probabilidad de todo valor posible para el coeficiente. Recordamos la siguiente condición: $1 \leq d \leq n$.

Tabla I.- CAMPO DE VARIACION DEL "COEFICIENTE EJEMPLARES POR CUÑO", "r"; NUMERO ORIGINAL DE CUNOS, n = 5.

C : número de ejemplares de la muestra.

C	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}
1	1,000	1,000	1,000
2	1,000	1,000	2,000
3	1,000	1,500	3,000
4	1,000	1,333	2,000
5	1,250	1,667	2,500
6	1,200	1,500	2,000
7	1,400	1,750	2,333
8	1,600	2,000	2,667
9	1,800	2,250	3,000
10	2,000	2,000	3,333
11	2,200	2,200	2,750
12	2,400	2,400	3,000
13	2,600	2,600	3,250
14	2,800	2,800	3,500
15	3,000	3,000	3,750
16	3,200	3,200	4,000
17	3,400	3,400	4,250
18	3,600	3,600	4,500
19	3,800	3,800	4,750
20	4,000	4,000	5,000
21	4,200	4,200	4,200
22	4,400	4,400	4,400
..			
resto:	$r = c/5$		

Tabla II.- CAMPO DE VARIACION DEL "COEFICIENTE EJEMPLARES POR CUÑO", "r"; NUMERO ORIGINAL DE CUÑOS, n = 10.

c : número de ejemplares de la muestra.

c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}	c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}
1	1,000	1,000	1,000	22	2,200	2,444	2,750
2	1,000	1,000	2,000	24	2,400	2,667	3,000
3	1,000	1,000	1,500	26	2,600	2,600	3,250
4	1,000	1,000	2,000	28	2,800	2,800	3,500
5	1,000	1,250	1,667	30	3,000	3,000	3,750
6	1,000	1,200	2,000	35	3,500	3,500	3,889
7	1,000	1,400	1,750	40	4,000	4,000	4,444
8	1,143	1,333	2,000	45	4,500	4,500	5,000
9	1,125	1,500	1,800	50	5,000	5,000	5,556
10	1,250	1,429	2,000	55	5,500	5,500	5,500
12	1,333	1,714	2,000	60	6,000	6,000	6,000
14	1,556	1,750	2,333	..			
16	1,600	2,000	2,286	resto:			
18	1,800	2,000	2,571	r = c/10			
20	2,000	2,222	2,857				

Tabla III.- CAMPO DE VARIACION DEL "COEFICIENTE EJEMPLARES POR CUÑO", "r"; NUMERO ORIGINAL DE CUÑOS, n = 15.

c : número de ejemplares de la muestra.

c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}	c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}
1	1,000	1,000	1,000	35	2,333	2,500	2,917
2	1,000	1,000	2,000	40	2,667	2,857	3,077
3	1,000	1,000	1,500	45	3,000	3,000	3,462
4	1,000	1,000	1,333	50	3,333	3,333	4,167
5	1,000	1,000	1,667	55	3,667	3,667	3,929
6	1,000	1,200	1,500	60	4,000	4,000	4,286
7	1,000	1,167	1,750	65	4,333	4,333	4,643
8	1,000	1,333	1,600	70	4,667	4,667	5,000
9	1,125	1,286	1,800	75	5,000	5,000	5,357
10	1,111	1,250	1,667	80	5,333	5,333	5,714
12	1,200	1,500	1,714	85	5,667	5,667	5,667
14	1,273	1,556	2,000	90	6,000	6,000	6,000
16	1,333	1,600	2,000	..			
18	1,385	1,636	2,000	resto:			
20	1,538	1,818	2,222	$r = c/15$			
22	1,571	1,833	2,200				
24	1,714	2,000	2,400				
26	1,857	2,000	2,364				
28	1,867	2,154	2,545				
30	2,000	2,308	2,727				

Tabla V.- CAMPO DE VARIACION DEL "COEFICIENTE EJEMPLARES POR CUNO", "r"; NUMERO ORIGINAL DE CUNOS n = 25 .- -

C : número de ejemplares de la muestra.

c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}	c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}
1	1,000	1,000	1,000	60	2,400	2,609	2,857
2	1,000	1,000	1,000	65	2,600	2,826	3,095
3	1,000	1,000	1,500	70	2,800	2,917	3,182
4	1,000	1,000	1,333	75	3,000	3,125	3,409
5	1,000	1,000	1,250	80	3,200	3,333	3,636
6	1,000	1,000	1,500	85	3,400	3,400	3,696
7	1,000	1,167	1,400	90	3,600	3,600	3,913
8	1,000	1,143	1,333	95	3,800	3,800	4,130
9	1,000	1,125	1,500	100	4,000	4,000	4,348
10	1,000	1,111	1,429	110	4,400	4,400	4,583
12	1,091	1,200	1,500	120	4,800	4,800	5,000
14	1,077	1,273	1,556	130	5,200	5,200	5,417
16	1,143	1,333	1,600	140	5,600	5,600	5,833
18	1,200	1,385	1,636	150	6,000	6,000	6,250
20	1,250	1,429	1,667	160	6,400	6,400	6,400
22	1,294	1,467	1,833	..			
24	1,333	1,500	1,846				
26	1,368	1,625	1,857				
28	1,400	1,647	2,000				
30	1,500	1,667	2,000				
35	1,591	1,842	2,188				
40	1,739	2,000	2,222				
45	1,957	2,143	2,368				
50	2,083	2,273	2,632				
55	2,292	2,391	2,750				

resto: $r = c/25$

Tabla IV.- CAMPO DE VARIACION DEL "COEFICIENTE EJEMPLARES POR CUÑO", "r"; NUMERO ORIGINAL DE CUÑOS, n = 20. - - -

c : número de ejemplares de la muestra.

c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}	c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}
1	1,000	1,000	1,000	35	1,842	2,059	2,500
2	1,000	1,000	1,000	40	2,105	2,222	2,667
3	1,000	1,000	1,500	45	2,250	2,500	2,813
4	1,000	1,000	1,333	50	2,500	2,632	2,941
5	1,000	1,000	1,667	55	2,750	2,895	3,235
6	1,000	1,200	1,500	60	3,000	3,158	3,333
7	1,000	1,167	1,400	65	3,250	3,250	3,611
8	1,000	1,143	1,600	70	3,500	3,500	3,889
9	1,000	1,125	1,500	75	3,750	3,750	4,167
10	1,000	1,250	1,667	80	4,000	4,000	4,211
12	1,091	1,333	1,714	85	4,250	4,250	4,474
14	1,167	1,400	1,750	90	4,500	4,500	4,737
16	1,231	1,455	1,778	95	4,750	4,750	5,000
18	1,286	1,500	1,800	100	5,000	5,000	5,263
20	1,333	1,538	1,818	105	5,250	5,250	5,526
22	1,375	1,571	2,000	110	5,500	5,500	5,789
24	1,500	1,714	2,000	115	5,750	5,750	6,053
26	1,529	1,733	2,167	120	6,000	6,000	6,000
28	1,556	1,867	2,157	..			
30	1,667	1,875	2,308	resto :	r = c/20		

Tabla VI.- CAMPO DE VARIACION DEL "COEFICIENTE EJEMPLARES POR CUÑO", "r"; numero original de cuños n = 30. - - - -

c : número de ejemplares de la muestra

c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}	c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}
1	1,000	1,000	1,000	60	2,143	2,308	2,609
2	1,000	1,000	1,000	65	2,241	2,321	2,708
3	1,000	1,000	1,500	70	2,414	2,500	2,800
4	1,000	1,000	1,333	75	2,500	2,679	3,000
5	1,000	1,000	1,250	80	2,667	2,857	3,077
6	1,000	1,000	1,500	85	2,833	2,931	3,269
7	1,000	1,000	1,400	90	3,000	3,103	3,333
8	1,000	1,143	1,333	95	3,167	3,276	3,519
9	1,000	1,125	1,500	100	3,333	3,448	3,704
10	1,000	1,111	1,429	110	3,667	3,667	3,929
12	1,000	1,200	1,500	120	4,000	4,000	4,286
14	1,077	1,273	1,556	130	4,333	4,333	4,483
16	1,067	1,231	1,600	140	4,667	4,667	4,828
18	1,125	1,286	1,636	150	5,000	5,000	5,172
20	1,176	1,333	1,667	160	5,333	5,333	5,517
22	1,222	1,375	1,692	170	5,667	5,667	5,862
24	1,263	1,412	1,714	180	6,000	6,000	6,207
26	1,300	1,444	1,733	190	6,333	6,333	6,333
28	1,333	1,556	1,750	..			
30	1,364	1,579	1,875				
35	1,458	1,667	1,944				
40	1,600	1,818	2,105				
45	1,731	1,875	2,143				
50	1,852	2,000	2,273				
55	1,964	2,200	2,391				
				resto: r = c/30			

Tabla VII.- CAMPO DE VARIACION DEL "COEFICIENTE EJEMPLARES POR CUÑO", "r"; NUMERO ORIGINAL DE CUÑOS n = 40. - - -

c : número de ejemplares de la muestra

c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}	c	r _{inf}	r _{max}	r _{sup}
1	1,000	1,000	1,000	85	2,237	2,361	2,656
2	1,000	1,000	1,000	90	2,368	2,500	2,727
3	1,000	1,000	1,500	95	2,436	2,568	2,794
4	1,000	1,000	1,333	100	2,564	2,703	2,941
5	1,000	1,000	1,250	110	2,750	2,895	3,143
6	1,000	1,000	1,200	120	3,000	3,158	3,333
7	1,000	1,000	1,400	130	3,250	3,333	3,514
8	1,000	1,000	1,333	140	3,500	3,590	3,784
9	1,000	1,125	1,286	150	3,750	3,846	4,054
10	1,000	1,111	1,429	160	4,000	4,000	4,211
12	1,000	1,091	1,333	170	4,250	4,250	4,474
14	1,000	1,167	1,400	180	4,500	4,500	4,737
16	1,067	1,231	1,455	190	4,750	4,750	4,872
18	1,059	1,200	1,500	200	5,000	5,000	5,128
20	1,111	1,250	1,538	210	5,250	5,250	5,385
22	1,100	1,294	1,467	220	5,500	5,500	5,641
24	1,143	1,333	1,500	230	5,750	5,750	5,897
26	1,182	1,368	1,625	240	6,000	6,000	6,154
28	1,217	1,400	1,647	250	6,250	6,250	6,410
30	1,250	1,429	1,667	260	6,500	6,500	6,667
35	1,296	1,459	1,750	270	6,750	6,750	6,750
40	1,373	1,600	1,818	..			
45	1,500	1,667	1,875				
50	1,563	1,724	2,000				
55	1,667	1,833	2,037				
60	1,765	1,935	2,143				
65	1,857	2,031	2,241				
70	1,944	2,121	2,333				
75	2,027	2,206	2,419				
80	2,105	2,286	2,500				

resto: r = c/40

VALOR LIMITE INFERIOR DEL "COEFICIENTE" PARA ESTIMAR QUE
 TODOS LOS CUÑOS SE HALLAN PRESENTES EN LA MUESTRA.

Nomenclatura:

- n : número original de cuños en la acuñación,
 c : número de ejemplares (monedas) en la muestra,
 d : número de cuños distintos presentes en la muestra,
 r : coeficiente ejemplares por cuña, $r = c/d$.

Probabilidad de que un cuño concreto de la acuñación no se
 halle presente ni una sólo vez en el lote de c monedas:

$$P_{c,1}(1\text{-ausente}) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^c$$

Probabilidad de que uno cualquiera de los cuños de la acu-
 ñación quede ausente en la muestra; es la suma de la anterior
 probabilidad considerando todos los cuños:

$$P_{c,n}(1\text{-ausente}) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^c \cdot n$$

Para establecer un límite inferior de presencia de todos los
 cuños consideramos que la anterior probabilidad es inferior
 al 5%; lo cual será el error máximo que podemos cometer en
 nuestra afirmación:

$$n \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^c \leq 0,05$$

o bien:

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{d \cdot r} \leq 0,05/n$$

En los casos que nos afecta el número d tiende a acercarse
 al valor n por lo que se puede efectuar la siguiente susti-
 tución:

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n \cdot r} \leq 0,05/n$$

o bien:

$$r \cdot \log_e \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \leq \log_e(0,05/n)$$

de donde, con suficiente aproximación, resulta:

$$-r \leq \log_e(0,05/n)$$

o bien:

$$r \geq 3,00 + \log_e(n)$$

Para tamaños de acuñación de 5 a 100 cuños originales por acuñación, el valor límite inferior para el coeficiente resulta según la tabla:

<u>n</u>	<u>r</u>	<u>n</u>	<u>r</u>
5	4,61	40	6,69
10	5,30	60	7,09
20	6,00	100	7,61

Para el ámbito de las investigaciones que se desarrollen sobre tesorillos de monedas antiguas, donde el número de cuños es relativamente limitado, se puede considerar que cuando el "coeficiente ejemplares por cuño" alcanza el valor 6 prácticamente todos los cuños originales se hallan presentes en la muestra:

$r_{\text{límite inferior presencia cuños}} = 6$
--

De esta regla se desprende que las investigaciones estadísticas son más consistentes cuando el tamaño de la muestra da la oportunidad apriorística de que el valor del "coeficiente" varíe desde 1, como mínimo, hasta 6, por lo menos; lo cual ocurre cuando el volumen de la muestra rebasa la zona de 6 a 10 ejemplares.

Referencias:

1. MORA MAS, F-J., "Estimación del número de cuños que se emplearon en una acuñación, según el número de cuños distintos aparecidos en los hallazgos de monedas antiguas", Acta Numismatica, 1977, VII, pp. 13-28.
2. VILLARONGA, L., "En torno a un hallazgo de denarios de Beligio", 'Ampurias', 1968, tomo XXX, pp. 225 - 236.
3. VILLARONGA, L., "Los Tesoros de Azaila y la circulación monetaria en el valle del Ebro", Barcelona, 1977.

Notas:

1. Los cálculos de las probabilidades para las tablas del anexo n°2 han sido realizados mediante calculadora programable "Hewlett-Packard-67", con programa preparado expresamente para esta comunicación.