

---

**SESSIONS DE PREPARACIÓ PER A  
L'OLIMPIADA MATEMÀTICA**

---



**2000**









---

SESSIONS DE PREPARACIÓ PER A  
L'OLIMPIADA MATEMÀTICA

---



© 2000, dels autors dels articles

Editat per la Societat Catalana de Matemàtiques  
(filial de l'Institut d'Estudis Catalans)  
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Primera edició: octubre de 2000  
Tiratge: 300 exemplars

Imprès a gama, s. l.  
Carrer d'Aristides Maillol, 5, 1r. 08028 Barcelona

ISBN: 84-7283-530-8  
Dipòsit Legal: B. 43080-2000

Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del *copyright*, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment i suport, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec comercial, la inclusió total o parcial en bases de dades i la consulta a través de xarxa telemàtica o d'Internet. Les infraccions d'aquests drets estan sotmeses a les sancions establertes per les lleis.

## ÍNDEX

Presentació . . . . .	5
Guanyadors del curs 1999-2000 . . . . .	7
Nota sobre la part històrica . . . . .	11
Problemes de les Olimpíades I a XXXVI . . . . .	13
Geometria, <i>Sebastià Xambó Descamps</i> . . . . .	163
Aritmètica, <i>Griselda Pascual Xufré</i> . . . . .	211
Anàlisi Combinatòria, <i>Josep Pla Carrera</i> . . . . .	245
El principi de les caselles, <i>Josep Pla Carrera</i> . . . . .	261
Probabilitat, <i>Josep Pla Carrera</i> . . . . .	269
Problemes de Probabilitat, <i>Jordi Dou Mas de Xezàs</i> . . . . .	287
Polinomis, <i>Lluís Bibiloni Matos, Pelegrí Viader Canals</i> . . . . .	293
Nombres complexos, <i>Cristóbal Sánchez Rubio</i> . . . . .	309
Recurrències, <i>Josep M. Brunat Blay</i> . . . . .	339
Desigualtats, <i>Ignasi Mundet Riera</i> . . . . .	365
Desigualtats geomètriques, <i>Miquel Amengual Coves</i> . . . . .	377
Disseccions geomètriques, <i>Joan Trias Pairó</i> . . . . .	401
Equacions funcionals, <i>Claudi Alsina Català</i> . . . . .	419
Jocs i Invariants, <i>Sergi Elizalde Torrent</i> . . . . .	435
El poder de la geometria analítica, <i>Francisco Bellot Rosado</i> . . . . .	453
Problemas diversos, <i>Francisco Bellot Rosado</i> . . . . .	471
Referències bibliogràfiques . . . . .	495
Índex de guanyadors . . . . .	497





# Guanyadors del curs 1999-2000

## XXXVI Olimpíada Matemàtica

### Primera Fase (Catalunya)

#### Primers premis

Jordi Rius Pascual

IES Antoni Torrajo (Cervera)

Regina Lladó

Lycée Français (Barcelona)

Miquel Olib Eixot

École Européenne des Pyrénées (Barcelona)

#### Segons premis

Xavier Martínez Palau

IES Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat)

Juanjo Riol Pérez

IES Sant Jordi (Gara (Lleida))

Juan Alzany Fies

École Européenne (Barcelona)

## Presentació i agraïments

Aquest llibret ha arribat a una nova edició, la vuitena, i com cada any, ha estat ampliat i renovat. Els capítols *El poder de la geometria analítica* i *Problemes diversos* són nous i han estat escrits per Francisco Bellot (Valladolid); el capítol *Jocs i invariants* també és nou i es deu a Sergi Elizalde; i el capítol *Probabilitats* ha estat esmenat i ampliat. S'han inclòs alguns problemes de probabilitat proposats o resolts per Jordi Dou i apareguts a la revista *CRUX MATHEMATICORUM*; les solucions que es presenten són les originals que l'autor va enviar a la revista i s'hi afageixen alguns comentaris dels editors de *CRUX*. Valgui com a primer petit homenatge d'aquesta publicació al gran problemista Jordi Dou Mas de Xexàs.

De la part històrica ens manquen encara els guanyadors de dos anys. Els problemes de la primera fase de l'Olimpíada XI s'han modificat, ja que els hem pogut comparar amb originals que fins ara no teníem. També s'han corregit errors detectats en edicions anteriors.

Els capítols són propietat dels corresponents autors i tots ells n'han fet una gratuïta cessió d'ús a la Societat Catalana de Matemàtiques.

Les sessions de preparació compten amb la participació d'alguns autors i d'altres professors a Barcelona, Girona, La Garriga, Lleida, Manresa, Tarragona i Vilanova i la Geltrú.

En nom de la SCM vull deixar constància pública de l'agraïment de la Societat, al qual hi afageixo el meu propi, envers els autors i totes les persones i institucions que fan possibles aquest llibre i les sessions.

Josep Grané



# Guanyadors del curs 1999-2000

## XXXVI Olimpíada Matemàtica

### Primera Fase (Catalunya)

#### Primers premis

Jordi Rius Pascual	IES Antoni Torroja (Cervera)
Stephan Lesaffre	Lycée Français (Barcelona)
Miquel Oliu Barton	Aula Escola Europea (Barcelona)

#### Segons premis

Xavier Martínez Palau	IES Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat)
Juanjo Rué Perna	IES Samuel Gili i Gaya (Lleida)
Joan Alemany Flos	Aula Escola Europea (Barcelona)

#### Tercers premis

Fabrice Lesaffre	Lycée Français (Barcelona)
------------------	----------------------------

### Segona Fase (Espanya), medalles d'or

1	Carlos Gómez Rodríguez	(Santiago de Compostela)
2	Luis Emilio García Martínez	(València)
3	Alberto Suárez Real	(Salinas, Asturias)
4	José María Cantarero López	(Ronda, Málaga)
5	Manuel Pérez Molina	(Alacant)
6	Roberto Rubio Núñez	(València)

## 41st International Mathematical Olympiad (Taejon, Corea del Sud)

Concursants amb puntuació màxima de 42 punts sobre 42 (de 451 presentats):

Bulgaria, 1:	Alexandr Usnich
Xina, 1:	Zhiwei Yun
Rússia, 2:	Alexei Poiarkov, Alexandre Gaifoulline

El concursant espanyol José María Cantarero va obtenir menció honorífica.

Resultats dels concursants espanyols a la XV Olimpíada Matemàtica Iberoamericana, celebrada a Caracas, Venezuela: Alberto Suárez, José M. Cantarero i Luis Emilio García, medalles de plata; Carlos Gómez, medalla de bronze.



Si coneixeu altres edicions d'aquest llibre, podreu observar que la part que anomenem "històrica" i que conté els enunciats de problemes d'Olimpiades passades, ha anat augmentant d'any en any.

En aquesta edició, malgrat que ens falten encara algunes informacions, hem considerat oportú publicar la col·lecció completa de tots els problemes de les Olimpíades I a XXXVI en les seues primeres (Catalunya, alguns districtes de Barcelona) i segones (Espanya). També hem posat, al final de cada convocatoria, la llista dels corresponents guanyadors.

## PART HISTÒRICA

Hem omès tot allò que encara no sabem, i hem deixat, en alguns casos, les descripcions a continuació. Ens falten dos problemes de l'Olimpiada II, primera fase (1904-05), i un problema de l'Olimpiada VI, segona fase (1910-11). No sabem res sobre els autors, ni dels seus punts, de moment, uns encara són atribuïts a autors desconeguts, però que estan pendents de confirmació. Tots els altres guanyadors són els següents:

Les llistes de guanyadors són completes excepte les que corresponen a les primeres fases de les Olimpíades XVI (1979-80) i XX (1983-84). D'aquests anys no en queda cap constància a la SOJM, i així no s'ha inclòs al lloc corresponent.

La Societat Catalana de Matemàtiques demana a qualsevol persona que hagi tingut relació amb algun de les Olimpíades II, VI, XVI i XX, tant si ha estat guanyador com participant o premiador, i que en tingui informació, que s'adrexi a la Societat i li faci arribar. Aquesta sol·licitud se la extenem a tothom que tingui documents, cartes de notificació, fulls d'anuncis, etc., de qualsevol Olimpíada de la I a la XXX. La SOJM agrairà totes les informacions que l'ajudin a reconstruir els arxius de les Olimpíades.

La col·lecció d'enunciats i guanyadors que figura en aquest llibre té diverses origens. Els principals són:

- 1) La *Gaceta Matemática de la Real Sociedad Matemática Española* que publicava, cada any, les llistes de guanyadors per districtes i de la segona fase. Malgrat tot, la col·lecció s'estroçà definitivament l'any 1982, i en alguns anys encara la informació era incompleta. Els enunciats dels problemes també hi figuraven, però els tribunals locals de la primera fase podien canviar-los, i ha calgut confirmar bastants casos d'errors.
- 2) La col·lecció personal de problemes del professor Bellot, que ha permès i promogut des d'un segle la *Gaceta Matemática*. Aquests problemes, confirmats per fulls d'anuncis repartits a les proves i que s'han pogut aconseguir, han permès tenir tota la seqüència



## Nota sobre la part històrica

Si coneixeu altres edicions d'aquest llibre, podreu observar que la part que anomenem "històrica" i que conté els enunciats de problemes d'Olimpíades passades, ha anat augmentant d'any en any.

En aquesta edició, malgrat que ens falten encara algunes informacions, hem considerat oportú publicar la col·lecció completa de tots els problemes de les Olimpíades I a XXXVI en les fases primera (Catalunya, abans districte de Barcelona) i segona (Espanya). També hem posat, al final de cada convocatòria, la llista dels corresponents guanyadors.

Hem esmentat abans que encara ens queden algunes llacunes; les descrivim a continuació. Ens falten cinc problemes de l'Olimpíada II, primera fase (1964-65); i un problema de l'Olimpíada VI, primera fase (1968-69). En el lloc corresponent hi hem posat, de moment, uns enunciats que tenen alguna probabilitat de ser els correctes, però que estan pendents de confirmació. Tots ells estan marcats amb un \*.

Les llistes de guanyadors són completes *excepte* les que corresponen a les primeres fases de les Olimpíades XVI (1978-79) i XX (1983-84). D'aquests anys no en queda cap constància a la SCM, i així està indicat al lloc corresponent.

La Societat Catalana de Matemàtiques demana a qualsevol persona que hagi tingut relació amb alguna de les Olimpíades II, VI, XVI i XX, tant si ha estat guanyador com participant o professor, i que en tingui informació, que s'adreci a la Societat i li faci arribar. Aquesta sol·licitud es fa extensiva a tothom que tingui documents, cartes de notificació, fulls d'enunciats, etc., de qualsevol Olimpíada de la I a la XXX. La SCM agrairà totes les informacions que l'ajudin a reconstruir els arxius de les Olimpíades.

La col·lecció d'enunciats i guanyadors que figura en aquest llibret té diversos orígens. Els principals són:

- 1) La *Gaceta Matemática* de la *Real Sociedad Matemática Española* que publicava, cada any, les llistes de guanyadors per districtes i de la segona fase. Malgrat tot, la col·lecció s'estroncà definitivament l'any 1982, i en alguns anys anteriors la informació era incompleta. Els enunciats dels problemes també hi figuraven, però els tribunals locals de la primera fase podien canviar-los, i ha calgut confirmar bastants casos dubtosos.
- 2) La col·lecció personal de problemes del professor Bellot, que ha permès prosseguir des d'on acabà la *Gaceta Matemática*. Aquests problemes, confirmats per fulls d'enunciats repartits a les proves i que s'han pogut aconseguir, han permès tenir tots els enunciats

de la segona fase i alguns de la primera que faltaven en els anys 1978-1984. També ens ha proporcionat dades sobre la participació de concursants espanyols a les Olimpíades Internacionals i Iberoamericanes. Cal dir una vegada més que les informacions aportades per Francisco Bellot han estat cabdals des del principi de les edicions d'aquest llibre.

3) Els fulls de problemes repartits amb logotip de la Societat, conservats per Antoni Gomà, o els Fulls Informatius i Memòries de la SCM, han permès establir els enunciats de la primera fase dels anys 1985-1992. També n'han sortit noms de guanyadors, però amb les llacunes esmentades i encara no aclarides.

4) La informació continguda a les resolucions de l'actual Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio de Educación y Cultura on hi ha els noms dels estudiants que han tingut beca d'estudis olímpica, o bé premi en metallic. Aquestes dades han estat valuoses per a completar les llistes de guanyadors de determinats anys i confirmar altres fonts.

5) La informació verbal que ens ha proporcionat la professora María Gaspar Alonso-Vega, de Madrid, que va ser acompanyant dels primers equips espanyols a les Olimpíades Internacionals i Iberoamericanes. Les dades que fan referència a la participació espanyola en aquests concursos internacionals no s'han pogut incloure en aquesta edició i es farà en una propera.

6) Les informacions escrites o verbals de moltes persones que en algun moment han tingut relació amb les Olimpíades. Encara que sigui a costa d'oblidar-ne alguna, cosa de la qual en demanem disculpes, esmentem: Joan Elias García, Fernando Etayo Gordejuela, Jaume Lluís García Roig, Josep Gelonch Anyé, Fernando Herrero Buj, Santiago Manrique Catalán, Daniel Marquès Solé, Fco. Javier Martínez de Albéniz Salas, Ramon Masip Treig, Josep M. Mondelo González, Ignasi Mundet Riera, Teresa Novelle, Antoni Oliva Cuyàs, Antoni Ras Sabidó, Josep Oriol Solé Subiela, Olga Tugues, Gerald Welters Dyhdalewicz, etc.

La Societat Catalana de Matemàtiques dóna les gràcies a tothom que ha ajudat a completar aquesta petita història de les Olimpíades de matemàtiques i no dubta que podrà aconseguir, en un futur proper, les dades que li manquen.

Josep Grané



## Primera sessió

1C1. Un taverner disposa de 150 l de vi a 12 pta/l, 200 l de vi a 9 pta/l i 250 l de vi a 7 pta/l. Vol obtenir una mescla a 10 pta/l. Quants litres de mescla podrà obtenir?

1C2. Si a cada nombre complex  $z$  li fem correspondre el nombre

$$z' = 2z - 1$$

s'obté una transformació del pla en ell mateix.

- Quin és el transformat del semipla dels afixos del nombres  $z$  que tenen part real més gran que  $1/2$ ?
- Quins punts del pla es transformen en ells mateixos?
- Quines rectes del pla es transformen en elles mateixes?

1C3. a) Quatre persones guarden una caixa forta. Digueu quants panys ha de tenir la caixa, i quantes claus cada persona, per tal que tres persones qualssevol de les quatre puguin obrir la caixa i dues persones no puguin.

b) El mateix amb sis persones.

c)  $n$  persones guarden una caixa forta. Digueu quants panys ha de tenir la caixa, i quantes claus cada persona, per tal que  $a$  persones qualssevol de les  $n$  puguin obrir la caixa i  $a - 1$  persones no puguin.

1C4. Un frontó està format per dues parets verticals perpendiculars, la frontal i la lateral. A la lateral hi ha un forat  $A$  situat a una altura de 5 m i distant 7 m de la paret frontal. Un individu situat en un punt  $B$  les distàncies del qual a les parets frontal i lateral són 3 m i 6 m, llança una pilota contra la paret frontal des d'una altura de 1 m, de manera que després de rebotar penetra al forat  $A$  de la paret lateral. Es pregunta:

- Quin és l'angle que forma la trajectòria de la pilota amb la paret del frontó?
- Quina és la longitud del camí recorregut per la pilota?

1C5. Trobeu els nombres de la forma  $aa$  i  $bbcc$  tals que

$$aa = \sqrt{bbcc}.$$

1C6. Donat un triangle, traceu dues circumferències iguals tangents entre elles, una d'elles tangent als costats  $a$  i  $b$  del triangle, i l'altra tangent als costats  $a$  i  $c$ .

1C7. Trobeu els moviments del pla que transformen el conjunt de punts de coordenades enteres en ell mateix.

1C8. Donada una circumferència de centre  $O$  i radi  $r$ , i dos diàmetres perpendiculars  $AB$  i  $CD$ , trobeu els punts  $P$  de la circumferència tals que la suma de les àrees dels triangles  $APO$  i  $CPO$  sigui màxima o mínima.

## Primera sessió

**1E1.** Donada l'equació  $x^2 + ax + 1 = 0$  determineu

- L'interval on ha de prendre valors el nombre real  $a$  per tal que les arrels de l'equació siguin imaginàries.
- El lloc geomètric dels punts representatius d'aquestes arrels en la representació gràfica habitual dels nombres complexos, si  $a$  recorre l'interval trobat abans.

**1E2.** L'impost sobre el Rendiment del Treball Personal és una funció  $f(x)$  del total  $x$  de les retribucions anuals (en pessetes). Sabem que

- $f(x)$  és una funció contínua.
- La derivada  $df(x)/dx$  a l'interval  $0 \leq x < 60000$  és constant i igual a 0; a l'interval  $60000 < x < P$  és constant i igual a 1; i per  $x > P$  és constant i igual a 0.14.
- $f(0) = 0$  i  $f(140000) = 14000$ .

Determineu el valor de  $P$  i representeu gràficament la funció.

**1E3.** Es considera un polígon convex de  $n$  costats. Es tracen totes les rectes diagonals i se suposa que no n'hi ha tres de concurrents en un punt que no sigui un vèrtex, i tampoc n'hi ha dues de paral·leles. Es demana

- El nombre total de punts d'intersecció de les diagonals, excloent els vèrtexs.
- El nombre de punts anteriors que són interiors al polígon, i el nombre dels que són exteriors.

**1E4.** Donat el triangle equilàter  $ABC$  de costat  $a$  i la seva circumferència circumscrita, es considera el segment de cercle limitat per la corda  $AB$  i l'arc (de  $120^\circ$ ) dels mateixos extrems. Si tallem aquest segment circular per rectes paral·leles al costat  $BC$ , determinem sobre cada una d'elles un segment els punts del qual són interiors al segment circular esmentat. Digueu quina és la longitud màxima d'aquests segments rectilinis.

Segona sessió

**1E5.** Donat un pentàgon regular es dibuixen els cinc segments diagonals. Determineu el nombre total de triangles que apareixen a la figura i classifiqueu aquest conjunt en classes de triangles iguals (directes o inversos) entre ells.

**1E6.** Representeu gràficament la funció

$$y = \left| \left| |x - 1| - 2 \right| - 3 \right|$$

a l'interval  $-8 \leq x \leq 8$ .

**1E7.** Es considera un fitxer amb 1000 fitxes numerades ordenades en l'ordre natural. Al fitxer li apliquem l'operació següent:

*La primera fitxa és col·loca intercalada entre la penúltima i l'última. La segona fitxa es col·loca al final, de manera que la tercera queda en primer lloc.*

Observant la posició que ocupa cada una de les fitxes, demostreu que després de 1000 operacions anàlogues aplicades successivament (cada una a l'ordenació que resulta de l'operació anterior), el fitxer torna a estar en l'ordre natural.

Comproveu que no es pot obtenir el mateix resultat si es tracta d'un fitxer amb un nombre senar  $n$  de fitxes i es fan  $n$  operacions.

**1E8.** En un pla vertical es consideren els punts  $A$  i  $B$  situats sobre una recta horitzontal, i la semicircumferència d'extrems  $A$ ,  $B$  situada al semiplà inferior. Un segment de longitud  $a$  igual al diàmetre de la circumferència es mou de manera que conté sempre el punt  $A$  i un dels extrems recorre la semicircumferència donada. Determineu el valor del cosinus de l'angle que ha de formar aquest segment amb la recta horitzontal per tal que el seu punt mitjà ocupi la posició més baixa possible.

*Primera sessió*

- 2C1.** En una reunió hi ha més homes que dones, més dones que beuen que homes que fumen, i més dones que fumen i no beuen que homes que no beuen ni fumen. Demostreu que hi ha menys dones que no beuen ni fumen que homes que beuen i no fumen.
- 2C2.** Segons una norma del Codi de Circulació, la distància entre dos cotxes que van a velocitat de  $v$  Km/h ha de ser igual o superior a  $(v/10)^2$  m. Suposant que la longitud dels cotxes sigui de 4 m i la distància entre cotxes consecutius sigui la mínima possible, es vol conèixer la velocitat que dona la millor fluidesa de tràfic.
- \* **2C3.** En una corona circular, una corda de la circumferència exterior que és tangent a la circumferència interior mesura 20 cm. Calculeu l'àrea de la corona.
- \* **2C4.** L'afix d'un nombre complex  $z$  i els tres afixos de les seves arrels cúbiques formen un rombe. Trobeu  $z$ .

Segona sessió

- \* 2C5. Trobeu el grup de moviments del pla que transformen una recta donada en ella mateixa.
- \* 2C6. Demostreu que les rectes que uneixen els punts mitjans dels parells d'arestes oposades d'un tetràedre regular, es tallen.
- \* 2C7. Determineu  $a$  per tal que l'equació

$$x^3 + x^2 - x + a = 0$$

tingui una arrel que sigui mitjana aritmètica de les altres dues. En aquest cas, calculeu les tres arrels.

2C8. Dos miralls plans formen un angle  $\omega$ . Un raig de llum normal a un dels dos miralls es reflecteix alternativament en cada un dels dos miralls. Digueu quins valors pot tenir  $\omega$  per tal que en una d'aquestes reflexions el raig surti paral·lel a un mirall.

## Primera sessió

**2E1.** Un triangle equilàter inscrit en una circumferència de centre  $O$  i radi igual a 4 cm es fa girar un angle recte al voltant de  $O$ . Trobeu l'àrea de la part comuna al triangle donat i a l'obtingut en aquest gir.

**2E2.** Digueu quants nombre hi ha de tres xifres (és a dir, més grans que 99 i més petits que 1000) que tinguin la xifra central més gran que les altres dues. D'entre ells, quants n'hi ha que tinguin les tres xifres diferents?

**2E3.** Un disc microsollc gira a velocitat de  $33\frac{1}{3}$  revolucions per minut i l'audició dura 24 min 30 s. La part enregistrada té 29 cm de diàmetre exterior i 11.5 cm de diàmetre interior. Amb aquestes dades calculeu la longitud del solc enregistrat.

**2E4.** Trobeu tots els intervals de valors de  $x$  pels quals

$$\cos x + \sin x > 1.$$

Resoleu el mateix problem per

$$\cos x + |\sin x| > 1.$$

Segona sessió

**2E5.** És ben conegut que si  $p/q = r/s$ , aleshores  $p/q = (p-r)/(q-s)$ . Escrivim ara la igualtat

$$\frac{3x - b}{3x - 5b} = \frac{3a - 4b}{3a - 8b}$$

Per la propietat anterior, les dues fraccions han de iguals a

$$\frac{3x - 5b - 3a + 8b}{3x - b - 3a + 4b} = \frac{3x - 3a + 3b}{3x - 3a + 3b} = 1$$

mentre que les primeres són, en general, diferents de la unitat. Expliqueu clarament el perquè d'aquest resultat.

**2E6.** Es construeix amb filferro un triangle equilàter de costat  $l$  i es col·loca sobre una esfera de radi  $r$  que no passa a través del triangle. Digueu a quina distància del centre de l'esfera queden els vèrtexs del triangle.

**2E7.** Un tronc de con de revolució té la base gran de radi  $r$  i les generatrius formen amb el pla de la base un angle que té per tangent  $m$ . El tronc de con està format per un material de densitat  $d$  i la base menor està recoberta per una làmina de massa  $p$  g/cm<sup>2</sup>. Digueu quina és l'altura del tronc de con per a la qual la massa total és màxima. Feu la discussió completa del problema.

**2E8.** Sigui  $\gamma_1$  una circumferència de radi  $r$  i  $P$  un punt exterior que dista  $a$  del centre. Suposem construïdes les dues rectes tangents a  $\gamma_1$  per  $P$ , i sigui  $\gamma_2$  una circumferència de radi menor que el de  $\gamma_1$ , tangent a aquesta i a les dues rectes. En general, una vegada construïda la circumferència  $\gamma_n$ , se'n construeix una altra  $\gamma_{n+1}$  de radi menor que el de  $\gamma_n$  i tangent a aquesta i a les dues rectes citades. Determineu

- El radi de  $\gamma_2$ .
- L'expressió general del radi de  $\gamma_n$ .
- El límit de la suma de les longituds de les circumferències  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \dots$



## Primera sessió

**3C1.** Trobeu els polígons regulars els angles dels quals mesuren un nombre enter de graus.

**3C2.** Els carrers d'una ciutat formen enreixat de dues trames, una formada pels carrers longitudinals i una altra pels transversals. Els longitudinals es designen amb els nombres naturals 1, 2 i 3; i els transversals amb les lletres de l'alfabet  $a, b, c, d, e$  i  $f$ ; i en aquest ordre. Una persona surt a passejar de la cruïlla  $(1, a)$ . Tira un dau amb sis cares numerades de l'u al sis. Si surt un múltiple de 3, recorre una travessia longitudinal, i en cas contrari una de transversal. A cada cruïlla repeteix l'operació. Digueu quina és la probabilitat que passi per la cruïlla  $(3, d)$ .

**3C3.** Un dipòsit té la superfície formada per un cilindre completat per dues semiesferes a les bases. El dipòsit està col·locat de forma que les generatrius del cilindre són horitzontals. Gradueu una vara vertical de manera que doni el volum del líquid contingut al dipòsit en funció de l'altura marcada a la vara.

**3C4.** Els elements d'un grup es poden expressar com a productes finits de la forma  $abcd \dots$  on cada factor, o és igual a  $g$ , o és igual a  $s$ . Aquests  $g$  i  $s$  compleixen

$$g^n = I$$

$$s^2 = I$$

$$s g = g^{n-1} s$$

on  $I$  és l'element neutre del grup, i els exponents tenen el significat de producte de termes iguals.

a) Trobeu el nombre d'elements del grup.

b) Doneu la taula del grup per a  $n = 6$ .

- 3C5.** Si fem  $s = x + y$  i  $p = xy$ , expresseu  $(x - y)^4$  com a polinomi en  $s$  i  $p$ .
- 3C6.** Amb base als costats d'un quadrat es construeixen triangles isòsceles que intercepten els costats oposats en segments iguals a un terç del costat del quadrat. Calcular, en funció d'aquest costat, l'àrea de l'estrella de quatre puntes que té per vèrtexs els dels triangles exteriors al quadrat.
- 3C7.** Digueu quants moviments transformen un políedre regular en ell mateix.
- 3C8.** Referit al pla a coordenades cartesianes, es consideren el conjunt de punts de coordenades enteres. En aquest conjunt es defineix una relació d'equivalència: dos punts la satisfan si i només si les primeres coordenades són còngrues mòdul 2 i les segones coordenades són còngrues mòdul 3. Es demana:
- El nombre de classes d'equivalència.
  - El representant de cada classe a distància mínima de l'origen.
  - Al conjunt de classes es defineix una suma component a component (mòdul 2 i 3, respectivament). Escriviu la taula del grup que s'obté.
  - Si es defineix, a més a més, un producte component a component (mòdul 2 i 3, respectivament), s'obté un anell. Trobeu-ne els divisors de zero.

## Primera sessió

**3E1.** Un fabricant de tres productes de preus unitaris 50, 70 i 65 Pta rep una comanda de 100 unitats d'un detallista que li tramet un pagament de 6850 Pta. El detallista posa la condició que li envii el màxim possible del producte més car, i la resta dels altres dos productes. Quant ha d'enviar de cada producte per tal de servir la comanda?

**3E2.** Un nombre de tres xifres s'escriu  $xyz$  en el sistema de base 7, i  $zyx$  en el sistema de base 9. Quin nombre és?

**3E3.** Donat un pentàgon regular es considera el pentàgon convex limitat per les diagonals. Es demana:

- La relació de semblança entre els dos pentàgons convexos.
- La relació de les àrees.
- La raó de l'homotècia que transforma el primer en el segon.

**3E4.** Es vol penjar un pes  $P$  de manera que quedi 7 m per sota del sostre. Es penja per mitjà d'un cable vertical agafat al punt mitjà  $M$  d'una cadena que a la vegada està agafada al sostre en dos punts  $A$  i  $B$  que disten 4 m. El preu del cable  $PM$  és  $p$  pta/m i el preu de la cadena  $AMB$  és  $q$  pta/m. Es demana:

- Determineu les longituds del cable i la cadena per a obtenir el preu més econòmic de l'instal·lació.
- Discutiu la solució per a diferents valors de la relació  $p/q$  dels dos preus.

**3E5.** La longitud de l'hipotenusa  $BC$  d'un triangle rectangle  $ABC$  és  $a$ , i sobre ella s'agafen els punts  $M$  i  $N$  tals que  $BM = NC = k$ , on  $k < a/2$ . Si suposem que només es coneixen les dades  $a$  i  $k$ , calculeu:

- El valor de la suma de quadrats de les longituds  $AM$  i  $AN$ .
- La raó de les àrees dels triangles  $ABC$  i  $AMN$ .
- L'àrea tancada per la circumferència que passa pels punts  $A$ ,  $M'$ ,  $N'$ , essent  $M'$  la projecció ortogonal de  $M$  sobre  $AC$  i  $N'$  la de  $N$  sobre  $AB$ .

**3E6.** Ens diuen que un matrimoni té 5 fills. Calculeu la probabilitat que entre ells hi hagi al menys 2 nois i al menys una noia. Es considera que la probabilitat de néixer noi o noia és  $1/2$ .

**3E7.** Determineu una progressió geomètrica de set termes si sabem que la suma dels tres primers és 7, i la suma dels tres últims és 112.

**3E8.** Determineu els valors de  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , per tal que la representació gràfica de la funció

$$y = ax^3 + bx^2 + cx$$

tingui una inflexió en el punt d'abscissa  $x = 3$ , amb tangent d'equació

$$x - 4y + 1 = 0.$$

Dibuixeu la gràfica corresponent.

## Primera sessió

4C1. Demostreu que  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{4}$  no poden ser termes d'una progressió aritmètica ni geomètrica.

4C2. Un paral·lelogram  $ABCD$  té el vèrtex  $A$  fix i el vèrtex oposat  $D$  mòbil sobre una circumferència. Sigui  $E$  el punt mitjà del costat  $AB$  i  $M$  la intersecció de  $AC$  amb  $DE$ . Trobeu el lloc geomètric del punt  $M$ .

4C3. Trobeu tots els nombres complexos que compleixen  $\bar{z} = z^2$ .

4C4. Resoleu l'equació

$$\sqrt{2}x^4 - 3x^3 + 3\sqrt{2}x^2 - 6x + 2\sqrt{2} = 0$$

sabent que una de les arrels és inversa d'una altra.

Segona sessió

4C5. Partim d'un rectangle  $ABCD$  i construïm un altre rectangle  $A_1BC_1D_1$  amb la base  $A_1B$  meitat de  $AB$  i altura  $BC_1$  igual a  $3/2$  de  $BC$ ; a partir d'aquest es construeix un nou rectangle  $A_2BC_2D_2$  amb base i altura que construïdes de la mateixa manera que abans respecte del  $A_1BC_1D_1$ ; i així successivament. Calculeu l'àrea de la reunió de tots els rectangles obtinguts.

4C6. A una urna hi ha  $b$  boles blanques i  $b+n$  boles negres. Calculeu tots els valors possibles de  $b$  i  $n$  per tal que la probabilitat d'obtenir bola blanca sigui  $1/n$ .

4C7. Un paral·lelogram té vèrtexs en punts de coordenades enteres i té un costat sobre l'eix de les  $x$ . Sigui  $n_2$  el nombre de punts de coordenades enteres que són interiors al paral·lelogram i no estan sobre els costats; sigui  $n_1$  el nombre de punts de coordenades enteres que estan sobre els costats del paral·lelogram i no són vèrtexs; i sigui  $n_0 = 4$  el nombre de vèrtexs. Demostreu que l'àrea del paral·lelogram és

$$A = n_2 + \frac{n_1}{2} + \frac{n_0}{4}.$$

4C8. Trobeu les posicions de les busques d'un rellotge que són susceptibles d'estar en posició inversa, és a dir, que la busca horària estigui en posició de la busca minutera i viceversa.

## Primera sessió

**4E1.** Se sap que la funció real  $f(t)$  és monòtona creixent a l'interval  $-8 \leq t \leq 8$ , però no se sap res del comportament fora d'aquest interval. En quin interval de valors de  $x$  es pot assegurar que la funció  $y = f(2x - x^2)$  és monòtona creixent?

**4E2.** Determineu els pols de les inversions que transformen quatre punts alineats  $A, B, C, D$ , en quatre punts  $A', B', C', D'$  que siguin vèrtexs d'un paral·lelogram rectangle, i que  $A'$  i  $C'$  siguin vèrtexs oposats.


**4E3.** Un semàfor està instal·lat a la cruïlla principal d'una via per on es circula en tots dos sentits. Està vermell 30 s i verd una altres 30 s, alternativament. Es vol instal·lar un altre semàfor a la mateixa via, en una cruïlla secundària, i a 400 m de distància del primer. També ha de funcionar amb un període de 1 min de durada. Volem que els cotxes que circulen a 60 Km/h per la via en qualsevol dels dos sentits i que no s'han d'aturar si només hi hagués el semàfor de la cruïlla principal, tampoc s'hagin d'aturar després d'instal·lar el de la cruïlla secundària. Digueu quants segons pot estar encès el vermell al semàfor secundari.

*Nota:* Raoneu sobre una representació cartesiana de la marxa dels vehicles, amb un eix de distàncies i un altre de temps.


**4E4.** Tenim un botella de fons pla i circular, tancada i plena parcialment de vi, de manera que el nivell no supera la part cilíndrica. Discutiu ens quins casos es pot calcular la capacitat de la botella, sense obrir-la, si només disposem d'un doble decímetre graduat. En cas que sigui possible, descriuiu el càlcul. (Problema de la *Gara Matemàtica italiana*).

**4E5.** Sigui  $\gamma$  una semicircumferència de diàmetre  $AB$ . Es construeix una línia trencada amb origen  $A$  de forma que tingui els vèrtexs alternativament al diàmetre  $AB$  i a la semicircumferència  $\gamma$  i de manera que tots els costats formin angles iguals  $\alpha$  amb el diàmetre (però alternativament en els dos sentits). Es demana:

- Els valors de l'angle  $\alpha$  que fan que la línia trencada passi per l'altre extrem  $B$  del diàmetre.
- La longitud total de la línia trencada en funció de la longitud  $d$  del diàmetre i de l'angle  $\alpha$ .



Problema 4E5



Problema 4E6

**4E6.** Es dóna un triangle equilàter  $ABC$  de centre  $O$  i radi  $OA = R$  i es consideren les set regions que les rectes costats determinen sobre el pla. Es demana la regió del pla transformada de les regions marcades amb ombra a la figura adjunta, en una inversió de centre  $O$  i potència  $R^2$ .


**4E7.** Per una carretera hi circula una caravana de cotxes, tots a la mateixa velocitat, mantenint la separació mínima entre cotxes senyalada pel Codi de Circulació. Aquesta separació és, en metres,

$$\frac{v^2}{100},$$

on  $v$  és la velocitat expressada en Km/h. Si suposem que la longitud de cada cotxe és de 2.89 m, calculeu la velocitat a la qual han de circular per tal que la capacitat del trànsit resulti màxima, és a dir, que en un punt de la carretera i en un període fixat, hi passin el màxim nombre de vehicles.




4E8. Per a obtenir el valor d'un polinomi de grau  $n$  i de coeficients  $a_0, a_1, \dots, a_n$  (començant pel terme de grau més alt), si a la variable  $x$  li donem el valor  $b$ , es pot aplicar el procés indicat a l'organigrama adjunt, que desenvolupa les accions requerides per a aplicar la regla de Ruffini. Es demana que construïu un altre organigrama anàleg que permeti expressar el valor de la derivada del polinomi donat, també per a  $x = b$ .



For a given value of  $n$ , the polynomial  $P_n(x)$  is defined as  $P_n(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ . The coefficients  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$  are determined by the initial conditions  $P_0(x) = 1$  and  $P_1(x) = x + a_0$ . The recurrence relation for the coefficients is  $a_k = -\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} a_j$  for  $k \geq 1$ .

The polynomial  $P_n(x)$  is a solution of the differential equation  $xP_n'(x) + P_n(x) = 0$ . The function  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) \frac{x^n}{n!}$  is a solution of the differential equation  $x^2 f''(x) + x f'(x) + f(x) = 0$ .



The function  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) \frac{x^n}{n!}$  is a solution of the differential equation  $x^2 f''(x) + x f'(x) + f(x) = 0$ . The function  $f(x)$  is a constant function  $f(x) = 1$ .

The function  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) \frac{x^n}{n!}$  is a solution of the differential equation  $x^2 f''(x) + x f'(x) + f(x) = 0$ . The function  $f(x)$  is a constant function  $f(x) = 1$ .

The function  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) \frac{x^n}{n!}$  is a solution of the differential equation  $x^2 f''(x) + x f'(x) + f(x) = 0$ . The function  $f(x)$  is a constant function  $f(x) = 1$ .

## Primera sessió

5C1. Considerem un alfabet de dues lletres,  $a$ ,  $b$ , i totes les paraules que es poden formar amb aquest alfabet, ordenades en ordre alfabètic.

- a) Quines són les paraules que en tenen una immediatament següent?  
b) Quines són les paraules que en tenen una immediatament anterior?

Considerem el conjunt  $B$  de les paraules acabades en  $b$ .

- c) El conjunt  $B$ , té primer i últim element?  
d) Demostreu que entre cada dues paraules de  $B$  hi ha una altra paraula de  $B$ .

5C2. Considerem tots els nombres que escrits en base deu tenen una expressió que és una permutació de les xifres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es demana

- a) Trobeu el màxim i el mínim de la diferència entre la suma de les xifres de lloc senar i les xifres de lloc parell.  
b) Digueu quants nombres hi ha que siguin múltiples d'onze.

5C3. Sigui  $\mathcal{G}$  un gir de centre  $O$  i angle  $\alpha$ . Trobeu tots els moviments del pla de la forma  $M\mathcal{G}M^{-1}$ , on  $\mathcal{M}$  és un moviment pla.

5C4. Tres nombres complexos  $a$ ,  $b$ ,  $c$  estan representats pels punts  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .

- a) Demostreu que tots els triangles  $ABC$  tals que

$$\frac{c-a}{b-a} = k, \quad k \text{ complex}$$

són semblants.

- b) Què succeeix si  $k$  és real?  
c) Quins són els valors de  $k$  que fan equilàter el triangle?  
d) Si suposem  $B$  i  $C$  fixos, trobeu el lloc geomètric del punt  $A$  quan  $k$  recorre el conjunt de nombres imaginaris purs, i quan recorre el conjunt de nombres complexos de mòdul unitat.

5C5. Demostreu que el polinomi  $p(x) = x^{31} - x^{30} + \dots + x - 1$  és divisible per  $q(x) = x^{16} + 1$ . Trobeu el polinomi quocient sense fer la divisió, demostreu que aquest quocient és divisible per un binomi anàleg al  $q(x)$ , i determineu-lo. Repetint el procés les vegades que calgui, demostreu que  $p(x)$  té només una arrel real.

5C6. a) Demostreu que  $\tan \frac{\pi x}{4} < x$  si  $0 < x < 1$ .

b) Demostreu que si  $1 - 2/\pi < x < 1$ , es compleix

$$1 - \frac{\pi(1-x)}{2} < \tan\left(\frac{\pi x}{4}\right).$$

Nota: Es recomana raonar sobre la gràfica de la funció tangent.

5C7. Tres circumferències tangents dues a dues estan a l'interior d'un triangle, de manera que cada una és tangent a dos costats. Si  $a$ ,  $b$ ,  $c$  són les distàncies entre els punts de contacte de les circumferències amb els costats, calculeu, en funció d'aquests valors, l'àrea del triangle que té per vèrtexs els centres de les circumferències.

5C8. Donat un nombre natural  $b$ , sigui  $B$  el conjunt de nombres racionals que admeten un representant amb denominador  $bn$ , amb  $n$  natural.

a) Digueu si el conjunt  $\mathbb{Z}$  dels enters és un subconjunt de  $B$ .

b) Digueu quins són els valors de  $b$  que fan  $\mathbb{Z} = B$ .

c) És  $B$  un cos?

d) Doneu la condició necessària i suficient per tal que un nombre racional donat pertanyi a  $B$ .

## Primera sessió

**5E1.** Una nit, la temperatura de l'aire es va mantenir constant, uns quants graus sota zero, i la de l'aigua d'un estany cilíndric molt extens, que formava una capa de 10 cm de profunditat, va arribar a ser de zero graus. Es va començar a formar una capa de gel a la superfície. En aquestes condicions es pot suposar que l'altura de la capa de gel formada és proporcional a l'arrel quadrada del temps transcorregut. A les 0 h, el gruix del gel era de 3 cm i a les 4 h es va acabar de gelar l'aigua de l'estany. Digueu a quina hora es va començar a formar la capa de gel sabent que la densitat del gel format era de 0.9

**5E2.** Raoneu si es pot afirmar, negar o declarar no decidible la continuïtat en el punt  $x = 0$  de una funció real  $f(x)$  de variable real, en cada un dels casos (independents)

a) Se sap únicament que per a tot  $n$  natural

$$f\left(\frac{1}{2n}\right) = 1 \text{ i } f\left(\frac{1}{2n+1}\right) = -1.$$

b) Se sap que per a tot  $x$  real no negatiu és  $f(x) = x^2$  i per a tot  $x$  real negatiu és  $f(x) = 0$ .

c) Se sap únicament que per a tot  $n$  natural és

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = 1.$$

**5E3.** Donat un quadrat de costat  $a$  es considera el conjunt de punts del pla pels quals hi passa una circumferència de radi  $a$  el cercle de la qual conté el quadrat donat. Demostreu que el contorn de la figura formada per aquests punts està format per arcs de circumferència; determineu-ne els centres, els radis i les longituds.

**5E4.** En els extrems  $A, B$  d'un diàmetre (de longitud  $2r$ ) d'un paviment circular horitzontal, s'aixequen columnes verticals d'igual altura  $h$ . Els extrems de les columnes suporten una biga  $A'B'$  de longitud igual al diàmetre. Es forma una coberta col·locant nombrosos cables tensos (que se suposa que queden rectes) unint punts de la biga  $A'B'$  amb punts de la circumferència, de forma que els cables quedin perpendiculars a la biga. Trobeu el volum tancat entre la coberta i el paviment.

**5E5.** Trobeu el lloc geomètric del centre d'un rectangle els quatre vèrtexs del qual descriuen el contorn d'un triangle donat.

**5E6.** Raoneu si són concurrents, en tot tetràedre

a) Les perpendiculars a les cares en els circumcentres.

b) Les perpendiculars a les cares en els ortocentres.

c) Les perpendiculars a les cares en els incentres.

En cas afirmatiu, caracteritzeu amb alguna propietat geomètrica senzilla el punt de concurrència. En cas negatiu mostreu un exemple en el qual s'aprecii clarament la no concurrència.

**5E7.** A la successió de potències de 2 (escrites en el sistema decimal, i començant per  $2^1 = 2$ ) hi ha tres termes d'una xifra, tres de dues xifres, quatre de 4 xifres, tres de 5, etc. Raoneu les respostes a les qüestions següents

a) Pot haver-hi solament dos termes d'un cert nombre de xifres?

b) Pot haver-hi cinc termes consecutius amb el mateix nombre de xifres?

c) Pot haver-hi quatre termes de  $n$  xifres, seguits de quatre amb  $n + 1$  xifres?

d) Quin és el nombre màxim de potències consecutives de 2 que es poden trobar sense que entre elles n'hi hagi quatre amb el mateix nombre de xifres?

**5E8.** En un quadrat de costats reflectants, designem els quatre costats amb els noms dels punts cardinals. Fixem un punt al costat N. Determineu en quina direcció n'ha de sortir un raig de llum (cap a l'interior del quadrat) per tal que torni al punt després d'haver tingut  $n$  reflexions al costat E,  $n$  al costat W,  $m$  al costat S i  $m - 1$  al costat N, essent  $n$  i  $m$  nombres naturals coneguts. Què passa si  $m$  i  $n$  no són primers entre ells? Calculeu la longitud del raig lluminós en funció de  $m$  i  $n$  i de la longitud del costat del quadrat.

## Primera sessió

6C1. L'arrel quadrada per defecte, amb error menor que  $1/10$ , d'una fracció irreductible és 1.3. La suma dels seus termes és 81. Determineu la fracció.

6C2. Demostreu que si una equació  $P(x) = 0$  té dues arrels inverses, aquestes arrels també ho són de l'equació

$$P\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Aplicueu aquesta propietat a la resolució de l'equació

$$x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 8x + 2 = 0$$

sabent que té dues arrels inverses.

6C3. Siguin

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 - r_1^2 = 0$$

$$(x - a')^2 + (y - b')^2 - r_2^2 = 0$$

les equacions de dues circumferències. Demostreu que les circumferències

$$\frac{(x - a)^2 + (y - b)^2 - r_1^2}{r_1} \pm \frac{(x - a')^2 + (y - b')^2 - r_2^2}{r_2} = 0$$

tallen les primeres sota els mateixos angles.

6C4. Un punt  $X$  de la hipotenusa d'un triangle rectangle es projecta ortogonalment sobre els catets en els punts  $M$  i  $N$ .

Determineu la posició de  $X$  per tal que la longitud del segment  $MN$  sigui mínima, i aquesta longitud mínima.

**6C5.** Es donen dues rectes  $r$  i  $s$  secants al punt  $O$  i que formen angle  $\alpha$ . Sobre la bissectriu de l'angle s'agafa un punt  $A$  per on es traça una recta variable que talla  $r$  al punt  $P$  i talla  $s$  al punt  $Q$ . Posem  $x = OP$  i  $y = OQ$  en magnitud i signe. Demostreu que

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

és constant. Calculeu  $x$  i  $y$  de manera que l'àrea del triangle  $OPQ$  sigui una quantitat donada.

**6C6.** Es considera una semiesfera de radi 1 i centre  $O$  tangent, en un punt  $P$ , a un pla  $\pi$  paral·lel al pla que conté la circumferència que limita la semiesfera. Per a cada punt  $A$  del pla  $\pi$  considerem la recta  $OA$  que talla la semiesfera en un punt  $A_1$ , el qual es projecta ortogonalment sobre el pla  $\pi$  en un punt  $A'$ .

- Com es transforma el pla  $\pi$  en l'aplicació  $A \rightarrow A'$ ?
- Trobeu els punts fixos de l'aplicació  $A \rightarrow A'$ .
- En què es transformen les rectes que passen per  $P$ ?
- En què es transformen les circumferències de centre  $P$ ?
- En què es transformen les rectes del pla  $\pi$ ?

**6C7.** Construiu un rectangle donades la diagonal i la suma de dos costats perpendiculars.

\* **6C8.** Trobeu els valors màxim i mínim de l'expressió

$$\frac{bc}{(a^3 - b^3)(a^3 - c^3)} + \frac{ac}{(b^3 - a^3)(b^3 - c^3)} + \frac{ab}{(c^3 - a^3)(c^3 - b^3)},$$

essent  $a + b + c = 0$ .



## Primera sessió

**6E1.** Trobeu el lloc geomètric dels centres de les inversions que transformen dos punts  $A$ ,  $B$  d'una circumferència donada  $\gamma$ , en punts diametralment oposats de les circumferències inverses de  $\gamma$ .

**6E2.** Trobeu el lloc geomètric de l'afix  $M$  del nombre complex  $z$  per tal que estigui alineat amb els afixos de  $i$  i  $iz$ .

**6E3.** Una bossa conté cubs de plàstic de la mateixa mida, amb les cares pintades de color: blanc, vermell, groc, verd, blau i violeta (sense repetir el color a les cares del mateix cub). Quants cubs hi pot haver que siguin distingibles entre ells?

**6E4.** Es divideix una circumferència de radi  $R$  en 8 parts iguals. Els punts de la divisió es designen successivament per  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $F$ ,  $G$  i  $H$ . Trobeu l'àrea del quadrat que es forma en dibuixar les cordes  $AF$ ,  $BE$ ,  $CH$  i  $DG$

## Segona sessió

**6E5.** Demostreu que un polígon convex de més de quatre costats no es pot descompondre en dos polígons semblants al primer (directament o inversament), per mitjà d'un sol tall rectilini. Digueu raonadament quins són els quadrilàters i triangles que admeten una descomposició d'aquest tipus.

**6E6.** Donat un polinomi de coeficients reals  $P(x)$ , digueu si es pot afirmar que per a tot valor real de  $x$  es compleix alguna de les desigualtats següents:

$$P(x) \leq P(x)^2; \quad P(x) < 1 + P(x)^2; \quad P(x) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2}P(x)^2.$$

Trobeu un procediment general senzill (d'entre els molts que hi ha) que permeti, donats dos polinomis  $P(x)$  i  $Q(x)$ , trobar-ne un altre  $M(x)$  tal, que per a tot valors de  $x$ , sigui

$$-M(x) < P(x) < M(x) \quad \text{i} \quad -M(x) < Q(x) < M(x).$$

**6E7.** Un poligon convex  $A_1A_2 \dots A_n$  de  $n$  costats i inscrit en una circumferència, té els costats que satisfan les desigualtats


$$\overline{A_nA_1} > \overline{A_1A_2} > \overline{A_2A_3} > \dots > \overline{A_{n-1}A_n}.$$

Demostreu que els angles interiors satisfan les desigualtats

$$\widehat{A_1} < \widehat{A_2} < \widehat{A_3} < \dots < \widehat{A_{n-1}}, \quad \widehat{A_{n-1}} > \widehat{A_n} > \widehat{A_1}.$$

**6E8.** La casa SEAT recomana als usuaris, per a la correcta conservació de les rodes, que es facin substitucions periòdiques d'aquestes, en la forma  $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{3} \rightarrow \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{4} \rightarrow \mathbf{R}$ , segons la numeració de la figura. Si anomenem  $\mathcal{G}$  a aquest canvi de rodes,  $\mathcal{G}^2 = \mathcal{G}\mathcal{G}$  a la realització d'aquest canvi dues vegades, i així successivament per a les altres potències de la transformació  $\mathcal{G}$ ,

- demostreu que el conjunt de les potències forma un grup, i estudeieu-lo.
- Cada punxada d'una de les rodes equival també a una substitució en la qual la roda punxada es substitueix per la de recanvi ( $\mathbf{R}$ ) i, una vegada reparada passa al lloc que ocupava la de recanvi. Doneu  $\mathcal{G}$  com a producte de transformacions punxada. Formen grup?



**Guanyadors:** Jaume Lluís García Roig, Dolores Carrillo Gallego, Jorge Bustos Puche.

## Primera sessió

**7C1.** Construïu un triangle coneixent l'angle  $B$  i les mitjanes que passen pels vèrtexs  $A$  i  $C$ .

**7C2.** Un robí de pes  $p$  es fracciona en dos trossos, la qual cosa produeix una pèrdua de valor. En aquest tipus de pedres precioses, els quadrats dels pesos són proporcinals als cubs del valors. Trobeu com ha de partir-se la pedra inicial per tal que la depreciació produïda pel trencament sigui màxima.

**7C3.** El signe  $\leq'$  expressa la relació "ser divisor de".

a) Qualifiqueu la relació  $\leq'$  amb tres adjectius trets d'aquestes parelles

reflexiva	_____	irreflexiva
simètrica	_____	antisimètrica
transitiva	_____	intransitiva

formant, efectivament, totes les qualificacions possibles (*sic*). Digueu quina és la ver-tadera.

b) Si fem que la variable  $n$  recorri el conjunt dels nombres naturals, l'expressió

$$64 \leq' (81 - 18n^2 + n^4)$$

produeix *proposicions*. És per aquest motiu que els lògics l'anomenen *funció proposi-cional*. Demostreu que són veritat totes les proposicions que resulten per  $n$  senar. Deduïu raonadament si són falses totes les que resulten per  $n$  parell.

**7C4.** Es considera un tetràedre regular  $VABC$  i els punts mitjans dels parells d'arestes oposades:  $M$  i  $N$ ;  $P$  i  $Q$ ;  $R$  i  $S$ . Decidiu si les rectes  $MN$ ,  $PQ$  i  $RS$  es tallen o es creuen. El pla determinat pels punts  $M$ ,  $N$ ,  $P$  divideix el tetràedre en dues parts. Trobeu la raó dels volums de les dues parts.

**7C5.** Tenim un cub d'aresta  $q$ . S'uneixen els centres de les cares i s'obté un octàedre. S'uneixen després els centres de les cares de l'octàedre i s'obté un altre cub. Es demana la relació de volums del primer cub al segon i que es dedueixi, si és possible, la suma dels volums dels cubs resultants en repetir indefinidament el procés.

**7C6.** Es considera la funció  $f$  definida per

$$f(x, y) = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$$

en els punts de

$$\frac{(x-5)^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

Trobeu els valors més grans i més petits que pren la funció  $f$ .

**7C7.** A cada punt  $M$ , afix d'un complex  $z$ , li apliquem un gir  $\mathcal{G}$  de centre  $O$  (afix de  $z = 0$ ) i amplitud  $\alpha$ :

$$z_1 = \mathcal{G}(z)$$

i obtenim un punt  $M_1(z_1)$ . A continuació s'aplica al punt obtingut una simetria axial  $\mathcal{S}$  respecte de la recta formada pels punts d'argument  $\beta$ :

$$\mathcal{S}(z_1) = z'$$

i obtenim el punt  $M'(z')$ .

- Demostreu que la transformació  $\mathcal{S} \cdot \mathcal{G}$  és una simetria axial respecte d'un eix que cal determinar.
- Demostreu que  $\mathcal{S} \cdot \mathcal{G}$  es pot descompondre en el producte d'una simetria d'eix el real  $Ox$  per un gir que cal determinar.

**7C8.** Determineu  $a$ ,  $b$ ,  $c$  de forma que el polinomi

$$(x+1)^5 + a(x+1) + bx + c$$

sigui divisible per  $(x-1)^3$  i trobeu el quocient.

## Primera sessió

**7E1.** Un recipient cilíndric de revolució està parcialment ple d'un líquid la densitat del qual ignorem. Si el posem amb l'eix inclinat  $30^\circ$  respecte de la vertical observem que en treure líquid de forma que el nivell baixi 1 cm, el pes del contingut disminueix 40 g. Diguen quina serà la disminució del pes del contingut per cada centímetre que baixi el nivell si l'eix forma un angle de  $45^\circ$  amb la vertical. Se suposa que la superfície horitzontal del líquid no arriba a tocar cap de les bases del recipient.

**7E2.** Una planta creix de la manera que descrivim a continuació. Té un tronc que es bifurca en dues branques; cada branca de la planta pot, a la vegada, bifurcar-se en dues altres branques, o bé acabar en un gemma. Anomenarem *càrrega* d'una branca al nombre total de gemmes que suporta, és a dir, el nombre de gemmes alimentades per la saba que passa per aquesta branca; i anomenarem *allunyament* d'una gemma al nombre de bifurcacions que la saba ha de passar per arribar del del tronc fins a aquesta gemma. Si  $n$  és el nombre de bifurcacions que té una determinada planta, es demana

- el nombre de branques de la planta,
- el nombre de gemmes,
- demostrar que la suma de les càrregues de totes les branques és igual a la suma dels allunyaments de totes les gemmes.

*Suggeriment:* Es pot procedir per inducció, demostrant que si uns resultats són correctes per una determinada planta, ho segueixen essent per la planta que s'obté substituint una gemma per un parell de branques acabades en gemmes.

**7E3.** Es dona un triangle arbitrari  $ABC$  i un punt  $P$  situat al costat  $AB$ . Es demana que es traci per  $P$  una recta que divideixi el triangle en dues figures de la mateixa àrea.

**7E4.** Sabem que els polinomis

$$2x^5 - 13x^4 + 4x^3 + 61x^2 + 20x - 25$$

$$x^5 - 4x^4 - 13x^3 + 28x^2 + 85x + 50$$

tenen dues arrels dobles comunes. Determineu-ne totes les arrels.

**7E5.** En els exàmens de 6è curs d'un Centre, aproven la Física, com a mínim, el 70% dels alumnes; les Matemàtiques, com a mínim, el 75%; la Filosofia, com a mínim, el 90%; i l'Idioma, com a mínim, el 85%. Quants alumnes, com a mínim, aproven les quatre assignatures?

**7E6.** Donada una circumferència  $\gamma$  i dos punts  $A$  i  $B$  del seu pla, es traça per  $B$  una secant variable que talla  $\gamma$  en dos punts  $M$  i  $N$ . Determineu el lloc geomètric dels centres de les circumferències circumscrites al triangle  $AMN$ .

**7E7.** Calculeu els valors dels cosinus dels angles  $x$  que satisfan l'equació

$$\sin^2 x - 2 \cos^2 x + \frac{1}{2} \sin 2x = 0.$$

**7E8.** Es dona un punt  $M$  a l'interior d'una circumferència, a una distància  $OM = d$  del centre  $O$ . Per  $M$  es tracen dues cordes  $AB$  i  $CD$  que formen angle recte. S'uneix  $A$  amb  $C$  i  $B$  amb  $D$ . Determineu el cosinus de l'angle que ha de formar la corda  $AB$  amb  $OM$  per tal que la suma de les àrees dels triangles  $AMC$  i  $BMD$  sigui mínima.

## Primera sessió

8C1. Calculeu raonadament els valors enters de  $x$  per als quals la funció

$$f(x) = \frac{x^2}{x+6}$$

pren valors enters.

8C2. Estic esperant l'ascensor al pis 5è d'una casa de set pisos. En un cert moment l'ascensor inicia la pujada amb dues persones a dins. Sabem que a cada pis hi viuen 10 persones, i que jo no sóc de la casa. Quina és la probabilitat que l'ascensor es pari al 5è pis?

8C3. En un triangle  $ABC$  el vèrtex  $A$  és fix i l'angle  $\widehat{BAC}$  és constant. Trobeu el lloc geomètric del vèrtex  $C$  si el vèrtex  $B$  recorre una recta  $r$  i el producte  $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$  és constant.

8C4. Per a cada nombre natural  $a$  definim la successió  $S_a$

$$x_1 = a; \quad x_{n+1} = 2x_{n-1}, \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

Demostreu que donat un nombre natural qualsevol  $b \neq 1$ , existeix un únic nombre parell  $p$  tal que  $b$  és un terme de la successió  $S_p$ .

8C5. Siguin els conjunts  $E = \{1, 2, 3, 4\}$  i  $A = \{1, 4\}$ .

a) Construïu el conjunt  $\mathcal{P}(E)$  de les parts de  $E$ .

b) Definides les relacions

$$X \mathcal{R} Y \iff X \cup A = Y \cup A$$

$$X \mathcal{R}^* Y \iff X \cap A = Y \cap A$$

per tot  $X, Y \in \mathcal{P}(E)$ , demostreu que les dues són relacions d'equivalència i determineu les classes d'equivalència respectives.

8C6. Trobeu l'equació de la circumferència que passa pel punt  $P(a, 4)$  i és tangent a l'eix d'abscisses en el punt de coordenades  $(3, 0)$ , sabent que  $a$  és igual a la suma de les arrels de l'equació

$$\frac{\log(35 - x^3)}{\log(5 - x)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left( \frac{n+4}{n+1} \right)^n.$$

8C7. Si dos nombres complexos  $z$  i  $z'$  compleixen

$$|z + z'| = |z - z'|$$

demostreu que  $\frac{iz}{z'}$  és real.

8C8. Sobre una semirecta  $OX$  d'origen  $O$  s'agafen dos punts fixos  $A$  i  $B$ . Sigui  $OY$  una semirecta que formi amb  $OX$  un angle  $x$ .

a) Determineu sobre  $OY$  un punt  $T$  tal que la diferència entre els angles  $TAB$  i  $TBA$  sigui igual a  $x$ .

b) Trobeu el lloc geomètric de  $T$  en variar  $x$ .



## Primera sessió

8E1. Calculeu

$$\sum_{k=5}^{k=49} \frac{11_{(k)}}{\sqrt[3]{1331_{(k)}}}$$

sabent que els nombres 11 i 1331 estan escrits en base  $k \geq 4$ .

8E2. En una certa geometria operem amb dos tipus d'elements, punts i rectes, que estan relacionats segons els axiomes següents:

- I. Donats dos punts  $A$  i  $B$ , existeix una única recta  $(AB)$  que passa per tots dos.
  - II. Sobre una recta hi ha com a mínim dos punts. Existeixen tres punts no situats sobre una recta.
  - III. Si un punt  $B$  està situat entre  $A$  i  $C$  llavors  $B$  està també entre  $C$  i  $A$ . ( $A$ ,  $B$ ,  $C$  són tres punts diferents d'una recta.)
  - IV. Donats dos punts  $A$  i  $C$  existeix com a mínim un punt  $B$  a la recta  $(AC)$  de forma que  $C$  està entre  $A$  i  $B$ .
  - V. Donats tres punts sobre una mateixa recta, com a màxim un d'ells està entre els altres dos.
  - VI. Siguin  $A$ ,  $B$ ,  $C$  tres punts no situats sobre una mateixa recta i  $a$  una recta que no conté cap dels tres punts. Si la recta passa per un punt del segment  $[AB]$ , aleshores passa per un punt del segment  $[BC]$  o passa per un del segment  $[AC]$ . (Designem per  $[AB]$  al conjunt de punts que estan entre  $A$  i  $B$ .)
- A partir del axiomes anteriors, demostreu les proposicions següents:
- Teorema 1.* Entre els punts  $A$  i  $C$  existeix almenys un punt  $B$ .
- Teorema 2.* Donats tres punts diferents sobre una recta, sempre un d'ells està situat entre els altres dos.

8E3. Si  $0 < p$ ,  $0 < q$  i  $p + q < 1$  demostreu

$$(px + qy)^2 \leq px^2 + qy^2.$$

8E4. Demostreu que en tot triangle de costats  $a$ ,  $b$ ,  $c$  i angles  $A$ ,  $B$ ,  $C$  es compleix (mesurant els angles en radians)

$$\frac{aA + bB + cC}{a + b + c} \geq \frac{\pi}{3}.$$

Indicació: Feu servir  $a \geq b \geq c \implies A \geq B \geq C$ .

**8E5.** Demostreu que per tot nombre complex  $z$  es compleix

$$(1 + z^{2^n})(1 - z^{2^n}) = 1 - z^{2^{n+1}}.$$

Escrivint les igualtats que resulten en donar a  $n$  els valors  $0, 1, 2, \dots$  i multiplicant-les, demostreu que per  $|z| < 1$  es compleix

$$\frac{1}{1-z} = \lim_{k \rightarrow \infty} (1+z)(1+z^2)(1+z^4) \cdots (1+z^{2^k}).$$

**8E6.** Les velocitats d'un submarí submergit i en superfície són, respectivament,  $v$  i  $kv$ . Està situat en un punt  $P$  a 30 milles del centre  $O$  d'un cercle de radi 60 milles. La vigilància d'una esquadra enemiga l'obliga a navegar submergit mentre està dins del cercle. Discutiu, segons els valors de  $k$ , quin és el camí més ràpid per anar a l'extrem oposat del diàmetre que passa per  $P$ . (Considereu el cas particular  $k = \sqrt{5}$ .)

**8E7.** Doneu una inversió que transformi dues circumferències concèntriques i coplanàries en dues altres iguals.

**8E8.** Del conjunt de  $2n$  nombres  $1, 2, 3, \dots, 2n$  en triem  $n+1$  de diferents. Demostreu que entre els nombres triats n'hi ha dos, com a mínim, tals que un divideix l'altre.

## Primera sessió

9C1. Tres ruletes perfectament horitzontals, centrades i equilibrades contenen sectors circulars pintats en vermell i en negre, de la forma següent: la ruleta 1 té  $180^\circ$  en negre i  $180^\circ$  en vermell; la ruleta 2 té  $255^\circ$  en vermell i  $135^\circ$  en negre; i la ruleta 3 té  $270^\circ$  en vermell i  $90^\circ$  en negre. Calculeu la probabilitat que en jugar simultàniament a les tres ruletes surtin dos negres i un vermell.

9C2. Demostreu la desigualtat, per  $n$  natural més gran que 1,

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

9C3. Construïu un triangle coneixent  $a + b + c$ ,  $a$  i  $\hat{A}$ .

9C4. En un grup de 24 alumnes de COU que han escollit al menys una de les assignatures de Filosofia, Geografia i Matemàtiques, se sap que:

5 alumnes trien Filosofia i Geografia,

3 alumnes trien Filosofia i Matemàtiques,

6 alumnes trien Geografia i Matemàtiques.

Se sap també que el nombre d'alumnes que escullen únicament una de les assignatures anteriors és el mateix en els tres casos. Quin és el nombre d'alumnes que tria cada una de les assignatures esmentades?

**9C5.** Contesteu raonadament les qüestions següents:

- a) Quin és el període de la funció  $\tan 3x$ ?
- b) Si la funció  $f(x)$  té un punt d'inflexió per a  $x = x_0$ , és necessàriament  $f'(x_0) = 0$ ?
- c) Doneu el camp d'existència de la funció

$$y = \sqrt{x^2 - 4x - 5}.$$

d) En el conjunt  $\mathbb{Q}$  dels nombres racionals es defineix la llei de composició interna

$$a * b = a + 3b \quad (a, b \in \mathbb{Q}).$$

Hi ha element neutre d'aquesta llei?

**9C6.** Trobeu el valor de  $a$  que fa compatible el sistema d'equacions

$$\begin{cases} 2y - z = a \\ 3x - 2z = 11 \\ y + z = 6 \\ 2x + y - 4z = a \end{cases}$$

i resoleu-lo substituint  $a$  pel valor trobat.

**9C7.** Determineu  $a$ ,  $b$  i  $c$  a la funció  $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ , sabent que la corba corresponent talla l'eix  $YY'$  en punts de  $(0, -10)$  i té una inflexió amb tangent paral·lela a l'eix  $XX'$  en el punt  $(-1, 1)$ .


**9C8.** Amb centre en els quatre vèrtexs d'un quadrat i radi igual al costat del quadrat es tracen en ell quatre quadrants. Trobeu l'àrea de l'estrella que així es forma.

## Primera sessió

**9E1.** Sigui  $K$  un anell amb unitat i  $M$  el conjunt de les matrius  $2 \times 2$  constituïdes amb elements de  $K$ . Es defineix a  $M$  una addició i una multiplicació de la forma usual entre matrius. Es demana:

- Comproveu que  $M$  és un anell amb unitat i no commutatiu respecte de les lleis de composició definides.
- Comproveu que si  $K$  és un cos commutatiu, els elements de  $M$  que tenen invers estan caracteritzats per la condició  $ad - bc \neq 0$ .
- Demostreu que el subconjunt de  $M$  format pels elements que tenen invers és un grup multiplicatiu.

**9E2.** Un punt es mou sobre els costats del triangle  $ABC$  definit pels vèrtexs  $A(-1.8, 0)$ ,  $B(3.2, 0)$ ,  $C(0, 2.4)$ . Determineu les posicions d'aquest punt de manera que la suma de distàncies als tres vèrtexs sigui màxima o mínima absoluta.



**9E3.** Tenim un prisma hexagonal regular. Digueu quina és la poligonal que, surtint d'un vèrtex de la base, recorre totes les cares laterals i acaba en el vèrtex de la cara superior situat a la mateixa aresta de la sortida, i té longitud mínima.

**9E4.** Es consideren al pla els següents conjunts de punts:


$$A = \{\text{afixos dels complexos } z \text{ tals que } \arg(z - (2 + 3i)) = \pi/4\},$$

$$B = \{\text{afixos dels complexos } z \text{ tals que } \operatorname{mod}(z - (2 + i)) < 2\}.$$

Determineu la projecció ortogonal sobre l'eix  $X$  de  $A \cap B$ .

Segona sessió

9E5. Tenim dues rectes paral·leles  $r$  i  $r'$  i un punt  $P$  sobre el pla que les conté que no està sobre cap de les dues rectes. Trobeu un triangle equilàter que tingui un vèrtex a  $P$ , un altre sobre  $r$  i el tercer sobre  $r'$ .



9E6. Donades tres circumferències de radis  $r$ ,  $r'$  i  $r''$ , cada una tangent exteriorment a les altres dues, calculeu el radi del cercle inscrit al triangle que té per vèrtexs els centres de les circumferències donades.

9E7. Demostreu que per a tot enter positiu  $n$ , el nombre

$$A_n = 5^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 1$$

és múltiple de 8.

9E8. Sabem que  $\mathbb{R}^3 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3\}$  és un espai vectorial respecte de les lleis de composició

$$(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3),$$

$$\lambda(x_1, x_2, x_3) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3), \lambda \in \mathbb{R}.$$

Considerem el següent subconjunt de  $\mathbb{R}^3$ :

$$L = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}.$$

a) Demostreu que  $L$  és un subespai vectorial de  $\mathbb{R}^3$ .

b) A  $\mathbb{R}^3$  es defineix la relació següent

$$\bar{x}R\bar{y} \iff \bar{x} - \bar{y} \in L; \quad \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^3.$$

Demostreu que és una relació d'equivalència.

c) Trobeu dos vectors de  $\mathbb{R}^3$  que pertanyin a la mateixa classe que el vector  $(-1, 3, 2)$ .


## Primera sessió

10C1. Digueu qui és més gran:  $e^\pi$  o  $\pi^e$ .

10C2. Donada l'el·lipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

es considera el sector definit per dos raigs focals. El primer,  $FA$ , passa pel vèrtex més pròxim a  $F$ ; el segon,  $FP$ , forma un cert angle donat  $\alpha$ , ( $0 < \alpha < 180^\circ$ ), amb  $FA$ . Calculeu l'àrea del sector el·líptic determinat pels dos raigs (part ombrejada de la figura).



10C3. Demostreu la proposició següent: els tres afixos dels complexos  $z_1, z_2, z_3$  formen un triangle equilàter si i només si

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1.$$

10C4. Demostreu que

$$\log_a b \log_b c \log_c d \log_d a = 1.$$

Segona sessió

**10C5.** Una persona passa per sota d'un focus de llum durant la nit. En aquest moment segueix un camí recte amb velocitat constant de  $v$  m/s. Trobeu la velocitat de creixement de la seva ombra a mesura que va caminant, si  $h$  i  $a$  són les altures respectives del focus i de la persona.

**10C6.** Demostreu que les altures d'un triangle acutangle són les bisectrius dels angles d'un triangle els vèrtexs del qual són els peus d'aquelles altures.

**10C7.** Sigui  $A$  una anell amb element unitat  $e$ , i  $B$  un subanell de  $A$ , també amb element unitat  $e'$ . Han de ser iguals  $e$  i  $e'$ ? En cas negatiu, poseu un exemple.

**10C8.** Una bossa conté 13 boles, de les quals 4 són negres, 6 blanques i 3 vermelles. De quantes maneres es pot treure un conjunt de 5 boles que contingui, al menys, una bola de cada color.



## Primera sessió

10E1. Donada la successió  $(a_n)$ , on

$$a_n = \frac{1}{4}n^4 - 10n^2(n-1), \text{ per } n = 0, 1, 2, \dots$$

Determineu el terme mínim de la successió.

10E2. Determineu totes le solucions del sistema

$$\begin{cases} 2x - 5y + 11z - 6 = 0 \\ -x + 3y - 16z + 8 = 0 \\ 4x - 5y - 83z + 38 = 0 \\ 3x + 11y - z + 9 > 0 \end{cases}$$

en el qual hi ha tres equacions i una inequació lineals.

10E3. Es considera en el pla complex la successió  $(a_n)$  de nombres complexos definida per

$$a_0 = 1, \text{ i } a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n} (\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)^n.$$

Demostreu que la successió de parts reals del termes de  $(a_n)$  és convergent i el seu límit és un nombre comprès entre 0.85 i 1.15.

10E4. Siguin  $C$  i  $C'$  dues circumferències concèntriques de radis  $r$  i  $r'$  respectivament. Determineu el valor del quocient  $r'/r$  per tal que a la corona limitada per  $C$  i  $C'$  existeixin vuit circumferències  $C_i$ ,  $i = 1, \dots, 8$ , que siguin tangents a  $C$  i a  $C'$ , i també que  $C_i$  sigui tangent a  $C_{i+1}$  per  $i = 1, \dots, 7$  i  $C_8$  tangent a  $C_1$ .

**10E5.** Es considera el conjunt de tots els polinomis de grau menor o igual que 4 amb coeficients racionals.

- Demostreu que té estructura d'espai vectorial sobre el cos dels racionals.
- Demostreu que els polinomis  $1, x - 2, (x - 2)^2, (x - 2)^3$  i  $(x - 2)^4$  formen una base d'aquest espai.
- Expresseu el polinomi  $7 + 2x - 45x^2 + 3x^4$  en la base anterior.

**10E6.** Es considera un triangle equilater d'altura 1. Per tot  $P$  de l'interior del triangle, es designen per  $x, y, z$  les distàncies del punt  $P$  als costats del triangle.

- Demostreu que per tot punt  $P$  interior del triangle es compleix que  $x + y + z = 1$ .
- Digueu quins són els punts de l'interior del triangle que compleixen que la distància a un costat és més gran que la suma de les distàncies als altres dos.
- Tenim una barra de longitud 1 i la trenquem en tres troços. Trobeu la probabilitat que amb aquests troços es pugui formar un triangle.

**10E7.** En el pla es consideren els dos punts  $P(8, 2)$  i  $Q(5, 11)$ . Un mòbil es desplaça de  $P$  a  $Q$  seguint un camí que ha de complir les condicions següents: el mòbil surt de  $P$  i arriba a un punt de l'eix  $x$  i recorre sobre aquest eix un segment de longitud 1; després se separa altra vegada de l'eix  $x$  i es dirigeix cap un punt de l'eix  $y$ , sobre el qual recorre un segment de longitud 2; se separa de l'eix  $y$  i va cap a un punt  $Q$ . D'entre tots els camins possibles, determineu el de longitud mínima, així com aquesta longitud.

**10E8.** En un espai euclidià de tres dimensions es designen per  $u_1, u_2, u_3$  els tres vectors unitaris ortogonals sobre els eixos  $x, y, z$ .

- Demostreu que el punt  $P(t) = (1 - t)u_1 + (2 - 3t)u_2 + (2t - 1)u_3$ , on  $t$  pren tots els valors reals, descriu una recta (que designarem per  $L$ ).
- Digueu quina figura descriu el punt  $Q(t) = (1 - t^2)u_1 + (2 - 3t^2)u_2 + (2t^2 - 1)u_3$  si  $t$  pren tots els valors reals.
- Trobeu un vector paral·lel a  $L$ .
- Quins són els valors de  $t$  que fan que el punt  $P(t)$  sigui sobre el pla  $2x + 3y + 2z + 1 = 0$ ?
- Trobeu l'equació cartesiana del pla paral·lel a l'anterior i que contingui el punt  $P(3)$ .
- Trobeu l'equació cartesiana del pla perpendicular a  $L$  que contingui el punt  $P(2)$ .

## Primera sessió

11C1. a) Demostreu que la mitjana geomètrica entre quatre nombres reals positius és menor o igual que la seva mitjana aritmètica.

b) Descomponeu el nombre 180 en suma de quatre sumands de manera que el producte sigui mínim.

11C2. Un home és en una barca situada a 5 Km de la costa, que se suposa rectilínea. El lloc  $A$  està situat a la costa a 13 Km de la barca. Pot remar a 3 Km/h i caminar a  $r$  Km/h. On haurà de desembarcar per tal d'arribar a  $A$  en el mínim temps possible?

11C3. Les portes de les habitacions d'una clínica donen a uns corredors que en alguns punt formen angle recte. Per traslladar els malalts es disposa de diverses lliteres rectangulars de 2 m de llarg per 0.5 m d'ample. Quina és l'amplada mínima dels corredors per tal que les lliteres puguin circular per la clínica? Suposant que els corredors tinguin aquesta amplada mínima, quina és l'amplada mínima de les portes per tal que les lliteres puguin entrar a les habitacions?

11C4. Al cos  $\mathbb{C}$  dels nombres complexos es considera l'equació

$$z^2 - 2(u+4)z - 2u^2 + 2(6+i)u + 19 + 4i = 0$$

on  $u$  és un paràmetre complex.

a) Determineu  $u$  per tal que aquesta equació tingui una arrel doble, i trobeu les dues solucions de l'equació en el cas general.

b) Sigui  $M$  l'afix a  $\mathbb{R}^2$  del nombre complex  $u$ , i  $P$  el del complex  $z$ . Es defineix a  $\mathbb{R}^2$  la relació següent:

$M$  està relacionat amb  $P$  si i només si  $z$  és una arrel de l'equació donada, corresponent al paràmetre  $u$

Demostreu que  $M$  està relacionat amb  $P$  si i només si  $P = S'(M)$  o  $P = {}_1'(M)$ , essent  $S'$  i  $S'_1$  les transformacions del pla en ell mateix definides per

$$z' = u(1+i) + 3 + 2i \quad z'_1 = u(1-i) + 5 - 2i$$

i estudeu propietats d'aquestes transformacions geomètriques.

Segona sessió

11C5. Determineu els nombres naturals  $n$  tals que  $(n-1)!$  és divisible per  $n$ . (Indicació: Raoneu primer suposant que  $n$  és primer, i després que  $n$  és compost).

11C6. Donat un cub d'aresta 1 m, s'uneixen els punts mitjans d'arestes consecutives, de manera que es formi un hexàgon regular.

a) Demostreu que això és possible.

b) Calculeu l'àrea d'aquest hexàgon.

c) Demostreu que entre totes les seccions produïdes per plans paral·lels a l'hexàgon, la d'àrea màxima és la de l'hexàgon.

11C7. a) Dibuixeu la gràfica de la funció  $y = \ln x/x$  per a  $x > 0$ . (Noteu que  $\ln x$  és el logaritme neperià de  $x$  i que  $y = \ln x/x$  tendeix a 0 quan  $x$  tendeix a infinit.)

b) Sigui  $C$  el conjunt

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x > 1, x \neq e\}.$$

Demostreu que per a tot  $x \in C$ , l'equació  $x^z = z^x$  té dues solucions; si  $x$  és un real positiu que no pertany a  $C$ , l'equació anterior té solució única.

c) Si  $m, n$  són dos nombres naturals diferents tals que  $m^n = n^m$ , demostreu que els dos nombres només poden ser 2 i 4.

d) Determineu quin és més gran dels dos nombres  $\pi^e$  i  $e^\pi$ . (S'ha d'utilitzar la gràfica dibuixada a l'apartat a) per a resoldre b), c) i d)).

11C8. Sigui el pla  $\pi$  referit a un sistema  $\{O, e_1, e_2\}$ , i  $\mathcal{T}$  una transformació puntual de  $\pi$  en  $\pi$  que a tot punt  $M(x, y) \in \pi$  li fan correspondre el punt  $M'(x', y') \in \pi$  tal que

$$x' = ax - by, \quad y' = bx + ay$$

on  $a$  i  $b$  són nombres lligats per la condició  $a^2 + b^2 = 1$ .

a) Demostreu que  $\mathcal{T}$  és bijectiva.

b) Demostreu que els conjunt de transformacions que resulta en donar a  $a$  i  $b$  tots els valors reals possibles, forma un grup respecte a l'operació producte de transformacions.

c) Determineu els valors de  $a$  i  $b$  que corresponen a l'element neutre del grup, i les relacions que han d'existir entre els valors de  $(a, b)$  i  $(a', b')$  que corresponen a dos elements inversos del grup.

d) Digueu si aquest grup és commutatiu.

## Primera sessió

11E1. Se sap que un dodecàedre regular és un poliedre regular que té 12 cares pentagonals iguals i tal que en cada vèrtex hi concorren 3 arestes. Es demana que calculeu, raonadament,

- el nombre de vèrtexs,
- el nombre d'arestes,
- el nombre de diagonals de totes les cares,
- el nombre de segments rectilinis determinats per cada dos vèrtexs,
- el nombre de diagonals del dodecàedre.

11E2. D'un disc metàl·lic es treu un sector circular de forma que amb la part que queda es pugui fer un vas cònic de volum màxim. Calculeu, en radians, l'angle del sector que s'ha tret.

11E3. Designarem per  $Z_{(5)}$  un cert subconjunt del conjunt  $\mathbb{Q}$  dels nombres racionals. Un racional pertany a  $Z_{(5)}$  si i només si existeixen fraccions pertanyents a aquest racional tals que 5 no divideixi el seu denominador. (Per exemple, el nombre racional  $13/10$  no pertany a  $Z_{(5)}$ , ja que el denominador de totes les fraccions iguals a  $13/10$  és un múltiple de 5. En canvi, el nombre racional  $75/10$  pertany a  $Z_{(5)}$  ja que  $75/10 = 15/2$ ).

Contesteu raonadament les següents qüestions:

- Quina estructura algebraica (semigrup, grup, etc.) té  $Z_{(5)}$  respecte de la suma?
- I respecte del producte?
- És  $Z_{(5)}$  un subanell de  $\mathbb{Q}$ ?
- És  $Z_{(5)}$  un  $Z_{(5)}$ -espai vectorial?

(Les operacions són les habituals del cos dels nombres racionals).

11E4. Els tres costats d'un triangle equilàter es suposen reflectants (excepte en els vèrtexs), de forma que reflectixin cap a dins del triangle els raigs de llum situats en el seu pla i que surtin d'un punt interior del triangle.

Determineu el recorregut d'un raig de llum que, partint d'un vèrtex del triangle arribi a un altre vèrtex després de reflectir-se successiament en els tres costats. Calculeu la longitud del camí seguit per la llum suposant que el costat del triangle mesuri 1 m.

Segona sessió

**11E5.** Sigui  $(G, \cdot)$  un grup y  $e$  un element neutre. Demostreu que si tots els elements  $x$  de  $G$  compleixen

$$x \cdot x = e$$

aleshores  $(G, \cdot)$  és abelià (o sigui, commutatiu).

**11E6.** En una circumferència de radi igual a la unitat es tracen dues cordes,  $AB$  i  $AC$  d'igual longitud.

a) Digueu com es pot construir una tercera corda  $DE$  de manera que quedi dividida en tres parts iguals per les interseccions amb  $AB$  i  $AC$ .

b) Si  $AB = AC = \sqrt{2}$ , digueu quant valen les longituds dels dos segments que la corda  $DE$  determina sobre  $AB$ .

**11E7.** Un dipòsit té forma de prisma hexagonal regular, les bases fan 1 m de costat i l'altura és de 10 m. Es situen les arestes laterals en posició obliqua i s'omple parcialment amb  $9 \text{ m}^3$  d'aigua. El pla de la superfície lliure de l'aigua talla totes les arestes laterals. Una d'elles queda amb una part de 2 m sota l'aigua. Quina part queda sota l'aigua de l'aresta lateral oposada a l'anterior?

**11E8.** Els costats d'un polígon regular convex del  $L+M+N$  costats s'han de dibuixar en tres colors:  $L$  han de ser vermells,  $M$  han de ser grocs i  $N$  han de ser blaus. Expressau, per mitjà de desigualtats, les condicions necessàries i suficients per tal que tingui solució (més d'una, en general) el problema de pintar els costats sense que dos de contigus tinguin el mateix color.

## Primera sessió

12C1. Estudieu el sistema

$$\begin{cases} \lambda x + y + z = \lambda^2 \\ x - y + z = 1 \\ 3x - y - z = 1 \\ 6x - y + z = 3\lambda \end{cases}$$

segons els valors del paràmetre  $\lambda$ .12C2. Donada la corba d'equació  $y^2 = x^2 - x^4$ , es demana

- Dibuixeu-la.
- Àrea de la superfície plana tancada per la corba.

12C3. Siguin  $P_0, P_1, P_2$  els afixos de  $i, 0, 1$ . Sigui  $P_3$  el peu de la perpendicular traçada des de  $P_2$  al segment  $P_0P_1$ ; anàlogament, sigui  $P_4$  el peu de la perpendicular traçada des de  $P_3$  al segment  $P_1P_2$ ; i així successivament. Trobeu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n.$$

12C4. Calculeu la potència  $n$ -èsima de la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

12C5. Donades les dues funcions

$$f(x) = \frac{3x}{5x^2 - 1}, \quad g(x) = \frac{7x}{8x^2 + 2},$$

a) Determineu els tres conjunts

$$A = \{x | f(x) = g(x)\}$$

$$B = \{x | f(x) > g(x)\}$$

$$C = \{x | f(x) < g(x)\}.$$

b) Si  $x$  és bastant gran, quina de les dues funcions és més gran?

12C6. Demostreu que si  $f(x)$  i  $g(x)$  són dos polinomis de grau  $n$ , aleshores l'expressió

$$f g^{(n)} - f' g^{(n-1)} + f'' g^{(n-2)} + \dots + (-1)^{n-1} f^{(n-1)} g' + (-1)^n f^{(n)} g$$

és independent de  $x$ .

12C7. Siguin  $a, b, a', b'$  nombres racionals,  $b, b'$  estrictament positius i  $\sqrt{b'}$  irracional. Demostreu que una qualsevol de les igualtats

$$a + \sqrt{b} = a' + \sqrt{b'}; \quad a - \sqrt{b} = a' - \sqrt{b'}$$

implica

$$a = a' \quad \text{i} \quad b = b'.$$

Aplicació: Digueu si és un enter

$$\sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}} + \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}}.$$

12C8. Les corbes  $y^2 = x$ ,  $y^2 = x^3$  limiten una regió en el primer quadrant. Es traça, dins de la regió, un rectangle amb els costats paral·lels als eixos. Una de les diagonals té els dos extrems un sobre cada corba. La dimensió horitzontal del rectangle és  $1/3$ . Trobeu l'àrea del rectangle d'àrea màxima que es pot construir d'aquesta manera.



## Primera sessió

12E1. Calculeu el límit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \frac{1}{n^k} + \frac{2^k}{n^k} + \cdots + \frac{(n-1)^k}{n^k} + \frac{n^k}{n^k} \right).$$

(Per a calcular el límit es pot seguir el procediment de construcció de la integral).

12E2. Estudieu la funció real

$$f(x) = \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x$$

definida pe  $x \in \mathbb{R} - [-1, 0]$ . Representació gràfica.

12E3. Designarem per  $Z_{(5)}$  un cert subconjunt del conjunt  $\mathbb{Q}$  dels nombres racionals. Un racional pertany a  $Z_{(5)}$  si i només si existeixen fraccions pertanyents a aquest racional tals que 5 no divideixi el seu denominador. (Per exemple, el nombre racional  $13/10$  no pertany a  $Z_{(5)}$ , ja que el denominador de totes les fraccions iguals a  $13/10$  és un múltiple de 5. En canvi, el nombre racional  $75/10$  pertany a  $Z_{(5)}$  ja que  $75/10 = 15/2$ ).

Contesteu raonadament les següents qüestions:

- Quina estructura algebraica (semigrup, grup, etc.) té  $Z_{(5)}$  respecte de la suma?
- I respecte del producte?
- És  $Z_{(5)}$  un subanell de  $\mathbb{Q}$ ?
- És  $Z_{(5)}$  un  $Z_{(5)}$ -espai vectorial?

(Les operacions són les habituals del cos dels nombres racionals).

12E4. Demostreu que si el producte de  $n$  nombres reals i positius és igual a 1, la seva suma és més gran o igual que  $n$ .

**12E5.** Tenim una recta  $r$  del pla i dos punts  $A$  i  $B$  exteriors a la recta i en el mateix semiplà. Determineu un punt  $M$  de la recta tal que l'angle de  $r$  amb  $AM$  sigui el doble del de  $r$  amb  $BM$ . (Considereu com a angle de dues rectes al més petit dels angles que formen).

**12E6.** Siguin  $\{x_n\}$  i  $\{y_n\}$  dues successions de nombres naturals definides així:

$$\begin{aligned} x_1 &= 1, & x_2 &= 1, & x_{n+2} &= x_{n+1} + 2x_n & \text{per a } n &= 1, 2, 3, \dots \\ y_1 &= 1, & y_2 &= 7, & y_{n+2} &= 2y_{n+1} + 3y_n & \text{per a } n &= 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Demostreu que, llevat del cas  $x_1 = y_1 = 1$ , no existeix cap valor natural que pertanyi a les dues successions.

**12E7.** Es considera la funció real definida per

$$f(x) = \frac{1}{|x+3| + |x+1| + |x-2| + |x-5|}$$

per tot  $x \in \mathbb{R}$ .

- Determineu el màxim.
- Representeu-la gràficament.

**12E8.** S'escullen aleatòriament dos nombres reals entre 0 i 1. Calculeu la probabilitat que un qualsevol d'ells sigui menor que el quadrat de l'altre.

## Primera sessió

13C1. Calculeu

$$\int_{-2}^{-1} \frac{1}{2} \sqrt{-4x^2 - 12x - 5} dx$$

per mitjà de la interpretació geomètrica.

13C2. Donats els vectors de l'espai vectorial  $\mathbb{R}^3$  sobre  $\mathbb{R}$ :  $a_1 = (1, 3, -2)$ ,  $a_2 = (4, -1, 3)$ ,  $a_3 = (-3, 17, -16)$ , trobeu la dimensió del subespai vectorial  $E$  generat per aquests tres vectors. Donat el vector  $a_4 = (4, 0, m)$ , determineu  $m$  per tal que aquest vector pertanyi a  $E$ .

13C3. Es consideren tots els nombres naturals des de 1 fins a  $10^n$ . Calculeu, en funció de  $n$ , la probabilitat que triant-ne un a l'atzar, sigui múltiple de 2 o de 3.

13C4. A l'interior d'un quadrat  $ABCD$  de costat unitat s'agafa un punt  $P$  i es consideren les quatre distàncies  $PA$ ,  $PB$ ,  $PC$  i  $PD$ . Demostreu que

- 1) Com a màxim una de les distàncies és més gran que  $\sqrt{5}/2$ .
- 2) Com a màxim dues de les distàncies són més grans que 1.
- 3) Com a màxim tres de les distàncies són més grans  $\sqrt{2}/2$ .

**13C5.** Les corbes  $y = x^3$  i  $y = x^n$  amb  $n$  natural no nul, limiten una regió tancada. Calculeu-ne l'àrea en funció de  $n$ .

**13C6.** S'agafa un nombre  $A = a_1a_2a_3\dots$  i el nombre  $A' = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$  format per la suma de les xifres del nombre  $A$ . De la diferència dels dos,

$$A - A' = b_1b_2b_3\dots,$$

es treu una xifra  $b_i$ . Determineu el valor d'aquesta xifra si ens donen la suma  $B = b_1 + b_2 + b_3 + \dots$  de les restants xifres de  $A - A'$ . Estudieu si hi ha algun cas d'ambigüitat.

**13C7.** Determineu totes les  $n$ -ples  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  de nombres reals tals que

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$$

per totes les  $n$ -ples  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  que compleixin

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0.$$

**13C8.** Si es calcula aproximadament el quadrat d'un nombre decimal per mitjà d'una taula de quadrats de nombres naturals (fent servir la mateixa idea que per trobar el logaritme d'un nombre no contingut en una taula), demostreu que l'error comès és menor o igual que 0.25.

## Primera sessió

**13E1.** En un pla es donen quatre punts fixos  $A, B, C, D$  no alineats tres a tres. Construïu un quadrat de costats  $a, b, c, d$  de forma que  $A \in a, B \in b, C \in c, D \in d$ .

**13E2.** Es considera el conjunt  $C$  de totes les  $r$ -ples les components de les quals són  $1$  o  $-1$ . Calculeu la suma de totes les components de tots els elements de  $C$  excloent la  $r$ -pla  $(1, 1, 1, \dots, 1)$ .

**13E3.** A través d'una lent que inverteix la imatge mirem el mirall retrovisor del nostre cotxe. Si en aquest mirall s'hi reflecteix la matrícula del cotxe que ens segueix, CS-3965-EN, dibuixeu la imatge que nosaltres rebem. Dibuixeu també la que s'obté de permutar les anteriors transformacions, és a dir, reflectint en el retrovisor la imatge que dóna la lent de la matrícula. És commutatiu el producte de les dues transformacions, la reflexió en el mirall i la refracció a través de la lent?

**13E4.** Demostreu que l'expressió

$$\frac{n^5 - 5n^3 + 4n}{n + 2}$$

on  $n$  és un enter qualsevol, és sempre divisible per 24.

**13E5.** Demostreu que l'equació

$$z^4 + 4(i + 1)z + 1 = 0$$

té una arrel a cada quadrant del pla complex.

**13E6.** Donada una matriu quadrada  $M$  d'ordre  $n$  sobre el cos dels nombres reals, trobeu, en funció de  $M$ , dues matrius, una simètrica i una altra antisimètrica, tals que la seva suma sigui precisament  $M$ .

**13E7.** El preu d'un diamant és proporcional al quadrat del seu pes. Demostreu que si el trenquem en dues parts el seu preu baixa. Quan és màxima la "depreciació"?

**13E8.** Es dona la funció

$$y = |x^2 - 4x + 3|.$$

Estudieu-ne la continuïtat i derivabilitat en el punt d'abscissa 1. La seva gràfica determina amb l'eix  $X$  una figura tancada. Determineu-ne l'àrea.

## Primera sessió

**14C1.** Siguin  $M$  el punt mitjà del costat  $BC$  i  $N$  el punt mitjà del costat  $DA$  del quadrat  $ABCD$ . Determineu simetries axials que aplicades successivament permetin transformar el triangle  $ABN$  en el  $CDM$ . S'ha de procurar que el nombre d'aquestes simetries sigui el més petit possible. Doneu els eixos de les simetries que es demanen, i l'ordre d'aplicació de les simetries.

**14C2.** Si  $a$  és un nombre real, designem per  $U_a$  l'aplicació de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  definida així:

$$U_a(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \in \mathbb{R} \text{ i } x < a, \\ 1, & \text{si } x \in \mathbb{R} \text{ i } x \geq a. \end{cases}$$

Estudieu si les aplicacions  $U_2$ ,  $U_4$  i  $U_5$  són linealment independents (considerades com elements de l'espai vectorial de les aplicacions de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , sobre el cos dels nombres reals).

**14C3.** L'Antoni, en Lluís i en Robert han rebut el regal d'un gos, un gat i un canari, i cada un d'ells vol quedar-se un animal. Estan d'acord en les condicions següents:

- 1) L'Antoni no es queda el gos.
- 2) Si en Robert es queda el canari, l'Antoni no es queda el gat.
- 3) Si en Lluís es queda el gos, l'Antoni es queda el gat; i viceversa: si l'Antoni es queda el gat, en Lluís es queda el gos.

Estudieu si hi ha algun repartiment possible dels animals que estigui d'acord amb les condicions. Si és així, digueu quins són aquests repartiments.

**14C4.** Sigui  $n$  un nombre natural. Demostreu que cap de les xifres 2, 4, 7, 9, pot ser l'últim dígit del nombre  $1 + 2 + 3 + \dots + n$ .

Segona sessió

**14C5.** Siguin  $A$  i  $B$  dos punt simètrics respecte de la bissectriu del primer quadrant. Siguin  $C$  i  $D$ , respectivament, els afixos dels complexos suma i producte dels complexos determinats per  $A$  i  $B$ . Es demana:

- 1) Els llocs geomètrics de  $A$  i  $B$  quan l'angle  $\widehat{CBD}$  es de  $90^\circ$ .
- 2) Els llocs geomètrics de  $C$  i  $D$ .

**14C6.** Siguin els  $h$  nombres reals  $a_1, a_2, \dots, a_h$ , ( $h$  fix). Calculeu, si  $n \rightarrow \infty$ , el límit de la successió de terme general

$$b_n = \left( \frac{a_1^{1/n} + a_2^{1/n} + \dots + a_h^{1/n}}{h} \right)^n.$$

Apliqueu-ho al cas  $h = 3$ ,  $a_1 = 2$ ,  $a_2 = 4$  i  $a_3 = 8$ .

**14C7.** Es considera l'equació de segon grau amb paràmetre  $m$

$$x^2 + (m - 2)x - (m + 3) = 0.$$

- 1) Calculeu  $m$  per tal que la suma dels quadrats de les arrels sigui mínim.
- 2) Calculeu  $m$  per tal que la suma dels quadrats de les arrels més el quadrat del producte de les arrels sigui mínim.

**14C8.** Dues ciutats,  $A$  i  $B$ , estan unides per una via de ferrocarril recta. A les 12 h surten de la ciutat  $A$  una locomotora  $L_A$  i una mosca  $M$ , en la direcció de la ciutat  $B$ . A la mateixa hora surt de la ciutat  $B$ , en direcció a la ciutat  $A$ , una locomotora  $L_B$ . Les velocitats uniformes respectives de  $L_A$ ,  $L_B$  i  $M$  són 30, 40 i 45 Km/h. La mosca es mou sobre la via segons el criteri següent: després de sortir de  $A$ , quan troba  $L_B$  retrocedeix fins trobar  $L_A$ ; torna a retrocedir fins a trobar novament  $L_B$ , i així successivament. Si la longitud de la via és de 350 Km, digueu quina distància ha recorregut la mosca des de la sortida a  $A$  fins que és aixafada per les dues locomotores.

---

**Guanyadors:** Jaime Doménech Plana, José A. Román Jiménez, Antonio Llorens Tubau.



## Primera sessió

14C1. Siguin  $M$  el punt mitjà del costat  $BC$  i  $N$  el punt mitjà del costat  $DA$  del quadrat  $ABCD$ . Determineu simetries axials que aplicades successivament permetin transformar el triangle  $ABN$  en el  $CDM$ . S'ha de procurar que el nombre d'aquestes simetries sigui el més petit possible. Doneu els eixos de les simetries que es demanen, i l'ordre d'aplicació de les simetries.

14C2. Si  $a$  és un nombre real, designem per  $U_a$  l'aplicació de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  definida així:

$$U_a(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \in \mathbb{R} \text{ i } x < a, \\ 1, & \text{si } x \in \mathbb{R} \text{ i } x \geq a. \end{cases}$$

Estudieu si les aplicacions  $U_2$ ,  $U_4$  i  $U_5$  són linealment independents (considerades com elements de l'espai vectorial de les aplicacions de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , sobre el cos dels nombres reals).

14C3. L'Antoni, en Lluís i en Robert han rebut el regal d'un gos, un gat i un canari, i cada un d'ells vol quedar-se un animal. Estan d'acord en les condicions següents:

- 1) L'Antoni no es queda el gos.
- 2) Si en Robert es queda el canari, l'Antoni no es queda el gat.
- 3) Si en Lluís es queda el gos, l'Antoni es queda el gat; i viceversa: si l'Antoni es queda el gat, en Lluís es queda el gos.

Estudieu si hi ha algun repartiment possible dels animals que estigui d'acord amb les condicions. Si és així, digueu quins són aquests repartiments.

14C4. Sigui  $n$  un nombre natural. Demostreu que cap de les xifres 2, 4, 7, 9, pot ser l'últim dígit del nombre  $1 + 2 + 3 + \dots + n$ .

**14E5.** Utilitzant una escala mecànica per baixar a l'estació del Metro i caminant amb pas regular, observo que necessito 50 graons per baixar. Si torno a pujar corrents, a una velocitat 5 vegades el meu pas normal anterior, comprovo que necessito 125 graons per arribar a dalt. Quants graons visibles té l'escala mecànica quan està parada?

**14E6.** Sigui  $ABC$  un triangle i  $D$  el punt de tall de la bissectriu corresponent a l'angle  $A$  amb el costat  $BC$ . Demostreu que la circumferència que passa per  $A$  i és tangent a la recta  $BC$  en  $D$ , també és tangent a la circumferència circumscrita al triangle  $ABC$ .

**14E7.** Tenim els nombres  $A_1, A_2, \dots, A_n$ . Demostreu, sense necessitat de calcular derivades, que el valor de  $X$  que fa mínima la suma

$$(X - A_1)^2 + (X - A_2)^2 + \dots + (X - A_n)^2$$

és, precisament, la mitjana aritmètica dels nombres donats.

**14E8.** Determineu una condició necessària i suficient per tal que els afixos de tres nombres complexos  $z_1, z_2$  i  $z_3$  siguin els vèrtexs d'un triangle equilàter.

Primera sessió. Abril de 1979.

15C1. Sigui el polinomi  $p(x) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$ . Demostreu que per a tot  $n$  natural més gran que 2, es compleix:

a)  $p(n) = 6h$ , on  $h$  és un natural.

b)  $h + 1$  no és primer.

15C2. Un tetràedre de l'espai euclidià  $E_3$  té dos parells d'arestes oposades ortogonals. Demostreu que el tercer parell també ho és.

15C3. La fórmula de de Moivre, vàlida per exponents naturals, és

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = \cos n\alpha + i \sin n\alpha.$$

És aplicable aquesta fórmula amb exponents racionals? En cas negatiu, tracteu d'obtenir-ne una generalització resolent l'equació

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^{p/q} = \cos x + i \sin x.$$

15C4. Tenim tres bosses i cada una conté  $n$  boles numerades  $1, 2, \dots, n$ . S'extreu a l'atzar una bola de cada bossa. Siguin  $x, y, z$  els números de les boles tretes. Calculeu la probabilitat que  $x + y = z$ .

*Nota: Durant el curs 1977-78 no es va celebrar Olimpíada Matemàtica.*

15C5. Siguin  $\gamma_1$  i  $\gamma_2$  dues circumferències exteriors i  $r$  una recta exterior a les dues que les deixa en un mateix semiplà. Determineu els punts  $P$  d'aquesta recta que tenen la propietat que les tangents traçades des de  $P$  a les circumferències formin amb  $r$  angles iguals.

15C6. Proveu que per tot enter positiu  $n$ , el nombre  $a = 3^n - 2n^2 - 1$  és divisible per 8. Demostreu també que si  $n$  no és múltiple de 3, el nombre  $a$  definit abans, és divisible per 24.

15C7. Trobeu una funció  $f$  definida a l'interval  $[-3, 0]$ , contínua, derivable i positiva, tal que:

- a) Per  $x = -1$  té un extrem relatiu.
- b) L'àrea limitada pel gràfic de la funció, l'eix d'abscisses i les rectes  $x = -3$  i  $x = 0$  val 6 unitats d'àrea.
- c)  $f(-1) = 1$ .

15C8. Trobeu el valor de  $(1 + i\sqrt{3})^n - (1 - i\sqrt{3})^n$ , essent  $n$  un nombre natural múltiple de 3.

Primera sessió. Juny de 1979.

**15E1.** Calculeu l'àrea de la intersecció de l'interior de l'el·lipse

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$$

amb el cercle limitat per la circumferència  $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ .

**15E2.** Cert professor d'Oxford, destinat als serveis de criptografia de l'espionatge britànic, paper interpretat per Dirk Bogarde a la pel·lícula, recruta el personal proposant petits exercicis d'atenció, com ara llegir mentalment una paraula al revés. Freqüentment ho fa amb el seu propi nom: SEBASTIAN s'ha de llegir NAITSALES.

Es pregunta si hi ha algun moviment del pla o de l'espai que transformi un d'aquests mots en l'altre, tal com apareixen escrits. I si s'hagues dit AVITO, com un cert personatge d'Unamuno? Expliqueu raonadament cada resposta.

**15E3.** Demostreu la igualtat

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}.$$

**15E4.** Si  $z_1, z_2$  són les arrels de l'equació amb coeficients reals  $z^2 + az + b = 0$ , proveu que  $z_1^n + z_2^n$  és un nombre real per a qualsevol valor natural de  $n$ . En el cas particular de l'equació  $z^2 - 2z + 2 = 0$  expresseu, en funció de  $n$ , aquesta suma.

**Nota:** Durant el curs 1977-78 no es va celebrar Olimpíada Matemàtica.

Segona sessió. Juny de 1979.

15E5. Calculeu la integral definida

$$\int_2^4 \sin((x-3)^3) dx.$$

15E6. Es col·loquen tres boles en una urna pel següent procediment: es tira una moneda tres vegades i s'introdueix, cada vegada que surt cara una bola blanca a l'urna, i cada vegada que surt creu, una bola negra. Extraïem d'aquesta urna, quatre vegades consecutives, una bola; la retornem a l'urna abans de l'extracció següent. Quina és la probabilitat que en les quatre extraccions obtinguem bola blanca?

15E7. Proveu que el volum d'un pneumàtic (tor) és igual al volum d'un cilindre la base del qual és una secció meridiana d'aquell i que té per altura la longitud de la circumferència formada pels centres de les seccions meridians.

15E8. Donat el polinomi

$$P(x) = 1 + 3x + 5x^2 + 7x^3 + \dots + 1001x^{500},$$

expresseu el valor numèric de la seva derivada d'ordre 325 al punt  $x = 0$ .

---

**Guanyadors:** Carles Casacuberta Vergés, Jesús Nieves Espuelas, Jorge Mas Trullenque.

## Primera sessió.

**16C1.** Sabent que 75 bous mengen en 12 dies l'herba d'un prat de 60 àrees, i que 81 bous mengen en 15 dies l'herba d'un altre prat de 72 àrees, trobeu quants bous caldran per menjar en 18 dies l'herba d'un prat de 96 àrees. Se suposa que en els tres prats l'herba té la mateixa altura en el moment d'entrar-hi els bous i que continua creixent uniformement després que hi hagin entrat.

**16C2.** Tenim la paràbola  $y = ax^2$  i dos dels seus punts  $A$  i  $B$  d'abscisses  $x_1 < x_2$ .

a) Calculeu, en funció de  $x_1$ ,  $x_2$  l'àrea del triangle  $ABC$ , essent  $C$  el punt de la paràbola en el qual la tangent és paral·lela a la recta  $AB$ .

b) Aplicant reiteradament el procés anterior, calculeu l'àrea del segment de paràbola limitat per la corda  $AB$ .

**16C3.** Siguin  $z$  i  $w$  dos nombres complexos que compleixen la relació

$$w = \frac{az + b}{cz + d},$$

on  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  són reals. Demostreu que si  $ad - bc > 0$ , llavors les parts imaginàries de  $z$  i  $w$  tenen el mateix signe.

(Observació: Calculeu  $w - \bar{w}$ , on  $\bar{w}$  és el conjugat de  $w$ ).

**16C4.** A  $\mathbb{R}^3$  es considera el tetràedre  $DABC$ .

a) Demostreu que les rectes que uneixen cada un dels vèrtexs del tetràedre amb el baricentre de la cara oposada, es tallen en un punt  $G$ .

b) Demostreu que els vectors que uneixen el punt  $D$  amb cada un dels baricentres de les cares del tetràedre que passen per  $D$ , són una base de l'espai vectorial dels vectors lliures de  $\mathbb{R}^3$ .

c) Calculeu les components del vector  $DG$  respecte de la base de l'apartat b).

16C5. A partir de un significat geomètric de la integral definida, calculeu

$$\int_{-2}^0 \sqrt{-x^2 - 2x} dx.$$

16C6. Demostreu que si els costats d'un triangle estan en progressió geomètrica, la raó està compresa entre

$$\frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \quad ; \quad \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

16C7. En el congrés d'un partit polític hi assisteixen tots els afiliats, que són 2000 en total. Un periodista observa que, dels presents en una sessió, el 12.1212...% són dones, i el 23.423423...% pertanyen a la branca radical. Es demana el nombre d'afiliats que falten en aquesta sessió.

16C8. Es considera la successió recurrent

$$a_{n+1} = a_n^2 - 2 \quad \text{amb} \quad a_1 = 14.$$

Demostreu per inducció que, per a tot  $n \geq 1$ , el nombre

$$\sqrt{3(a_n^2 - 4)}$$

és un enter divisible per 4. Com a aplicació, demostreu que existeixen infinits triangles tals que els costats mesuren enters consecutius i l'àrea és també un nombre enter.



Primera sessió.

**16E1.** D'entre tots els triangles que tenen un costat de 5 m de longitud i l'angle oposat de  $30^\circ$ , determineu el d'àrea màxima, calculant el valor dels altres dos angles i l'àrea del triangle.

**16E2.** Una urna conté els vots per a l'elecció de dos candidats  $A$  i  $B$ . Se sap que el candidat  $A$  té 6 vots segurs i el candidat  $B$  en té 9. Trobeu la probabilitat que, en efectuar l'escrutini, sempre vagi per davant el candidat  $B$ .

**16E3.** Demostreu que si  $a_1, a_2, \dots, a_n$  són nombres reals positius, aleshores

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \left( \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2.$$

Digueu quan és vàlida la igualtat.

**16E4.** Trobeu la funció  $f(x)$  que compleix l'equació

$$f'(x) + x^2 f(x) = 0$$

sabent que  $f(1) = e$ . Representeu gràficament aquesta funció i calculeu la tangent en el punt de la corba d'abscissa 1.

**16E5.** Demostreu que si  $x$  és tal que

$$x + \frac{1}{x} = 2 \cos \alpha$$

llavors, per a tot  $n = 0, 1, 2, \dots$ ,

$$x^n + \frac{1}{x^n} = 2 \cos n\alpha.$$

**16E6.** Demostreu que si al producte de quatre nombre naturals consecutius s'afageix una unitat, el resultat és un quadrat perfecte.

**16E7.** El punt  $M$  varia sobre el segment  $AB$  que mesura  $2m$ .

a) Trobeu l'equació i la representació gràfica del lloc geomètric dels punts del pla les coordenades dels quals,  $x$ ,  $y$ , són, respectivament, les àrees dels quadrats de costats  $AM$  i  $BN$ .

b) Digueu quina classe de corba és. (Suggeriment: feu un gir d'eixos de  $45^\circ$ ).

c) Trobeu l'àrea del recinte comprés entre la corba obtinguda i els eixos de coordenades.

**16E8.** Determineu tots els triangles tals que les longituds dels tres costats i la seva àrea són quatre nombres naturals consecutius.

Primera sessió. 24 d'Abril de 1981.


**17C1.** Tres nombres diferents posats en un cert ordre estan en progressió aritmètica, i posats en un altre ordre estan en progressió geomètrica. Busqueu la raó d'aquesta progressió geomètrica.

**17C2.** Calculeu

$$\int_3^6 ([x] + \sqrt{x - [x]}) dx,$$

on  $[x]$  designa la part entera del nombre real  $x$ .

**17C3.** Un trapezi té els dos vèrtexs  $C, D$  d'una base fixos. L'altra base  $AB$  és de longitud constant i la suma de les longituds dels costats  $CA$  i  $DB$  també és constant. Trobeu la figura que descriu el punt  $M$  intersecció de les rectes  $CA$  i  $DB$ .



Segona sessió. 25 d'Abril de 1981.

**17C4.** Direm que un políedre és *regular* si totes les cares són polígons del mateix nombre  $k$  de costats i a cada vèrtex hi concorren el mateix nombre  $n$  d'arestes. Utilitzant que el nombre de cares menys el d'arestes més el de vèrtexs d'un políedre és sempre 2, demostreu que els únics políedres regulars són el tetràedre, l'hexàedre, l'octàedre, el dodecàedre i l'icosàedre.

**17C5.** Tres jugadors convenen que quan un perdi una partida donarà a cada un dels altres la quantitat de diners que en aquell moment tingui cada un. Després de jugar tres partides cada un d'ells en perd una i es retiren amb 40 duros cada un. Quants duros tenien en començar?

**17C6.** Sigui  $A$  l'àrea d'un pentàgon regular i  $a$  l'àrea del pentàgon format per les diagonals del primer. Demostreu que

$$a = A \left( \frac{\sin 18^\circ}{1 - 2 \sin^2 18^\circ} \right)^2.$$

Primera sessió. Juny de 1981.

17E1. Calculeu la suma de  $n$  sumands

$$7 + 77 + 777 + \cdots + 7 \dots 7.$$

17E2. Un vas de vidre cilíndric té 8 cm d'altura i la seva vora, 12 cm de circumferència. Al seu interior, a 3 cm de la vora, hi ha una diminuta gota de mel. En un punt de la superfície exterior, en el pla que passa per l'eix del cilindre i per la gota de mel, i situat a 1 cm de la base (fons) del vas, hi ha una mosca. Digueu quin és el camí més curt que ha de recórrer la mosca caminant per la superfície del vas, per tal d'arribar a la gota de mel. Trobeu també la longitud d'aquest camí.

17E3. Donades les rectes que es creuen  $r$  i  $s$ , es consideren les rectes  $u$  i  $v$  tals que:

a)  $u$  és simètrica de  $r$  respecte de  $s$ ,

b)  $v$  és simètrica de  $s$  respecte de  $r$ .

Determineu l'angle que han de formar les rectes donades per tal que  $u$  i  $v$  siguin coplanàries.

17E4. Calculeu la integral

$$\int \frac{dx}{\sin(x-1)\sin(x-2)}.$$

Suggeriment: Canvi  $\tan x = t$ .

Segona sessió. Juny de 1981.

**17E5.** Donat un nombre natural no nul  $n$ , sigui  $f_n$  la funció de l'interval tancat  $[0, 1]$  en  $\mathbb{R}$  definida així:

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2x, & \text{si } 0 \leq x < 1/n \\ 3/n, & \text{si } 1/n \leq x \leq 1. \end{cases}$$

a) Representeu gràficament la funció.

b) Calculeu  $A_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ .

c) Trobeu, si existeix,  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ .

**17E6.** Demostreu que la transformació producte de la simetria de centre  $(0, 0)$  per la simetria d'eix la recta d'equació  $x = y + 1$ , pot expressar-se com a producte d'una simetria d'eix la recta  $e$  per una translació de vector  $\vec{v}$ , amb  $e$  paral·lela a  $\vec{v}$ . Determineu una recta  $e$  i un vector  $\vec{v}$  que compleixin les condicions indicades. Són únics  $e$  i  $\vec{v}$ ?

**17E7.** En una fàbrica de pilotes de tennis hi ha 4 màquines  $m_1, m_2, m_3, m_4$ , que produeixen, respectivament, el 10%, 20%, 30% i 40% de les boles que surten de la fàbrica. La màquina  $m_1$  introdueix defectes en un 1% de les boles que fabrica, la màquina  $m_2$  en el 2%, la  $m_3$  en el 4% i la  $m_4$  en el 15%. De totes les pilotes fabricades en un dia, se'n tria una a l'atzar i resulta ser defectuosa. Digueu quina és la probabilitat que aquesta bola hagi estat elaborada per la màquina  $m_3$ .

**17E8.** Si  $a$  és un nombre senar, demostreu que

$$a^4 + 4a^3 + 11a^2 + 6a + 2$$

és una suma de tres quadrats i que és divisible per 4.

---

**Guanyadors:** Pablo Álvarez Royo-Villanova, Fernando Barbero González, Fernando Etayo Gordejuela.


Primera sessió. 7 de Maig de 1982, tarda.

**18C1.** Sabent que en un cert instant la busca petita d'un rellotge està entre les 10 i les 11, i la busca gran entre la 1 i les 2, i que al cap d'un cert temps les busques han intercanviat els seus llocs, calculeu el temps transcorregut entre aquests dos instants.

**18C2.** Un cos sòlid té per base un cercle de radi  $r$  i tota secció ortogonal a un diàmetre fix és un triangle equilàter. Calculeu:

- la naturalesa de la corba que determina el llom del sòlid;
- el volum del cos.

**18C3.** Sabent que les figures  $A$ ,  $B$ ,  $C$  del croquis són iguals, calculeu la seva àrea. (Tots els angles són rectes i els segment rectilinis.)




Segona sessió. 8 de Maig de 1982, matí.

18C4. Un safareig té tres aixetes  $A$ ,  $B$  i  $C$ . Si obrim  $A$  i  $B$  el safareig s'omple en dues hores, si obrim  $A$  i  $C$  s'omple en tres hores i si obrim  $B$  i  $C$  s'omple en sis hores. Quant tardaria a omplir-se el safareig si les obrim totes tres alhora?

18C5. Quatre esferes descansen totes sobre un mateix pla. Cada esfera és tangent a les altres tres. Se sap que tres de les esferes tenen el mateix radi  $R$ . Es demana el radi  $r$  de la quarta esfera en funció de  $R$ .

18C6. Tenim  $n$  boles i sabem que comptades de 8 en 8 en queden 7, comptades de 9 en 9 en queden 8 i comptades de 10 en 10 en queden 9. Podem saber quantes en queden comptades de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6 i de 7 en 7?





Primera sessió. Juny de 1982.

**18E1.** A la pàgina de passatemps d'un diari es proposa el passatemps següent: "Dos nens, Antoni i Josep, tenen 160 tebeos. Antoni compta els seus de 7 en 7 i li'n sobren 4. En Josep compta els seus de 8 en 8 i també li'n sobren 4. Quants tebeos tenen cada un?" Al següent número del diari es dóna la solució: "L'Antoni té 60 tebeos i en Josep en té 100." Analitza aquesta solució i indica què faria una matemàtic amb aquest problema.

**18E2.** En compondre una simetria d'eix  $r$  amb un gir d'angle recte al voltant d'un punt  $P$  que no pertany a la recta, resulta un moviment  $M$ .

És  $M$  una simetria axial? Hi ha alguna recta invariant per  $M$ ?

**18E3.** Es llança un coet i arriba als 120 m d'altura; a la caiguda perd 60 m, a continuació recupera 40 m, torna a perdre'n 30, a guanyar-ne 24, a perdre'n 20, etc.

Si el procés segueix indefinidament, a quina altura tendeix a establitzar-se?

**18E4.** Determineu un polinomi de coeficients reals no negatius que compleixi les dues condicions següents:

$$p(0) = 0, \quad p(|z|) \leq x^4 + y^4,$$

essent  $|z|$  el mòdul del nombre complex  $z = x + iy$ .

18E5. Construïu un quadrat coneixent la suma de la diagonal i el costat.

18E6. Demostreu que si  $u, v$  són nombres reals no negatius qualssevol, i  $a, b$  nombres reals positius tals que  $a + b = 1$ , aleshores

$$u^a v^b \leq au + bv.$$

18E7. Sigui  $S$  el subconjunt de nombres racionals que es poden escriure en la forma  $a/b$ , on  $a$  és un enter qualsevol i  $b$  un enter senar. Digueu si la suma i el producte de dos elements de  $S$  també hi pertanyen. Digueu si a  $S$  hi ha elements tals que l'invers també hi pertany.


18E8. Donat un conjunt  $C$  de punts del pla, s'anomena distància d'un punt  $P$  del pla al conjunt  $C$  a la més petita de les distàncies de  $P$  a cada un dels punts de  $C$ . Siguin els conjunts  $C = \{A, B\}$ , amb  $A = (1, 0)$  i  $B = (2, 0)$ ; i  $C' = \{A', B'\}$  amb  $A' = (0, 1)$  i  $B' = (0, 7)$ , en un sistema de referència ortogonal.

Trobeu i dibuixeu el conjunt  $M$  de punts del pla que equidisten de  $C$  i  $C'$ .

Estudieu si és derivable la funció que té per gràfic el conjunt  $M$  obtingut abans.

Primera sessió. 17 de Desembre de 1982, de 16 h a 20 h.

19C1. Sobre un quadrat  $LMNR$  de costat 1 tenim tres punts  $A$ ,  $B$ ,  $C$  tals que les figures  $ALB$ ,  $ARC$  i  $BMNC$  tenen la mateixa àrea. Calculeu l'àrea màxima i mínima del triangle  $ABC$ .



19C2. Determineu els nombres naturals  $n$  que divideixen tots els nombres naturals les darreres xifres dels quals són exactament les xifres de  $n$ .

19C3. Demostreu que si  $0 < t < \pi$  aleshores  $\sin(t/2) > t/\pi$ .

19C4. Es posa una rata en una caixa que té quatre sortides aparentment iguals. Una de les sortides es considera *bona* i es altres *dolentes*; si la rata tria una sortida dolenta, rep una decàrrega elèctrica que no la deixa sortir. Es demana quina és la probabilitat que la rata surti de la caixa en un màxim de tres intents, considerant:

- que la rata no té memòria;
- que la rata té memòria.

Segona sessió. 18 de Desembre de 1982, de 9 h a 13 h.

19C5. Diguen en quants zeros acaba el nombre 1000!

19C6. Diguen quina condició han de complir els nombres complexos  $\alpha$  i  $\beta$  per tal que els punts  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha + \beta$  i  $\alpha\beta$  siguin vèrtexs d'un paral·lelogram.



19C7. Sigui  $O$  l'ortocentre d'un triangle (és a dir, el punt d'intersecció de les altures), i  $A$  i  $B$  els punts d'intersecció d'una altura amb el costat corresponent i amb la circumferència circumscrita al triangle, respectivament. Hi ha alguna relació entre els segments  $OA$  i  $OB$ ?

19C8. Determineu el volum mínim  $V_n$  d'una piràmide regular recta de  $n$  costats circumscrita a una esfera donada. Calculeu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_n.$$

Primera sessió. Febrer de 1983.

**19E1.** Mentre Teofrast parlava amb Aristòtil sobre la classificació de les plantes, tenia un gos lligat a una columna cilíndrica de radi  $r$  perfectament llisa, amb una corda molt fina que envoltava la columna i amb un llaç de baga escorredora. El gos estava lligat a l'extrem lliure de la corda. En intentar arribar a Teofrast, el gos va tibar la corda i la trencà. Digueu quina era la distància de la columna al nus en el moment de trencar-se.

**19E2.** Construïu un triangle coneixent un angle, la raó dels costats que el formen i el radi del cercle inscrit.

**19E3.** Una semicircumferència de radi  $r$  es divideix en  $n + 1$  parts iguals i s'uneix un punt qualsevol  $k$  de la divisió amb els extrems de la semicircumferència, formant així un triangle  $A_k$ . Calculeu el límit, quan  $n$  tendeix a infinit, de la mitjana aritmètica de les àrees dels triangles.

**19E4.** Determineu el nombre d'arrels reals de l'equació

$$16x^5 - 20x^3 + 5x + m = 0.$$

**19E5.** Trobeu les coordenades dels vèrtexs d'un quadrat  $ABCD$ , sabent que  $A$  és sobre la recta  $y - 2x - 6 = 0$ ,  $C$  és sobre  $x = 0$  i  $B$  és el punt  $(a, 0)$ , essent  $a = \log_{2/3}(16/81)$ .

**19E6.** En una cafeteria, un vas de llimonada, tres entrepans i set ensaïmades han costat 1 xelí i 2 penics; i un vas de llimonada, quatre entrepans i 10 ensaïmades valen 1 xelí i 5 penics. Trobeu el preu de:

- a) un vas de llimonada, un entrepà i una ensaïmada;
  - b) dos vasos de llimonada, tres entrepans i cinc ensaïmades.
- (1 xelí = 12 penics).

**19E7.** Un tetràedre regular d'aresta 30 cm descansa sobre una de les seves cares i és buit per dintre. Es posa a l'interior 2 l d'aigua. Es demana l'altura de la superfície líquida i l'àrea de la superfície lliure de l'aigua.

**19E8.** L'any 1960, el més gran de tres germans té una edat que és la suma de les dels dos germans més petits. Uns anys després, la suma de les edats de dos dels germans és doble que l'edat de l'altre. Han passat ara un nombre d'anys des de 1960, que és igual a dues terceres parts de la suma de les edats que els tres germans tenien el 1960, i un d'ells té 21 anys. Quina edat tenen els altres dos?

Primera sessió. 16 de Desembre de 1983, de 16 h a 20 h.

20C1. Trobeu totes les funcions  $f$ , definides en el conjunt dels nombres reals estrictament positius, que prenen valors reals estrictament positius, i que compleixen

$$1) \quad f(xf(y)) = yf(x) \quad \text{per a tot } x, y \text{ positius.}$$

$$2) \quad f(x) \rightarrow 0 \quad \text{si } x \rightarrow +\infty.$$

20C2. Determineu els triangles tals que l'altura i la mitjana concurrents en un vèrtex divideixen l'angle en tres parts iguals.

20C3. Demostreu que si la funció  $f(x)$  és contínua, positiva i decreixent per a  $x \geq 0$ , i compleix

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x f(t) dt = S,$$

aleshores

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

Segona sessió. 17 de Desembre de 1983, de 9 h a 13 h.

20C4. Donat un triangle  $ABC$ , considerem el triangle  $A_1B_1C_1$  que té els vèrtexs sobre els costats oposats a  $A$ ,  $B$  i  $C$ , respectivament, i els seus costats són perpendiculars als costats del primer triangle. Calculeu la raó de les àrees dels dos triangles en funció dels angles del triangle  $ABC$ .

20C5. Trobeu el mínim nombre natural  $m$  tal que  $m!$  és divisible per  $7^{1983}$ .

20C6. Donat un triangle equilàter, considerem les rectes que passen pel punt mitjà d'un costat. Estudieu la variació de la longitud dels segments d'aquestes rectes interceptats pel triangle.

---

Guanyadors: NO EN QUEDA CONSTÀNCIA A LA SCM.



Primera sessió. Febrer de 1984.

**20E1.** En una posició  $O$  d'un aeroport de campanya hi ha un canó que pot girar  $360^\circ$ . Dos tancs ataquen aquest lloc seguint trajectòries rectes  $AB$  i  $CD$  donades. Trobeu gràficament l'abast del canó sabent que la suma de les longituds dels segments de trajectòria dels tancs en els quals aquests estan sota el foc del canó, és una longitud donada  $\ell$ .

**20E2.** Determineu un nombre de cinc xifres tal que el seu quadrat acabi en les mateixes cinc xifres col·locades en el mateix ordre.

**20E3.** Donats dos nombres reals positius  $p, q$  tals que  $p + q = 1$ , i sabent que tot parell de nombres reals  $x, y$  compleix  $(x - y)^2 \geq 0$ , es demana que demostreu

a) 
$$\frac{x + y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

b) 
$$\frac{x^2 + y^2}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^2$$

a) 
$$\left(p + \frac{1}{p}\right)^2 + \left(q + \frac{1}{q}\right)^2 \geq \frac{25}{2}$$

**20E4.** Calculeu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}.$$

**20E5.** Portem arcs iguals  $AB = A'B' = x$  sobre dues circumferències iguals a partir de dos punts fixos  $A, A'$  sobre cada una d'elles. Trobeu el lloc geomètric dels punts mitjans del segment  $BB'$  en variar  $x$ :

- a) si posem els arcs en el mateix sentit,
- b) si posem els arcs en sentits oposats.

**20E6.** Es considera una circumferència  $\gamma$  de centre  $(3, 0)$  i radi 3, i la recta  $r$  paral·lela a l'eix  $Ox$  que dista 3 de l'origen. Es traça una recta variable per l'origen que talla  $\gamma$  en el punt  $M$  i talla la recta  $r$  en  $P$ . Determineu el lloc geomètric dels punts d'intersecció de les paral·leles a  $Ox$  i  $Oy$  traçades per  $M$  i  $P$  respectivament.

**20E7.** Es consideren nombres naturals escrits en el sistema de base 10.

- a) Trobeu el menor nombre que en suprimir-li la primera xifra quedi reduït a la cinquena part. Digueu com són els nombres que tenen aquesta propietat.
- b) Demostreu que no existeix cap nombre tal que en suprimir-li la primera xifra quedi dividit per 12.
- c) Formuleu un criteri general que ens permeti saber si un nombre pot quedar dividit per  $k$  en suprimir-li la primera xifra.

**20E8.** Trobeu el residu de la divisió per  $x^2 - 1$  del determinant

$$\begin{vmatrix} x^3 + 3x & 2 & 1 & 0 \\ x^2 + 5x & 3 & 0 & 2 \\ x^4 + x^2 + 1 & 2 & 1 & 3 \\ x^5 + 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Primera sessió. 18 de Gener de 1985, de 16 h a 20 h.

**21C1.** Digueu quins són els triangles que poden ser dividits per una recta en dos triangles semblants.

**21C2.** La suma de dos nombres reals és igual a la suma dels seus quadrats. Digueu:

- Els valors que pot tenir aquesta suma.
- Els valors que poden tenir cada un dels nombres.
- Si els dos nombres poden ser iguals.
- El màxim de la diferència d'aquests dos nombres.

**21C3.** Resoleu l'equació

$$\cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x = 1.$$

21C4. Demostreu que tot triangle pot subdividir-se en triangles acutangles.

21C5. Tres nombres diferents estan en progressió aritmètica i els seus quadrats estan en progressió geomètrica. Calculeu la raó de la progressió geomètrica.

21C6. Un hostel té infinites portes numerades amb els números  $1, 2, 3, \dots$ , i estan totes tancades. En aquest hostel hi ha infinits hostes que estan numerats també  $1, 2, 3, \dots$ , i tots són a passejar. Quan l'hoste  $A$  torna a l'hostal obre totes les portes múltiples de  $A$  que troba tancades i tanca totes les portes múltiples de  $A$  que troba obertes. Digueu com estaran les portes quan hagin arribat tots els hostes.

Primera sessió. Febrer de 1985.

**21E1.** Sigui  $\mathcal{P}$  el conjunt dels punts del pla i  $f: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$  una aplicació que compleix les tres condicions següents:

- $f$  és bijectiva.
- Per cada recta  $r$  del pla,  $f(r)$  és una recta.
- Per cada recta  $r$ , la recta  $f(r)$  és paral·lela o coincident amb  $r$ .

Digueu quines possibles transformacions poden ser  $f$ .

**21E2.** Sigui  $\mathbb{Z}$  el conjunt dels enters i  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  el conjunt de parells ordenats d'enters. La suma d'aquests parells es defineix

$$(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b'),$$

essent  $(-a, -b)$  l'oposat de  $(a, b)$ .

Estudieu si existeix un subconjunt  $E$  de  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  que compleixi les condicions següents:

- La suma de dos parells de  $E$  també és a  $E$ .
- El parell  $(0, 0)$  pertany a  $E$ .
- Si  $(a, b)$  no és  $(0, 0)$ , llavors o bé  $(a, b)$  pertany a  $E$ , o bé  $(-a, -b)$  pertany a  $E$ , però no tots dos.

**21E3.** Resoleu l'equació

$$\tan^2 2x + 2 \tan 2x \tan 3x - 1 = 0.$$

**21E4.** Considerem tres nombres naturals  $a, b, c$  tals que la raó

$$\frac{a + b + c}{abc}$$

sigui l'invers d'un nombre  $k$  enter positiu. Es demana que demostreu:

- $a^3 + b^3 + c^3$  no és primer.
- Per a cada  $k \in \mathbb{N}$  existeixen ternes de naturals  $a, b, c$  que compleixen les condicions.

**21E5.** Trobeu l'equació de la circumferència que passa pels afixos de les solucions de l'equació

$$z^3 + (-1 + i)z^2 + (1 - i)z + i = 0.$$

**21E6.** Es consideren les semirectes no alineades  $Ox$ ,  $Oy$ . Pel punt  $A \in Ox$  es tracen parells de rectes  $r_1$ ,  $r_2$ , antiparal·leles respecte a l'angle  $xOy$ ; siguin  $M$ ,  $N$  les interseccions de  $r_1$  amb  $Oy$  i de  $r_2$  amb  $Ox$ , respectivament. Sigui  $P$  el punt d'intersecció de les bisectrius dels angles  $AMy$ ,  $ANy$ . Trobeu el lloc geomètric de  $P$  en variar  $A$ .

**21E7.** Donada l'equació  $x^5 - px - 1 = 0$ , estudeu el valor de  $p$  que fa possible que existeixin dues solucions de l'equació,  $x_1$ ,  $x_2$ , que a la vegada siguin solucions de  $x^2 - ax + b = 0$ , amb  $a$ ,  $b$  enters.

**21E8.** Direm que una matriu quadrada és de *suma constant* si la suma dels elements de cada fila, de cada columna, i de cada diagonal, són valors iguals. Anàlogament, una matriu quadrada és de *producte constant* si són iguals els productes dels elements de cada fila, de cada columna i de cada diagonal. Determineu les matrius quadrades d'ordre 3 sobre  $\mathbb{R}$  que són, a la vegada, de suma i producte constant.

Primera sessió. 29 de Novembre de 1985, de 16 h a 20 h.

**22C1.** Siguin  $A$  i  $B$  dos subconjunts del conjunt del nombres naturals  $\mathbb{N}$  que siguin una partició, és a dir, tals que  $A \cap B = \emptyset$  i  $A \cup B = \mathbb{N}$ .

a) Demostreu que existeix un nombre natural  $m$  tal que  $m + 5$  o  $m + 6$  pertanyen al mateix subconjunt que  $m$ .

b) Demostreu que existeixen infinits nombres que compleixen la propietat anterior.

**22C2.** Tres punts  $A$ ,  $B$ ,  $C$  s'uneixen per segments. Sobre la meitat del segment  $AB$  es construeix un quadrat, sobre el segment  $BC$  un altre quadrat, i sobre el segment  $CA$  un rectangle de base  $CA$  i altura 4 cm. L'àrea del rectangle supera en  $20 \text{ cm}^2$  la suma de les àrees dels dos quadrats. Calculeu l'àrea del rectangle.

**22C3.** Calculeu la suma dels quadrats de les distàncies entre els afixos dels nombres complexos que són solucions de l'equació

$$z^{1985} - 1 = 0.$$

**22C4.** Trobeu el polinomi  $p(x)$  de grau mínim tal que  $p(x) + 1$  sigui divisible per  $(x - 1)^4$  i  $p(x) - 1$  sigui divisible per  $(x + 1)^4$ .

Segona sessió. 30 de Novembre de 1985, de 9 h a 13 h.

**22C5.** Ordeneu de més gran a més petit els nombres

$$\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{4}, \dots, \sqrt[n]{n}, \dots$$

**22C6.** A un ball hi ha vuit nois i vuit noies que estan asseguts alternativament en fila. De quantes maneres es poden formar cinc parelles de ball si cada parella ha d'estar formada per un noi i una noia asseguts un al costat dell'altre.

**22C7.** Donats dos nombres naturals  $p$  i  $q$  primers entre ells, calculeu les sumes

$$\sum_{k=1}^{q-1} D\left(\frac{kp}{q}\right) \quad \text{i} \quad \sum_{h=1}^{p-1} D\left(\frac{hq}{p}\right),$$

on  $D(a)$  indica la part decimal del nombre  $a$ .

**22C8.** Calculeu els nombre naturals  $p$  i  $q$  més petits tals que  $1/p$  i  $1/q$  siguin dos decimals periòdics purs de períodes  $A$  i  $B$ , sabent que aquests períodes tenen el mateix nombre de xifres i el seu màxim comú divisor és 10989.

---

**Guanyadors:** Jaume Amorós Torrent, Joaquim Ortega Cerdà, Ramon Rebull Camarasa.



Primera sessió. Febrer de 1986.

**22E1.** Indicarem per  $[x], \{x\}$  les parts entera i decimal del nombre real  $x$ . Definim una *distància* entre els nombres reals  $x$  i  $y$

$$d(x, y) = \sqrt{([x] - [y])^2 + (\{x\} - \{y\})^2}.$$

Determineu (com a unió d'interval) el conjunt dels nombres reals que *disten* del nombre  $3/2$  menys que  $202/100$ .

**22E2.** Un segment  $d$  divideix el segment  $s$  si existeix un natural  $n$  tal que

$$nd = d + d + \dots + d = s.$$

a) Demostreu que si el segment  $d$  divideix els segments  $s$  i  $s'$  amb  $s < s'$ , llavors divideix el segment diferència  $s' - s$ .

b) Demostreu que cap segment divideix el costat  $s$  i la diagonal  $s'$  d'un pentàgon regular (raoneu sobre el pentàgon regular els costats del qual estan continguts a les diagonals del pentàgon donat, i no feu càlculs numèrics).

**22E3.** Trobeu els valors de  $n \in \mathbb{N}$  tals que  $5^n + 3$  és una potència de 2 d'exponent natural.

**22E4.** Indiquem per  $m(a, b)$  la mitjana aritmètica dels nombres reals positius  $a$  i  $b$ . Donada la funció real positiva  $g$  que té la primera i la segona derivada positives, definim la mitjana  $\mu(a, b)$  relativa a la funció  $g$  mitjançant

$$2g(\mu(a, b)) = g(a) + g(b).$$

Digueu raonadament quina de les dues mitjanes  $m$  i  $\mu$  és més gran.

**22E5.** Considerem la corba  $\Gamma$  definida per l'equació  $y^2 = x^3 + bx + b^2$ , on la constant  $b$  és un nombre racional no nul. Inscriviu a la corba  $\Gamma$  un triangle tal que les coordenades dels vèrtexs siguin racionals.

**22E6.** Calculeu

$$\prod_{k=1}^{14} \cos\left(\frac{k\pi}{15}\right).$$

---

**Guanyadors:** Carlos Ueno Jacue, Alberto Garrido Arribas, Juan David González Cobas, Jaume Amorós Torrent, Joaquim Ortega Cerdà, Juan Cuenca González.

Primera sessió. 22 de Novembre de 1986.

**23C1.** Elevant  $3 + \sqrt{5}$  a la  $n$ -èsima potència s'obté un nombre de la forma  $a + b\sqrt{5}$  amb  $a$  i  $b$  enters. Demostreu que

$$0 < a - b\sqrt{5} < 1.$$



**23C2.** Determineu els valors de  $a$  que fan que la successió  $a_1 = a$ ,  $a_2 = a + a_1^2$ ,  $a_3 = a + a_2^2$ ,  $\dots$ ,  $a_n = a + a_{n-1}^2$ , sigui creixent.

**23C3.** En un triangle  $ABC$  de costats  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , siguin  $m_a$ ,  $m_b$ ,  $m_c$  les mitjanes que passen, respectivament, pels vèrtexs  $A$ ,  $B$ ,  $C$ . Se sap que  $b/a = \sqrt{17/5}$  i que  $m_c = 2m_b$ . Calculeu l'angle que formen aquestes dues mitjanes i les relacions  $c/a$  i  $c/b$ .

**23C4.** Els canvis de rasant de les autopistes es fan segons un perfil parabòlic  $y = -ax^2$ , amb  $a > 0$ .

a) Determineu el màxim valor de  $a$  per tal que un observador de 1 m d'alçada amb visual tangent al punt més alt vegi un objecte de 0.1 m d'altura situat a 100 m de distància (Fig. 1).

b) Determineu el màxim valor de  $a$  per tal que un observador de 1 m d'alçada situat a qualsevol lloc vegi un objecte de 0.1 m d'altura situat a 100 m de distància (Fig. 2).



**23C5.** Estudieu la continuïtat de la funció  $f(x) = x[1/x]$  i representeu gràficament la seva restricció al conjunt  $(-\infty, -1/4] \cup [1/4, \infty)$ , si  $[x]$  indica la funció *part entera* de  $x$ .

**23C6.** Digueu si es pot saber la data de naixement d'una persona sabent que ha nascut al segle XX, que la diferència entre l'any de naixement i 1900, més 100 vegades la suma del número del mes multiplicada per 40 i el número del dia és 13442.

**23C7.** Un tren té 88 m de longitud i un altre 92 m. Quan circulen en direccions oposades tarden 7.5 s a creuar-se, i quan circulen en la mateixa direcció en tarden 45. Trobeu la velocitat dels dos trens.

**23C8.** Trobeu dos nombre complexos  $\alpha$  i  $\beta$  tals que els afixos dels nombres  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\alpha/\beta$  i  $\beta/\alpha$  siguin els vèrtexs d'un quadrat de diagonals  $\alpha$ ,  $\beta/\alpha$  i  $\beta$ ,  $\alpha/\beta$ .



Primera sessió. Febrer de 1987.

**23E1.** Siguin  $a$ ,  $b$ ,  $c$  les longituds dels costats d'un triangle no isòsceles. Es donen tres cercles concèntrics de radis  $a$ ,  $b$  i  $c$ .

a) Digueu quin és el nombre de triangles equilàters d'àrees diferents que es poden construir, de manera que les rectes que contenen els costats siguin cada una tangent a un dels cercles.

b) Trobeu les superfícies d'aquests triangles.

**23E2.** Demostreu que per tot nombre natural  $n > 1$  es compleix

$$1 \cdot \sqrt{\binom{n}{1}} + 2 \cdot \sqrt{\binom{n}{2}} + \cdots + n \cdot \sqrt{\binom{n}{n}} < \sqrt{2^{n-1} n^3}.$$

**23E3.** Un triangle donat  $T$  es descompon en triangles  $T_1, T_2, \dots, T_n$  de manera que:

a) Cap parell de triangles  $T_i$  té punts interiors en comú.

b) La unió dels triangles  $T_i$  és  $T$ .

c) Tot segment que és costat d'algun triangle  $T_i$ , o bé és costat d'un altre triangle  $T_j$ , o bé es costat del triangle  $T$ .

Siguin  $s$  el nombre total de costats (cada un comptat una sola vegada, encara que sigui comú a dos triangles), i  $v$  el nombre total de vèrtexs (cada un comptat una sola vegada, encara que sigui comú a diversos triangles).

Demostreu que si  $n$  és senar, existeixen diverses descomposicions d'aquesta mena, i totes tenen el mateix nombre  $v$  de vèrtexs i el mateix nombre  $s$  de costats. Expressau  $v$  i  $s$  en funció de  $n$ . Demostreu també que si  $n$  és parell no existeix cap descomposició.

**23E4.** Si  $a$  i  $b$  són dos nombres reals diferents, resolou el sistema

$$\begin{aligned}x + y &= 1 \\(ax + by)^2 &\leq a^2x + b^2y.\end{aligned}$$

Resolou també el sistema

$$\begin{aligned}x + y &= 1 \\(ax + by)^4 &\leq a^4x + b^4y.\end{aligned}$$

**23E5.** En un triangle  $ABC$  tenim punts  $D$  i  $E$  respectivament sobre  $AB$  i  $AC$ . Coneixem la mesura dels angles indicats a continuació:  $\widehat{ABE} = 30^\circ$ ,  $\widehat{EBC} = 50^\circ$ ,  $\widehat{ACD} = 20^\circ$  i  $\widehat{DCB} = 60^\circ$ . Trobeu el valor de l'angle  $\widehat{EDC}$ .

**23E6.** Per cada nombre natural  $n$  considerem el polinomi

$$P_n(x) = x^{n+2} - 2x + 1.$$

- Demostreu que l'equació  $P_n(x) = 0$  té una arrel  $c_n$  i només una a l'interval  $(0, 1)$ .
- Calculeu  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ .

Primera sessió. 11 de Desembre de 1987, de 16 h a 20 h.

**24C1.** Determineu les potències de  $(1 + i)$  que són interiors a la corona circular determinada per les circumferències de centre  $O = (0, 0)$  i radis respectius 1000 i 10000.


**24C2.** Busqueu els nombres primers de la forma  $n^4 + 4$ , on  $n$  és un nombre enter positiu.

**24C3.** Demostreu que per a qualsevol polinomi  $p(x)$  existeix un nombre real  $k$  tal que un dels dos polinomis  $p(x) + k$  i  $x p(x) + k$  no té cap arrel real i l'altre una de sola.

**24C4.** Donat un triangle rectangle isòsceles  $ABC$ , dividim cada un dels seus costats en tres parts iguals i tracem les rectes de la figura, que determinen un triangle  $A_1B_1C_1$ . Determineu l'àrea del triangle  $A_1B_1C_1$  en funció de l'àrea del triangle  $ABC$ .

Què passa si el triangle rectangle  $ABC$  no és isòsceles?

Què passa si el triangle  $ABC$  és un triangle qualsevol?



Segona sessió. 12 de Desembre de 1987, de 9 h a 13 h.

**24C5.** Demostreu que si dos nombre enters són de la mateixa paritat (tots dos parells o tots dos senars), la meitat de la suma dels seus quadrats és una suma de dos quadrats.

**24C6.** Demostreu que l'equació

$$3^a + 1 = 5^b + 7^c$$

només admet les solucions enteres  $a = 0$ ,  $b = 0$ ,  $c = 0$ .

**24C7.** Per un punt de la vora d'un quadrat es tracen dues rectes que divideixen el quadrat en tres trossos de la mateixa àrea. Calculeu l'angle d'aquestes rectes en funció dels punts de la vora.

**24C8.** (a) Estudieu els intervals de creixement i decreixement de la funció

$$F(t) = \frac{\ln t}{t}.$$

(b) Comproveu que si  $k \geq 3$  és enter, l'equació

$$(\ln x)^k = x$$

té exactament dues solucions més grans que  $e$ , diguem  $r_k$  i  $s_k$ ,  $r_k < s_k$ , i que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} r_k = e \quad \text{i} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = +\infty.$$

*Indicació:* En la resolució de l'apartat (b) tingueu en compte l'apartat (a).

---

**Guanyadors:** Boris Bartolomé Mana, Javier Campins Pascual, Jordi Campins Pascual.



Primera sessió. Febrer de 1988.

**24E1.** Sigui  $(x_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , una successió de nombres enters tal que

$$x_1 = 1,$$

$$x_{n+1} > x_n, \text{ per } n \geq 1,$$

$$x_{n+1} \leq 2n, \text{ per } n \geq 1.$$

Demostreu que per tot enter natural  $k$  existeixen dos termes de la successió  $x_r$  i  $x_s$  tals que  $x_r - x_s = k$ .

**24E2.** Sobre una circumferència s'elegeixen  $n > 3$  punts i es numeren de 1 a  $n$  en qualsevol ordre. Direm que dos punts no consecutius  $a$  i  $b$  estan relacionats si en un dels dos arcs d'extremes  $a$  i  $b$ , tots els punts estan marcats amb números de valor menor que els de  $a$  i  $b$ .

Demostreu que el nombre de parells de punts relacionats és exactament  $n - 3$ .

**24E3.** Demostreu que els binomis  $25x + 31y$  i  $3x + 7y$  són múltiples de 41 pels mateixos valors de  $x$  i  $y$ .

**24E4.** S'atribueix al matemàtic renaixentista Leonardo da Pisa (més conegut com Fibonacci) la successió definida de la manera següent


$$a_1 = 1,$$

$$a_2 = 1,$$

$$a_i = a_{i-1} + a_{i-2} \text{ per } i > 2.$$

Expressiu  $a_{2n}$  en funció només dels tres termes  $a_{n-1}$ ,  $a_n$ ,  $a_{n+1}$ .

**24E6.** És molt conegut el *puzzle* consistent a descompondre la creu grega de l'esquerra de la figura en quatre parts amb les quals compondre un quadrat. Una solució habitual és la de la figura de la dreta. Demostreu que hi ha una infinitat de solucions diferents.



Hi ha alguna solució que doni lloc a quatre parts iguals?

**24E7.** Calculeu, per qualsevol valor del paràmetre enter  $t$ , solucions enteres  $x$ ,  $y$  de l'equació

$$y^2 = x^4 - 22x^3 + 43x^2 + 858x + t^2 + 10452(t + 39).$$

---

**Guanyadors:** Javier Campins Pascual, Ramón Esteban Romero, Santiago Pérez-Cacho Fernando-Argüelles, José Ignacio Nogueira Coriba, Boris Bartolomé Mana, Fernando Martínez Puente.

Primera sessió. 16 de Desembre de 1988, de 16 h a 20 h.

**25C1.** Demostreu que si  $n$  és un enter positiu i  $p$  és primer, aleshores  $n^p - n$  és múltiple de  $p$ .

**25C2.** Dos mòbils es desplacen amb velocitat constant al llarg d'un circuit tancat. Si surten simultàniament d'un mateix punt en el mateix sentit, tornen a coincidir al cap de 100 s i el més ràpid ha de menester 10 s menys que l'altre per a fer una volta completa. Quant de temps tardaran a creuar-se si surten simultàniament del mateix punt en sentits oposats?

**25C3.** Els extrems  $A$  i  $B$  d'un segment es mouen respectivament sobre dues rectes  $r$  i  $s$  que són perpendiculars. Descriviu la corba que recorre el punt  $M$  del segment tal que  $MA$  és la meitat de  $MB$ .

**25C4.** La societat *Peces de Ferro S.A.* té nou accionistes que han de triar en Joan o en Pere com a President. És sabut que sis d'ells votaran en Joan i els altres tres en Pere, i que en el moment d'emetre el vot, cada un ho farà públicament en veu alta. Determineu la probabilitat que en Joan vagi sempre per davant en les votacions.

Segona sessió. 17 de Desembre de 1988, de 9 h a 13 h.

**25C5.** Considerem un conjunt  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  d'un nombre finit  $n$  de nombres reals estrictament positius. Demostreu que per a tot  $n \geq 2$  es compleix

$$\frac{x_1^2}{x_1^2 + x_2x_3} + \frac{x_2^2}{x_2^2 + x_3x_4} + \dots + \frac{x_{n-1}^2}{x_{n-1}^2 + x_nx_1} + \frac{x_n^2}{x_n^2 + x_1x_2} \leq n - 1.$$

**25C6.** Si  $\alpha, \beta, \gamma$  són tres nombres complexos tals que els seus afixos determinen un triangle equilàter, demostreu que es compleix la igualtat

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha.$$

**25C7.** Demostreu, per cada enter positiu  $n$ , les desigualtats

$$2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} < \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n} - 2\sqrt{n-1}.$$

Si  $[x]$  representa la part entera del nombre  $x$ , determineu el valor de

$$\left[ 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10^6}} \right].$$

**25C8.** Descriviu totes les successions  $(a_n)$  de nombres reals tals que

$$|a_n - a_m| \leq e^{-(n+m)}.$$

**Guanyadors:** Enrique García López, Jordi Casas Pla, Alberto Herrero Izquierdo

Primera sessió. Febrer de 1989.

**25E1.** El programa d'una assignatura consta de  $n$  preguntes; l'examen consisteix en la resposta d'una pregunta triada a l'atzar. Un alumne només se sap una pregunta, però pot repetir l'examen  $n$  vegades. Expressieu, en funció de  $n$ , la probabilitat  $p_n$  que l'alumne aprovi l'examen. Digueu si  $p_n$  és creixent o decreixent quan  $n$  augmenta. Calculeu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n.$$

Calculeu la fita inferior màxima de les probabilitats  $p_n$ .

**25E2.** Els punt  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$  dels costats  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$  d'un triangle  $ABC$  compleixen

$$\frac{AC'}{C'B} = \frac{BA'}{A'C} = \frac{CB'}{B'A} = k.$$

Les rectes  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  formen un triangle  $A_1B_1C_1$ . Donats  $k$  i l'àrea  $S$  del triangle  $ABC$ , calculeu l'àrea del triangle  $A_1B_1C_1$ .

**25E3.** Demostreu que

$$\frac{1}{10\sqrt{2}} < \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 99}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 100} < \frac{1}{10}.$$

**25E4.** Demostreu que el nombre  $1989$  i totes les seves potències enteres  $1989^n$  es poden escriure com a suma de dos quadrats de nombres enters positius, i com a mínim de dues formes diferents.

**25E5.** Sigui  $\mathcal{D}$  el conjunt dels nombres complexos que es poden escriure de la forma  $a + b\sqrt{-13}$ , amb  $a, b$  enters. El nombre  $14 = 14 + 0\sqrt{-13}$  es pot escriure com a producte de dos elements de  $\mathcal{D}$ :  $14 = 2 \cdot 7$ . Expressen  $14$  com a producte de dos elements de  $\mathcal{D}$  de totes les maneres possibles.

**25E6.** Demostreu que donats set nombres reals qualssevol, se'n poden triar dos, diguem  $a$  i  $b$ , de manera que

$$\sqrt{3}|a - b| < |1 + ab|.$$

Doneu un exemple de sis nombres reals que no compleixin aquesta propietat.

Primera sessió. 16 de Febrer de 1990, de 16 h a 20 h.

**26C1.** Siguin  $A, B, C$  els vèrtexs d'un triangle i  $H$  l'ortocentre. Demostreu la igualtat

$$\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HB} = \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{HA}.$$

**26C2.** Demostreu que si les longituds  $a, b, c$  dels costats d'un triangle compleixen  $a < b < c$ , aleshores l'angle  $C$  oposat al costat  $c$  compleix  $\cos C < 1/2$ .

**26C3.** Sigui  $A_n = 2^n + 2^{2n} + 2^{3n}$ .

- Demostreu que per a tot nombre natural  $n$ , el nombre  $A_{n+3} - A_n$  és divisible per 7.
- Calculeu el residu de dividir  $A_{1990}$  per 7.

**26C4.** Donada la corba

$$y = x + \frac{1}{2x^2},$$

- Calculeu l'àrea  $S(t)$  limitada per la corba, la seva asímptota inclinada i les rectes  $x = 1$  i  $x = t$  ( $t > 1$ ).
- Calculeu

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S(t).$$

Segona sessió. 17 de Febrer de 1990, de 9 h a 13 h.

26C5. Resoleu a l'interval  $[0, 2\pi]$  la inequació

$$\cos x + \cos 3x + \cos 5x > 0.$$

26C6. Un triangle rectangle  $T_1$  té els costats en progressió geomètrica i un altre triangle rectangle  $T_2$  els té en progressió aritmètica. Un costat del triangle  $T_1$  és igual a un costat del triangle  $T_2$ . Calculeu el valor màxim i el valor mínim de

$$\frac{\text{àrea } T_1}{\text{àrea } T_2}.$$

26C7. Determineu els nombres complexos  $z$  tals que els afixos dels nombres

$$z^{1989}, z^{1990}, z^{1991}$$

siguin els vèrtexs d'un triangle rectangle isòsceles amb l'angle recte en el punt  $z^{1990}$ .

26C8. Esbrineu si és possible tenir un pla  $P$ , una esfera  $E$  i un tetràedre regular  $T$  tals que els plans paral·lels a  $P$  o bé no tallin ni a l'esfera  $E$  ni al tetràedre  $T$ , o bé els tallin en figures de la mateixa àrea.

Estudieu la mateixa qüestió si el tetràedre no és regular.

---

Guanyadors: Roberto Coll Francés, Gerard Montornés Ferret, Àngel Solares Girón.



Primera sessió. 16 de Març de 1990. 9h. a 12h.

**26E1.** Siguin  $x$  i  $y$  dos nombres reals positius. Proveu que l'expressió

$$A = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{xy}$$

es pot escriure en la forma

$$B = \sqrt{x} + \sqrt{y + xy + 2y\sqrt{x}}$$

i compareu els nombres

$$L = \sqrt{3} + \sqrt{10 + 2\sqrt{3}} \quad \text{i} \quad M = \sqrt{5 + \sqrt{22}} + \sqrt{8 - \sqrt{22} + 2\sqrt{15 - 3\sqrt{22}}}.$$

**26E2.** Cada punt d'un pla està pintat d'un color elegit entre tres de diferents. Es pregunta si existeixen necessàriament dos punts d'aquest pla que distin 1 cm i que estiguin pintats del mateix color.

**26E3.** S'anomena part entera d'un nombre real  $a$  (i s'escriu  $[a]$ ), el nombre enter més gran que sigui menor o igual que  $a$ . Si  $n$  és un nombre natural, demostreu que la part entera de  $(4 + \sqrt{11})^n$  és un nombre senar.



**26E4.** Demostreu que la suma

$$\sqrt[3]{\frac{a+1}{2} + \frac{a+3}{6}\sqrt{\frac{4a+3}{3}}} + \sqrt[3]{\frac{a+1}{2} - \frac{a+3}{6}\sqrt{\frac{4a+3}{3}}}$$

és independent del valor de  $a$ , per tot valor real  $a \geq -3/4$ , i trobeu-ne el valor.

**26E5.** Tres punts  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$  estan situats, respectivament, sobre els costats  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  d'un triangle donat  $ABC$  d'àrea  $S$ , de manera que

$$\frac{AC'}{AB} = \frac{BA'}{BC} = \frac{CB'}{CA} = p,$$

essent  $p$  un paràmetre variable,  $0 < p < 1$ . Determineu

- 1) L'àrea del triangle  $A'B'C'$  en funció de  $p$ .
- 2) El valor de  $p$  que fa mínima l'àrea anterior.
- 3) El lloc geomètric dels punts  $P$  d'intersecció de les paral·leles traçades per  $A'$  i  $C'$ , respectivament als costats  $AB$  i  $AC$ , quan  $p$  varia de 0 a 1.


**26E6.** Es consideren  $n$  punts del pla de forma que no hi hagi dues paral·leles equidistants. Per cada punt es traça el segment que l'uneix al més proper. Demostreu que cap punt està unit a més de cinc punts.

---

**Guanyadors:** Francisco Ogando Serrano, Daniel Lasaoa Medarde, Marco Castrillón López, Javier Arregui García, José F. Herrador Barrios, José M. Gordillo Arias de Saavedra.

Primera sessió. 14 de Desembre de 1990, de 16 h a 20 h.

**27C2.** La figura adjunta representa un entramat de camins per on pot moure's una tortuga, la qual, a cada cruïlla, escull a l'atzar un qualsevol dels camins que pot seguir. Si deixem la tortuga lliure en el punt  $A$ , calculeu la probabilitat que torni a passar pel punt  $A$  en menys de  $n$  moviments.



**27C3.** Determineu quina condició han de complir les xifres de les desenes de dos nombres acabats en 6, per tal que el seu producte acabi en 36.

**27C4.** Siguin  $r$  i  $R$  dos rectangles d'àrea unitat, tals que el perímetre de  $R$  és doble del perímetre de  $r$ . Siguin  $d$  i  $D$  les longituds de les diagonals de  $r$  i  $R$ .


a) Demostreu que  $2 < D/d \leq \sqrt{7}$ .

b) Si  $D = d\sqrt{5}$ , determineu les longituds dels costats dels dos rectangles.

**27C5.** Prenem un sistema rectangular de coordenades al pla. Tenim un mirall  $M_1$  unidimensional posat cara amunt sobre el segment d'extremes  $(0,0)$  i  $(1,0)$ . Sobre la recta que passa per  $(a,0)$  amb  $a < 0$  i que té pendent  $m > 0$  posem un mirall  $M_2$  d'extremes  $A$  i  $B$  mirant cap avall. Determineu  $a$ ,  $m$  i els punts  $A$  i  $B$  per tal que es compleixi:

a) Tot raig que arriba a  $M_1$  amb un angle  $\phi$  respecte de la direcció de les  $x$  positives,  $30^\circ \leq \phi \leq 45^\circ$ , és reflectit cap a  $M_2$ , es reflecteix a  $M_2$  i no torna a trobar  $M_1$ . L'angle entre la direcció de les  $x$  positives i el raig que arriba de  $M_2$  és  $\phi + 30^\circ$ .

b) La longitud de  $M_2$  és mínima respecte a tots els possibles miralls que compleixen la condició anterior.



Segona sessió. 15 de Desembre de 1990, de 9 h a 13 h.

**27C6.** Trobeu els nombres de quatre xifres que són iguals al quadrat de la suma del nombre format per les dues primers xifres i el format per les dues darreres xifres.

**27C7.** Considereu un triangle equilàter inscrit en una circumferència de radi 1. Li apliquem una rotació d'angle  $\phi$  de centre el centre de la circumferència. Calculeu l'àrea comuna als dos triangles i el valor de l'angle  $\phi$  que fa que l'àrea comuna sigui mínima.


**27C8.** Demostreu que tot nombre de la forma  $2/n$ , amb  $n$  senar, es pot posar com a suma de dues fraccions unitàries (és a dir, de fraccions de numerador 1.)

Deduïu-ne que tota fracció  $m/n$ , amb  $n$  senar, admet una descomposició en suma de fraccions unitàries diferents. Comproveu també que si  $m/n$  admet una descomposició en suma de  $r$  fraccions unitàries diferents, n'admet una altra en suma de  $s$  fraccions unitàries, per tot  $s > r$ .

**27C9.** Siguin  $AB$  i  $BC$  dues cordes d'un cercle ( $AB < BC$ ) i sigui  $M$  el punt mitjà de l'arc  $ABC$ . Sigui  $F$  el peu de la perpendicular des de  $M$  a la corda  $BC$ .

a) Proveu que  $F$  és el punt mitjà de la corda trencada, és a dir,  $AB + BF = FC$ .

b) Useu el punt anterior per veure que  $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$ .



Guanyadors: Roger Espel Llima, Ignasi Mundet Riera, Alejandro Lago Esteban.

Primera sessió. 15 de febrer de 1991.

**27E1.** Al pla, on s'ha pres un sistema de referència ortonormal, es consideren tots els punts  $(m, n)$  tals que les seves coordenades són nombres enters. Suposem que s'hagin traçat tots els segments que uneixen parells qualssevol d'aquests punts i que tenen longitud entera. Proveu que no hi ha dos segments d'aquests que formin un angle de  $45^\circ$ .

Fem el mateix amb els punts  $(m, n, k)$  de l'espai. Hi haurà algun parell de segments que formin un angle de  $45^\circ$ ?

**27E2.** Siguin  $a$  i  $b$  enters diferents de 0, 1 i  $-1$  i considerem la matriu

$$\begin{pmatrix} a+b & a+b^2 & a+b^3 & \dots & a+b^m \\ a^2+b & a^2+b^2 & a^2+b^3 & \dots & a^2+b^m \\ a^3+b & a^3+b^2 & a^3+b^3 & \dots & a^3+b^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a^n+b & a^n+b^2 & a^n+b^3 & \dots & a^n+b^m \end{pmatrix}.$$

Determineu un subconjunt  $S$  de files d'aquesta matriu, el més petit possible, tal que qualsevol altra fila es pugui expressar com a suma de les files de  $S$  multiplicades per nombres enters apropiats (és a dir, com a combinació lineal amb coeficients enters de les files de  $S$ .) Expliciteu aquestes combinacions lineals.

**27E3.** Suposem que l'equació  $x^3 + px^2 + qx + r = 0$  amb  $r \neq 0$ , admet tres arrels reals i positives. Determineu la relació que hi ha entre els nombres reals  $p$ ,  $q$  i  $r$  per tal que les tres arrels puguin ser les longituds dels costats d'un triangle.

27E4. Siguin  $A'$ ,  $B'$  i  $C'$  els punts de tangència dels costats  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  d'un triangle amb la seva circumferència incrita. Sigui  $D$  el punt d'intersecció de  $C'A'$  amb la bisectriu de l'angle del vèrtex  $A$ . Calculeu el valor de l'angle  $\widehat{ADC}$ .

27E5. Donat un nombre natural  $n$ , indiquem per  $s(n)$  la suma de les xifres del nombre  $n$ , expressat en el sistema de numeració binari, és a dir, el nombre de xifres 1 que té. Determineu, per a tot nombre natural  $k$

$$\sigma(k) = s(1) + s(2) + \dots + s(2^k).$$

27E6. Calculeu la part entera de

$$S = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{10000}}.$$

Primera sessió. 22 de Novembre de 1991, de 16 h a 20 h.

**28C1.** Demostreu que el nombre que escrit en base  $n$ ,  $n \geq 8$  és 1367631, és un cub perfecte. En particular, calculeu l'arrel cúbica d'aquest nombre en base 10 i en base 1991.

**28C2.** Sigui  $S$  el conjunt de les rectes que uneixen un punt del conjunt

$$A = \left\{ \left( 0, \frac{1}{a} \right) \mid a \in \mathbb{N} \right\}$$

i un punt del conjunt

$$B = \{ (b+1, 0) \mid b \in \mathbb{N} \}.$$

Demostreu que un nombre natural  $m$  és compost si i només si el punt  $M = (m, -1)$  està sobre una recta del conjunt  $S$ .

Determineu també el nombre de rectes del conjunt  $S$  que passen per un punt  $M = (m, -1)$  en funció del nombre natural  $m$ .

**28C3.** L'abscissa d'un punt que es mou sobre la part positiva de l'eix de les  $X$  ve donada per

$$x(t) = 5(t+1)^2 + \frac{a}{(t+1)^5}$$

on  $a$  és una constant positiva.

Quin és el mínim valor de  $a$  pel qual  $x(t) \geq 24$  per a tot  $t \geq 0$ ?

**28C4.** Tenim dues circumferències  $S_1, S_2$  iguals, de radi  $R$ , i tangents. Considerem la tangent comuna  $r$ , paral·lela a la recta que uneix els centres de  $S_1$  i  $S_2$ .

Siguin  $C_1$ , la circumferència tangent a  $r$ ,  $S_1$  i  $S_2$ ;  $C_2$ , la circumferència tangent a  $C_1$ ,  $S_1$  i  $S_2$ ;  $C_3$ , la circumferència tangent a  $C_2$ ,  $S_1$  i  $S_2$ ; etc.

S'obté així una família de circumferències  $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ . Demostreu que el diàmetre de la circumferència  $C_n$  és

$$d_n = \frac{R}{n(n+1)}.$$

Segona sessió. 23 de Novembre de 1991, de 9 h a 13 h.

**28C5.** Per cada nombre natural  $n$  escrivim

$$(1 + \sqrt{2})^{2n+1} = a_n + b_n\sqrt{2}$$

i així tenim dues successions de nombres enters

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots \quad \text{i} \quad b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$$

- a) Demostreu que  $a_n$  i  $b_n$  són senars per tot  $n \in \mathbb{N}$ .  
b) Demostreu que  $b_n$  és la hipotenusa d'un triangle rectangle de catets

$$\frac{a_n + 1}{2} \quad \text{i} \quad \frac{a_n - 1}{2}.$$

**28C6.** Siguin  $z_1, z_2, z_3$  i  $z_4$  nombres complexos de igual mòdul;

- a) si  $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ , què es pot dir de la figura formada pels afixos d'aquests tres nombres complexos?  
b) si  $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$ , què es pot dir de la figura formada pels afixos d'aquests quatre nombres complexos?

**28C7.** Sigui  $p(n)$  el nombre de factors primers del nombre natural  $n$ . Demostreu que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0.$$

**28C8.** Sigui  $ABC$  un triangle qualsevol. Exteriorment a ell es construeixen dos quadrats  $BAEP$  i  $ACRD$  de costats  $AB$  i  $AC$  respectivament. Siguin  $M$  i  $N$  els punts mitjans de  $BC$  i  $ED$ . Demostreu que  $AM$  és perpendicular a  $ED$  i que  $AN$  és perpendicular a  $BC$ .



Primera sessió. 14 de Febrer de 1992.

**28E1.** Un nombre  $N$ , múltiple de 83, és tal que el seu quadrat té 63 divisors. Trobeu  $N$ , sabent que és el nombre més petit que compleix les condicions anteriors.

**28E2.** Donades dues circumferències exteriors de radis  $r$  i  $r'$  ( $r \neq r'$ ), es demana de dibuixar, raonadament, una recta paral·lela a una direcció donada, de tal manera que determini sobre les dues circumferències dues cordes tals que la suma de llurs longituds sigui igual a una longitud donada  $\ell$ .

**28E3.** Proveu que si  $a$ ,  $b$ ,  $c$  i  $d$  són nombres enters no negatius, i és

$$(a + b)^2 + 2a + b = (c + d)^2 + 2c + d, \quad (*)$$

necessàriament ha de ser  $a = c$  i  $b = d$ .

Proveu la mateixa conclusió si, en lloc de (\*) es compleix

$$(a + b)^2 + 3a + b = (c + d)^2 + 3c + d.$$

Vegeu que, en canvi, existeixen nombres enters no negatius  $a \neq c$ ,  $b \neq d$ , tals que

$$(a + b)^2 + 4a + b = (c + d)^2 + 4c + d.$$

**28E4.** Segueix la successió (progressió aritmètica)

3, 7, 11, 15, ...

Demostreu que en aquesta successió hi ha infinits nombres primers.

**28E5.** Dibuixat el triangle de vèrtexs  $A, B, C$ , es demana de determinar gràficament el punt  $P$  tal que

$$\widehat{PAB} = \widehat{PBC} = \widehat{PCA}.$$

Expresseu una funció trigonomètrica d'aquest angle  $\widehat{PAB}$  en funció de les funcions trigonomètriques dels angles  $A, B$  i  $C$ .

**28E6.** Donats un nombre natural  $n > 0$  i un nombre complex  $z = x + iy$  de mòdul unitat,  $x^2 + y^2 = 1$ , es pot complir o no la igualtat

$$\left(z + \frac{1}{z}\right)^n = 2^{n-1} \left(z^n + \frac{1}{z^n}\right).$$

Fixat  $n$  designarem per  $S(n)$  el subconjunt de complexos de mòdul unitat pels quals es compleix la igualtat donada. Es demana

- Calculeu raonadament  $S(n)$ , per  $n = 2, 3, 4, 5$ .
- Fiteu superiorment el nombre d'elements de  $S(n)$  en funció de  $n$ , per  $n > 5$ .

Primera sessió. 11 de Desembre de 1992, de 16 h a 18 h 30 m.

29C1. Demostreu que el nombre combinatori

$$\binom{1992}{1492}$$

no és múltiple de 500.

29C2. Proveu que si els nombres

$$\sin(b+c-a), \sin(c+a-b) \text{ i } \sin(a+b-c)$$

estan en progressió aritmètica, llavors també ho estan els nombres

$$\tan a, \tan b \text{ i } \tan c.$$

29C3. En un cercle de centre  $O$  i radi 1 tracem una corda i construïm seguidament el semicercle que té com a diàmetre aquesta corda i no està contingut en el cercle inicial. Sigui  $P$  el punt d'aquest semicercle que està més lluny del punt  $O$ . Quina longitud ha de tenir la corda per tal que la distància  $OP$  sigui màxima?

29C4. Calculeu els límits

a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{(n-1)n}).$$

b)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt[3]{(n-1)n^2}).$$

Segona sessió. 12 de Desembre de 1992, de 9 h a 13 h.

**29C5.** Sobre una recta horitzontal construïm triangles equilàters de forma que les respectives bases són segments adjacents de longituds 1, 3, 5, 7, ... Demostreu que els vèrtexs superiors dels triangles estan sobre una paràbola.

**29C6.** Un rectangle es pot descompondre en 9 quadrats de costats 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 i 18. Calculeu els costats del rectangle.

**29C7.** El joc de daus americà es juga de la manera següent: el jugador va tirant successivament els daus fins que perd o guanya.

A la primera tirada guanya si la suma dels punts dels dos daus és 7 o bé 11, i perd si la suma de punts és 2, 3 o 12. Altrament anomenarem *el seu valor* la suma de punts que ha tret en la primera tirada.

A partir d'aquí tirarà els dos daus fins que tregui un 7, i llavors perdrà, o bé que tregui novament *el seu valor* i llavors guanyarà.

Calculeu la probabilitat que té un jugador de guanyar en aquest joc.

**29C8.** Sigui  $A = 66^{66}$ . Sigui  $B$  la suma de les xifres de  $A$ , i  $C$  la suma de les xifres de  $B$ . Calculeu la suma de les xifres de  $C$ .

---

**Guanyadors:** Roger Revilla Domingo, Daniel Marquès Solé, Marc Guinjoan Francisco.

Primera sessió. 26 de Febrer de 1993.

**29E1.** En una reunió hi ha 201 persones de 5 nacionalitats diferents. Se sap que, a cada grup de 6, com a mínim 2 tenen la mateixa edat. Demostreu que hi ha al menys 5 persones del mateix país, de la mateixa edat i del mateix sexe.

**29E2.** Escrit el triangle aritmètic

0	1	2	3	4	...	1991	1992	1993
	1	3	5	7	...		3983	3985
		4	8	12	...			7968
			...	...	...			


on cada nombre és igual a la suma dels dos que té al damunt (és evident que cada fila té un nombre menys que la fila anterior, i per tant, la darrera està formada per un únic nombre), raoneu el fet que l'últim nombre sigui múltiple de 1993.

**29E3.** Justifiqueu raonadament que a qualsevol triangle, el diàmetre de la circumferència inscrita no és més gran que el radi de la circumferència circumscrita.



**29E4.** Demostreu que tot nombre primer  $p$  diferent de 2 i de 5 té infinits múltiples escrits només amb uns (és a dir, de la forma  $111\dots 1$ ).

**29E5.** Es donen 16 punts que formen una quadrícula com a la figura:




De tots ells, se n'han destacat dos:  $A$  i  $D$ . Es demana que fixeu, de totes les maneres possibles, dos altres punts  $B$  i  $C$  amb la condició que les 6 distàncies determinades pels quatre punts siguin totes diferents. En aquest conjunt de quaternes, s'ha d'estudiar:

- 1) Nombre de figures de 4 punts que existeixen amb les condicions de l'enunciat.
- 2) Figures que són geomètricament diferents, és a dir, no deduïbles una de l'altra per una transformació d'igualtat.
- 3) Si cada punt es designa per un parell d'enters  $(X_i, Y_i)$ , la suma  $|X_i - X_j| + |Y_i - Y_j|$  estesa al sis parells  $AB, AC, AD, BC, BD, CD$ , és constant.

**29E6.** Una màquina de joc d'un casino té una pantalla on s'ofereix un esquema com el de la figura. En començar el joc apareix una bola al punt  $S$ .

A cada impuls del jugador, la bola es mou a cada un dels cercles immediats, amb la mateixa probabilitat per a cada un d'ells. La partida acaba quan té lloc per primera vegada un dels dos esdeveniments següents: (1) La bola torna a  $S$ , i el jugador perd. (2) La bola arriba a  $G$ , i llavors el jugador guanya. Es demana la probabilitat que el jugador guanyi, i la duració mitjana de les partides.



**Guanyadors:** Álvaro Begué Aguado, Miguel Carrión Álvarez, Antonio Rojas León, David Sevilla González, Antonio Sánchez Esguevillas, David Castell Burgaleta.

Primera sessió. 14 de Gener de 1994, de 16 h a 20 h.

**30C1.** Dues circumferències  $C_1$  i  $C_2$  es tallen en punts  $A$  i  $B$ . Es pren un punt  $M$  de  $C_1$ , exterior a  $C_2$ , i es tracen les rectes  $MA$  i  $MB$ . Anomenem  $A'$  i  $B'$  els punts (diferents de  $A$  i de  $B$ ) en què aquestes rectes tallen respectivament la circumferència  $C_2$ . Demostreu que la longitud del segment  $A'B'$  no depèn de la posició de  $M$ .

**30C2.** Demostreu que la funció

$$f(x) = 2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$$

és constant en el conjunt dels nombres reals tals que  $x \geq 1$ .

**30C3.** El nombre 9687600 es pot escriure com a producte de nombres enters consecutius, un dels quals és primer. Calculeu quins són aquests factors.

**30C4.** En una bossa hi ha  $n$  boles numerades amb números de 1 a  $n$ .

a) Si traiem tres boles d'aquesta bossa, totes alhora, calculeu la probabilitat que no surti cap parella de números consecutius.

b) Si traiem  $m$  boles d'aquesta bossa, totes alhora, demostreu que la probabilitat que no surti cap parella de números consecutius és

$$\frac{\binom{n-m+1}{m}}{\binom{n}{m}}.$$

**30C5.** Digueu quina relació hi ha d'haver entre les arestes d'un tetràedre per tal que les seves cares siguin triangles semblants no tots iguals.

**30C6.** Una successió de terme general  $a_n$  compleix  $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$  per a  $n > 2$ . Se sap que la suma dels 1000 primers termes és 500, i que la suma dels 1000 següents és 2000. Calculeu la suma dels 1993 primers termes i el terme  $a_{1994}$ .

**30C7.** Sigui  $P(x)$  un polinomi amb coeficients enters.

a) Comproveu que si  $m$  i  $n$  són nombres enters, llavors  $P(m) - P(n)$  és divisible per  $m - n$ .

b) Demostreu que si hi ha tres nombres enters  $a$ ,  $b$  i  $c$  tals que  $P(a) = P(b) = P(c) = 2$ , llavors  $P(x) \neq 3$  per tot  $x$  enter.

**30C8.** Calculeu totes les arrels complexes de l'equació

$$z^4 - z^3 + z^2 - z + 1 = 0.$$



Primera sessió. 25 de Febrer de 1994.

**30E1.** Demostreu que si entre els infinits termes d'una progressió aritmètica de nombres enters hi ha un quadrat perfecte, llavors infinits termes de la progressió són quadrats perfectes.

**30E2.** Sigui  $O.XYZ$  un triedre trirectangle de vèrtex  $O$  i arestes  $X$ ,  $Y$  i  $Z$ . Sobre l'aresta  $Z$  es fixa un punt  $C$  tal que  $OC = c$ . Sobre  $X$  i  $Y$  es consideren, respectivament, punts variables  $P$  i  $Q$  de manera que  $OP + OQ$  sigui una constant donada  $k$ . Per a cada parell de punts  $P$  i  $Q$ , els quatre punts  $O$ ,  $C$ ,  $P$  i  $Q$  determinen una esfera, el centre de la qual  $W$ , es projecta sobre el pla  $OXY$ . Raoneu quin és el lloc geomètric d'aquesta projecció. Raoneu també quin és el lloc geomètric de  $W$ .

**30E3.** Una Oficina de Turisme vol fer una enquesta sobre el nombre de dies asolellats i de dies de pluja al llarg d'un any. Per tal de fer-ho, demana informació a sis regions, les quals li transmeten la informació de la taula següent:

Regió	Sol o pluja	Inclassificable
A	336	29
B	321	44
C	335	30
D	343	22
E	329	36
F	330	35

La persona encarregada de l'enquesta, que té dades més detallades, no és imparcial. S'adona que prescindint d'una de les regions, la observació dona un nombre de dies plujosos que és la tercera part del nombre de dies de sol. Digueu raonadament de quina regió ha de prescindir.

**30E4.** L'angle  $A$  d'un triangle isòscele  $ABC$  mesura  $2/5$  de recte, i els angles  $B$  i  $C$  són iguals. La bisectriu de l'angle  $C$  talla el costat oposat al punt  $D$ . Calculeu les mesures dels angles del triangle  $BCD$ . Expressiu la mesura  $a$  del costat  $BC$  en funció de la mesura  $b$  del costat  $AC$ , sense que a l'expressió hi aparegui cap raó trigonomètrica.

**30E5.** Amb 21 fitxes de dames, unes de blanques i unes de negres, es forma un rectangle  $3 \times 7$ . Demostreu que sempre hi ha quatre fitxes del mateix color situades en els vèrtexs d'un rectangle.

**30E6.** Un polígon convex de  $n$  costats es descompon en  $m$  triangles amb interiors disjunts, de manera que cada costat d'aquests  $m$  triangles ho és també d'altre triangle contigu o del polígon donat. Demostreu que  $m + n$  és parell. Coneguts  $m$  i  $n$ , trobeu el nombre de costats diferents que queden a l'interior del polígon i el nombre de vèrtexs diferents que queden en aquest interior.

**Guanyadors:** David Sevilla González, Tomás Baeza Oliva, Miguel Catalina Gallego, Alfonso Gracia Saz, Jerónimo Arenas García, Miguel A. Bermúdez Carro.

Primera sessió. 13 de Gener de 1995, de 16 h a 20 h.

**31C1.** Donat un triangle isòsceles de base 2 i altura 2, trobeu les paràboles tangents als costats iguals del triangle isòsceles tals que l'àrea que tanquin amb la base del triangle sigui màxima i mínima.

**31C2.** Sigui  $N = abc_{(n)}$  un nombre escrit en el sistema de numeració de base  $n$ , on  $0 \leq a, b, c \leq n - 1$  i on  $a, b, c$  són diferents entre ells i de zero. Formeu els nombres en base  $n$  que s'obtenen permutant de totes les maneres possibles les xifres  $a, b, c$ . Demostreu que la suma d'aquests nombres és divisible per  $111_{(n)}$ . Generalitzeu l'enunciat del problema a nombres de  $p$  xifres escrits en base  $n$ .

**31C3.** Donat un triangle  $ABC$  i un punt  $M$  sobre  $AC$ , busqueu un punt  $N$  en un dels altres costats de manera que el segment  $MN$  divideixi el triangle en dues parts que tinguin la mateixa àrea.

**31C4.** Tenim dos daus perfectes normals. Volem canviar les puntuacions de cadascuna de les cares dels dos daus de manera que les probabilitats d'aconseguir els resultats 2 a 12, llançant-los simultàniament, sigui la mateixa que s'esdevindria usant els dos daus donats inicialment. A les noves puntuacions dels daus es permet la repetició d'una mateixa puntuació en dues cares, així com la utilització de puntuacions superiors al 6, però no s'accepta pas el 0. És possible de fer això?

Segona sessió. 14 de Gener de 1995, de 9 h a 13 h.

**31C5.** Siguin  $[a, b]$  i  $[c, d]$  dos intervals tancats de  $\mathbb{R}$ . Siguin  $x_0, x_1, \dots, x_n, y_0, y_1, \dots, y_n$  nombres reals que compleixen

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d.$$

Proveu que si cadascun dels  $n^2$  rectangles de  $\mathbb{R}^2$ :  $[x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}]$ , ( $0 \leq i, j \leq n-1$ ) té un costat de longitud entera, llavors el rectangle gran  $[a, b] \times [c, d]$  també té un costat de longitud entera.

**31C6.** Siguin  $A, B$  i  $C$  els tres angles d'un triangle.

a) Demostreu que es compleix la igualtat

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C.$$

b) Suposeu que tres arrels de l'equació polinòmica  $x^4 - px^3 + qx^2 - rx + s = 0$  són  $\tan A, \tan B$  i  $\tan C$ , on  $A, B$  i  $C$  són els tres angles d'un triangle. Busqueu la quarta arrel en funció solament dels coeficients  $p, q, r, s$  del polinomi.

**31C7.** Busqueu una fórmula general que permeti conèixer còmodament les hores en les quals la busca horària d'un rellotge i la minutera formen un angle recte. Comproveu aquesta fórmula general per a les 3 i les 9 hores.

**31C8.** Sigui  $ABCD$  un rectangle, dividim el costat  $AB$  en  $p$  parts iguals i el costat  $AD$  en  $q$  parts iguals, amb  $p, q$  enters senars, i considerem la quadrícula resultant.

a) Calculeu el nombre de camins de longitud mínima per la quadrícula que van del vèrtex  $A$  al seu vèrtex oposat  $C$ .

b) Cadascun d'aquests camins tanca amb els costats  $AB$  i  $BC$  una certa àrea. Calculeu la suma d'aquestes àrees.

c) Si  $m$  és la mitjana aritmètica d'aquestes àrees, es demana quants camins tanquen aquesta àrea  $m$ .

---

**Guanyadors:** Sergio Cabello Justo, Thomas Doumenc, Joaquim Puig Sadurní, Ferran Revilla Domingo, Ana de Mier Vinué.

Primera sessió. 24 de febrer de 1995, de 16 h a 20 h.

**31E1.** Es consideren conjunts  $A$  de cent nombres naturals diferents, que tinguin la propietat que si  $a, b, c$  són elements qualssevol (iguals o diferents) de  $A$ , existeix un triangle no obtusangle els costats del qual mesuren  $a, b$  i  $c$  unitats.


S'anomena  $S(A)$  la suma dels perímetres considerats a la definició de  $A$ . Calculeu el valor mínim de  $S(A)$ .

**31E2.** Retallem diversos cercles de paper (no necessàriament iguals) i els estenem sobre una taula de manera que n'hi hagi alguns de superposats (amb part interior comuna), però de tal forma que no hi hagi cap cercle dins d'un altre.

Proveu que és impossible engalzar les peces que resulten de retallar les parts no superposades i compondre amb elles cercles disjunts.

**31E3.** Pel baricentre  $G$  d'un triangle  $ABC$  es traça una recta que talla el costat  $AB$  en  $P$  i el costat  $AC$  en  $Q$ . Demostreu que

$$\frac{PB}{PA} \cdot \frac{QC}{QA} \leq \frac{1}{4}.$$



Segona sessió. 25 de febrer de 1995, de 10 h a 13 h.

**31E4.** Trobeu les solucions enteres de l'equació  $p(x+y) = xy$  on  $p$  és un nombre primer.

**31E5.** Demostreu que en cas que les equacions


$$x^3 + mx - n = 0$$

$$nx^3 - 2m^2x^2 - 5mnx - 2m^3 - n^2 = 0$$

( $n \neq 0$ ), tinguin una arrel comuna, la primera tindrà dues arrels iguals, i determineu llavors les arrels de les dues equacions en funció de  $n$ .

**31E6.** A la figura,  $AB$  és un segment fix i  $C$  un punt variable dins d'ell. Es construeixen triangles equilàters  $ACB'$  i  $CBA'$  de costats  $AC$  i  $CB$  en un mateix semiplà definit per  $AB$ , i un altre triangle equilàter  $ABC'$  de costat  $AB$  en el semiplà oposat. Demostreu:

- Les rectes  $AA'$ ,  $BB'$  i  $CC'$  són concurrents.
- Si anomenem  $P$  el punt comú a les tres rectes del punt a), trobeu el lloc geomètric de  $P$  quan  $C$  varia en el segment  $AB$ .
- Els centres  $A''$ ,  $B''$  i  $C''$  dels tres triangles formen un triangle equilàter.
- Els punts  $A''$ ,  $B''$ ,  $C''$  i  $P$  són concíclics.



**Guanyadors:** Ángel Paredes Galán, Jerónimo Arenas García, Luis Fabiani Bendicho, Jaume Andreu Pascual, Alejandro García Gil, Ignacio Fernández Galván.


Primera sessió. 15 de Desembre de 1995, de 16 h a 20 h.

**32C1.** Un cert professor de matemàtiques va escriure a la pissarra un polinomi  $f(x)$  amb coeficients enters i va dir: "Si al polinomi substituïm  $x$  per l'edat del meu fill, que acaba de fer  $a$  anys, obtenim la igualtat  $f(a) = a$ . A més,  $f(0) = p$  és un nombre primer més gran que  $a$ ." Quants anys té el fill del professor?

**32C2.** Sigui  $n$  un nombre natural. Trobeu el nombre més gran  $k$  tal que en el conjunt  $\{1, 2, \dots, n\}$  puguem agafar un subconjunt  $A$  de  $k$  nombres que compleixi que si  $x, y, z$  són nombres qualssevol de  $A$ , sempre sigui  $x + y \neq z$ .

**32C3.** Escollim un nombre natural  $n$  i demanem a  $r$  persones que escriguin un subconjunt de  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Quina és la probabilitat que els  $r$  subconjunts obtinguts siguin disjunts dos a dos?

**32C4.** Sigui  $AB$  el diàmetre d'una circumferència,  $O$  el punt mig d'un dels arcs que van de  $A$  a  $B$ , i  $C$  un punt qualsevol de l'arc  $OB$ . Dibuixem les rectes  $AC, OC$ , i sigui  $D$  la intersecció de  $OC$  amb  $AB$ . Sigui  $DE$  perpendicular a  $AD$  i  $E$  la seva intersecció amb  $AC$ . Demostreu que els segments  $BD$  i  $DE$  tenen la mateixa longitud.



Segona sessió. 16 de Desembre de 1995, de 9 h a 13 h.

**32C5.** Calculeu un nombre de sis xifres sabent que passant-ne l'última al davant queda dividit per 3.

**32C6.** Calculeu el màxim comú divisor de

$$\binom{n}{k}, \binom{n+1}{k}, \dots, \binom{n+k}{k},$$

on  $n$  i  $k$  són nombres naturals,  $n \geq k$ .

**32C7.** Demostreu que si un polígon inscrit en una circumferència de radi  $r$  té costats de longituds  $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ , es compleix

$$\ell_1^2 + \ell_2^2 + \dots + \ell_n^2 \leq 9r^2.$$

Determineu per quins polígons hi ha igualtat.

**32C8.** Donat un nombre natural  $n$ , sigui  $p(n)$  el producte de les seves xifres. Demostreu que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0.$$

---

**Guanyadors:** Edgar Güeto de la Rosa, Raúl Martín Álvarez, Víctor Martínez de Albéniz Margalef, Sergi Elizalde Torrent, Joel Gabàs Masip, Lluís Tarafa Mate, Max Bernstein Obiols, Diego Pozo Tortosa.



Primera sessió. 22 de febrer de 1996, de 16 h a 20 h.

**32E1.** Els nombres naturals  $a$  i  $b$  són tals que

$$\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a}$$

és un enter. Demostreu que el màxim comú divisor de  $a$  i  $b$  no és més gran que  $\sqrt{a+b}$ .

**32E2.** Sigui  $G$  el baricentre del triangle  $ABC$ . Demostreu que si

$$AB + GC = AC + GB,$$

llavors el triangle és isòsceles.

**32E3.** Siguin  $a, b, c$  tres nombres reals. Es consideren les funcions

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{i} \quad g(x) = cx^2 + bx + a.$$

Sabent que

$$|f(-1)| \leq 1, \quad |f(0)| \leq 1, \quad \text{i} \quad |f(1)| \leq 1,$$

proveu que si  $-1 \leq x \leq 1$ , aleshores  $|f(x)| \leq 5/4$  i  $|g(x)| \leq 2$ .


**32E4.** Discutiui l'existència de solucions reals  $x$  de l'equació

$$\sqrt{x^2 - p} + 2\sqrt{x^2 - 1} = x$$

segons els valors reals del paràmetre  $p$ , i resoleu-la en els casos que tingui solució.

**32E5.** A *Port Aventura* hi ha 16 agents secrets. Cada un d'ells vigila algun dels seus col·legues. Se sap que si l'agent  $A$  vigila l'agent  $B$ , aleshores  $B$  no vigila  $A$ . Sabem també que 10 agents qualssevol poden ser numerats de manera que el primer vigila el segon, aquest vigila el tercer, ..., el desè vigila el primer. Demostreu que també es poden numerar d'aquesta manera 11 agents qualssevol.

**32E6.** La figura adjunta es compon de sis pentàgons regulars de costat un metre. Es doblega per la línia de punts fins que coincideixen les arestes no puntejades que es tallen en un vèrtex. Quin volum d'aigua hi cap, al recipient així format?



---

**Guanyadors:** Sergi Elizalde Torrent, Tomás Palacios Gutiérrez, Fernando Rambla Blanco, Antonio Jara de las Heras, Patricia Sebastián Celorrio, Víctor Martínez de Albéniz Margalef.

Primera sessió. 13 de Desembre de 1996, de 16 h a 20 h.

**33C1.** Amb dos filferros de 1996 cm de llarg cadascun, dos filferros de 1997 cm de llarg cadascun i dos filferros 1998 cm de llarg cadascun, es construeix un tetràedre de manera que les sis arestes resulten ser tangents a una esfera. Raoneu en quina posició relativa hem situat les arestes.

**33C2.** Un rellotger molt de la broma té a l'aparador de la seva botiga un rellotge amb les dues busques — la *minutera* i l'*horària* — exactament iguals. Una persona que s'hi fixi una mica, quasibé sempre pot deduir quina és la busca horària i quina la minutera, i deduir, doncs, quina hora és. Tanmateix, però, en alguns casos això no és possible. Si en aquests casos s'escull a l'atzar una busca con a horària i l'altra com a minutera, i l'elecció és incorrecta, es cometrà un error en la lectura de l'hora. La diferència més curta entre l'hora llegida i l'hora real no pot ser en cap cas superior a les 6 hores.

a) Descriviu les situacions en què no es pot saber quina hora és.

b) Estudieu quin és el màxim error que es pot arribar a cometre i a quines hores es produeix aquest màxim error.

**33C3.** En una bossa hi ha  $n$  boles blanques numerades de 1 a  $n$ ,  $n$  boles blaves numerades de 1 a  $n$  i  $n$  boles grogues numerades de 1 a  $n$ , essent  $n \geq 4$ . Es treuen 4 boles d'aquesta bossa totes alhora. Esudieu, segons els valors de  $n$ , quins dels esdeveniments següents és més difícil que es doni, és a dir, té una probabilitat més petita:

$A = \{\text{treure les quatre boles del mateix color}\}$

$B = \{\text{treure quatre boles amb números correlatius}\}$

$C = \{\text{treure tres boles d'un mateix número i l'altra no}\}.$

**33C4.** Sigui  $C$  un con recte de radi  $r$  i altura  $h$ . Sigui  $V$  el vèrtex del con i  $AB$  un diàmetre de la base circular de centre  $O$ . Els plans  $\mathcal{P}$  paral·lels a la generatriu  $VA$  del con que tallen la base circular segons cordes  $MN$  perpendiculars a  $AB$ , tallen la superfície cònica segons una paràbola. Trobeu la distància  $d$  de la corda  $MN$  al centre  $O$  per tal que l'àrea de la intersecció de  $\mathcal{P}$  amb  $C$  sigui màxima.

*Segona sessió. 14 de Desembre de 1996, de 9 h a 13 h.*

**33C5.** Al pla definim un sistema de coordenades rectangulars. Calculeu l'àrea del recinte solució del sistema d'inequacions següent:

$$\begin{cases} |\sqrt{3}y - x| \leq 2x \\ x^2 + y^2 \leq 2x. \end{cases}$$

**33C6.** Busqueu els nombres complexos  $\alpha$  tals que els afixos dels nombres  $\alpha$ ,  $\alpha^2$ ,  $\alpha^3$ ,  $\alpha^4$  siguin els vèrtexs d'un trapezi.

**33C7.** Hi ha una fórmula que dona l'àrea  $A$  d'un triangle del pla que els vèrtexs situats en punts de coordenades enteres com a funció lineal  $A = aI + bC + dV$ , on  $I$  representa el nombre de punts de coordenades enteres que són interiors al triangle;  $C$  el nombre dels que queden situats sobre els costats del triangle; i  $V = 3$  és el nombre de vèrtexs de coordenades enteres. Deduïu-la, a partir de l'anàlisi d'alguns exemples, i demostreu-la.

**33C8.** Anomenarem *polígon mixtilini* una regió tancada del pla limitada per *costats* que poden ser segments o arcs de circumferència. Els *angles* del polígon mixtilini es mesuren en graus i són, en cada vèrtex, els que determinen els costats (cas que siguin segments), o les tangents traçades pel vèrtex als costats que siguin arcs.

Els *costats* del polígon es mesuren també en graus, de la manera següent:

- 1) segments:  $0^\circ$ .
- 2) arcs amb la concavitat cap a l'interior del polígon: els graus que mesura l'arc, comptats positius.
- 3) arcs amb la concavitat cap a l'exterior del polígon: els graus que mesura l'arc, comptats negatius.


L'esquema il·lustra la manera de mesurar els costats i els angles d'un polígon mixtilini.

a) Demostreu que si en un polígon de  $n$  costats els angles són  $A_1, A_2, \dots, A_n$  i els costats són  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , llavors es compleix

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n + (n - 2) 180^\circ.$$

b) Demostreu que si els tres costats d'un *triangle* mixtilini tenen un punt en comú que no és un vèrtex, llavors  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$ .

c) Si tenim un *angle* mixtilini  $A$  inscrit en una circumferència, calculeu  $A$  en funció dels costats  $\alpha$ ,  $\beta$  i  $\gamma$  del triangle que queda determinat a la circumferència.





Primera sessió. 7 de Març de 1997, de 16 h a 20 h.

**33E1.** Calculeu la suma dels quadrats dels cent primers termes d'una progressió aritmètica sabent que la suma de tots els termes val  $-1$ , i la suma dels que ocupen el lloc parell val  $+1$ .

**33E2.** Un quadrat de costat 5 es divideix en 25 quadrats unitat per mitjà de rectes paral·leles als costats. Sigui  $A$  el conjunt dels 16 punts interiors, que són vèrtexs dels quadrats unitat, però que no estan en els costats del quadrat inicial.

Digueu quin és el més gran nombre de punts de  $A$  que es poden elegir de manera que tres qualssevol d'ells no siguin vèrtexs d'un triangle rectangle isòscele.

**33E3.** Es consideren les paràboles  $y = x^2 + px + q$  que tallen els eixos de coordenades en tres punts diferents, pels quals es fa passar una circumferència. Demostreu que totes les circumferències traçades en variar  $p$  i  $q$  a  $\mathbb{R}$  passen per un punt fix, que cal determinar.

**33E4.** Sigui  $p$  un nombre primer. Determineu tots els enters  $k \in \mathbb{Z}$  tals que  $\sqrt{k^2 - pk}$  és un enter positiu.

**33E5.** Demostreu que en un quadrilàter convex d'àrea unitat, la suma de les longituds de tots els costats i diagonals no és menor que  $2(2 + \sqrt{2})$ .

**33E6.** Per fer una volta completa en un cotxe a un circuit circular, la quantitat exacta de benzina està distribuïda en dipòsits fixos situats en  $n$  punts diferents qualssevol del circuit. Inicialment el dipòsit del cotxe està buit. Demostreu que qualsevol que sigui la distribució del combustible als dipòsits, sempre existeix un punt de sortida de forma que es pugui fer una volta completa.

Aclariments:

Se suposa que el consum és uniforme i proporcional a la distància.


El dipòsit del cotxe té capacitat suficient per tota la benzina.



Primera sessió. 12 de Desembre de 1997, de 16 h a 20 h.

**34C1.** Si  $p(x)$  és un polinomi amb coeficients naturals del qual coneixem  $p(1)$  i  $p(p(1))$ , com podem calcular els seus coeficients?

**34C2.** Tenim una bola en un billar defectuós amb una cantonada que fa un angle lleugerament inferior a  $90^\circ$  com a la figura. De quantes maneres podem llançar la bola (sense efecte) de forma que toqui les dues bandes i torni a la posició inicial? I si l'angle de la cantonada és superior a  $90^\circ$ ?



**34C3.** Siguin  $s$  i  $t$  nombres reals positius tals que  $s < t$ . Demostreu que hi ha exactament tres parelles de triangles  $S$  i  $T$  que compleixen:

- 1)  $S$  i  $T$  són semblants.
- 2) Les longituds dels costats de  $S$  i de  $T$  formen progressions aritmètiques de raons  $s$  i  $t$ , respectivament.
- 3) La longitud d'un costat de  $S$  és igual a la longitud d'un costat de  $T$ .

Comproveu també que el perímetre d'un dels tres triangles  $S$  així obtinguts és igual a la suma dels perímetres dels altres dos.

**34C4.** Sigui  $C$  la circumferència més gran que podem posar dins d'un quadrat  $Q$ . Comproveu que donat un nombre  $\varepsilon > 0$  hi ha un nombre  $r < \varepsilon$  tal que dins del quadrat podem posar-hi circumferències de radi  $r$  (que no es tallin però que poden ser tangents) de manera que la suma de les àrees d'aquests cercles sigui igual a l'àrea del cercle  $C$ .

**34C5.** Trobeu els nombres  $n$  que compleixen que la suma dels quadrats de  $n$  enters consecutius qualssevilla sigui divisible per  $n$ . En particular, digueu quin és el més gran i el més petit d'aquests nombres que tenen dues xifres. (Es compleix que  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$ .)

**34C6.** • Demostreu que si el nombre  $a$  o el nombre  $b$  són naturals, llavors

$$0 = |\sin \pi(x+a) \sin \pi(y+b)| + |\sin \pi x \sin \pi y| - |\sin \pi x \sin \pi(y+b)| - |\sin \pi(x+a) \sin \pi y|.$$

• Si tenim un rectangle que es pot descompondre en una unió de rectangles més petits, tots ells de costats paral·lels als del rectangle gran i amb algun dels seus costats de longitud un nombre natural, demostreu que el rectangle gran també té algun dels seus costats de longitud un nombre natural.

**34C7.** Un tetràedre té les quatre cares que són triangles amb els costats en progressió aritmètica. La raó de la progressió aritmètica de dues cares és la mateixa. Digueu com són aquests tetràedres.

**34C8.**

Resoleu la següent equació


$$\arctan(x-1) + \arctan x + \arctan(x+1) = \arctan 3x.$$

---

**Guanyadors:** Marc Martínez de Albéniz Margalef, Lluís Acero Sistach, Xavier Gratal Martínez, Edgar González Pellicer, Aniol Llorente Saguer, Àngel Faus Tomás, Eduard Viladesau Franquesa, Antoni Conejero Cárceles.

Primera sessió. 13 de Març de 1998, de 16 h a 20 h.

**34E1.** Un quadrat  $ABCD$  de centre  $O$  i costat  $\ell$  gira un angle  $\alpha$  al voltant de  $O$ . Trobeu l'àrea comuna als dos quadrats.



**34E2.** Trobeu tots els nombres naturals de quatre xifres, escrits en base 10, que siguin iguals al cub de la suma de les seves xifres.

**34E3.** Es considera un triangle  $ABC$  i la circumferència circumscriu. Si  $D$  i  $E$  són punts sobre el costat  $BC$  tals que  $AD$  i  $AE$  són, respectivament, paral·leles a les tangents en  $C$  i  $B$  a la circumferència circumscriu, demostreu que

$$\frac{BE}{CD} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Segona sessió. 14 de Març de 1998, de 9 h a 13 h.


**34E4.** Trobeu les tangents dels angles d'un triangle sabent que són nombres enters positius.

**34E5.** Trobeu totes les funcions  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  estrictament creixents i tals que

$$f(n + f(n)) = 2f(n)$$

per  $n = 1, 2, 3, \dots$

**34E6.** Determineu els valors de  $n$  per als quals és possible construir un quadrat  $n \times n$  engalçant peces del tipus




---

**Guanyadors:** Mario Andrés Montes García, Ramón José Aliaga Varea, David Martín Clavo, María Pe Pereira, Beatriz Sanz Merino, Jaime Vinuesa del Rio.

Primera sessió. 11 de Desembre de 1998, de 16 h a 20 h.

**35C1.** Determineu les possibles àrees dels tetràedres que tenen tres arestes de 2 metres i tres arestes de 3 metres.

**35C2.** Disposicions regulars com les de la figura:



contenen, respectivament, 22, 24 i 49 llumins. Algunes disposicions, com la de 24 llumins, són quadrades. A més, amb 22 llumins es poden fer dues disposicions diferents, amb 24 només una i amb 5 llumins no se'n pot fer cap.

- Doneu una condició per a  $n$  per tal que, donats  $n$  llumins, sigui possible fer alguna disposició rectangular com les de la figura.
- Doneu una condició per a  $n$  per tal que, donats  $n$  llumins, sigui possible fer una disposició quadrada.
- Doneu una condició per a  $n$  per tal que, donats  $n$  llumins, sigui possible fer només una única disposició.

**35C3.** Un bidó cilíndric, amb massa en buit  $M$ , conté una massa  $m_0$  d'oli quan és ple. El centre de masses (o de gravetat, o baricentre) del bidó ple és en el punt mitjà de l'altura. En començar a buidar el bidó el centre de masses baixa. Però, quan el bidó és buit, torna a ser en el punt mitjà.

Quina massa d'oli hi ha al bidó quan el centre de masses és en el punt més baix?

**35C4.** Ens interessem per les parelles de funcions  $f, g$  que compleixen:

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g'(x).$$

- trobeu totes aquestes parelles en el cas  $f = g$ .
- Trobeu totes les funcions  $g$  quan  $f(x) = x^n$ , amb  $n$  enter positiu.

**35C5.** Demostreu que el nombre de cares d'un políedre convex que tenen un nombre senar de costats és parell.

Demostreu també que la suma dels angles de totes les cares d'un políedre convex és  $n \cdot 360^\circ$ , amb  $n$  enter.

**35C6.** Proveu que si tenim 1998 punts en el pla de manera que no n'hi hagi tres d'alineats, aleshores hi ha 666 triangles disjunts que els tenen com a vèrtexs.

**35C7.** Determineu les longituds dels costats de tots els triangles rectangles amb costats de longitud entera, als quals es pot inscriure un cercle de radi 6.

**35C8.** Trobeu tots els nombres enters iguals a la suma dels quadrats de les seves xifres.

---

**Guanyadors:** Edgar González Pellicer, Joaquim Molera Vidal, Dario Mora Portela, Marc Vinyes Raso, Pere Menal Ferrer, Óscar Barenys García, Fèlix Llopart Miquel, Domènec Martín García.

Primera sessió. 12 de Març de 1999, de 16 a 20 hores.

**35E1.** Les rectes  $t$  i  $t'$  tangents a la paràbola d'equació  $y = x^2$  als punts  $A$  i  $B$  es tallen en el punt  $C$ . La mitjana del triangle  $ABC$  corresponent al vèrtex  $C$  té longitud  $m$ . Determineu l'àrea del triangle  $ABC$  en funció de  $m$ .

**35E2.** Demostreu que existeix una successió d'enters positius  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  tal que


$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2$$

és un quadrat perfecte per a tot enter positiu  $n$ .

**35E3.** Sobre un tauler en forma de triangle equilàter amb  $n$  files (tal com s'indica a la figura), es juga un solitari.

Sobre cada casella es col·loca una fitxa. Cada fitxa és blanca per un costat i negra per l'altre. Inicialment, només una fitxa, que està situada en un vèrtex, té la cara negra cap amunt; les altres fitxes tenen la cara blanca cap amunt. En cada moviment del joc es retira només una fitxa negra del tauler i es fa la volta a cada una de les fitxes que ocupen una casella veïna. (Caselles veïnes són les que estan unides per un segment.)

És possible treure totes les fitxes del tauler, després d'un cert nombre de moviments?



**35E4.** Una caixa conté 900 targetes numerades del 100 al 999. Es treuen targetes a l'atzar (sense reposició) de la caixa i s'anota la suma dels dígit de cada targeta extreta. Quina és la menor quantitat de targetes que s'han de treure, per tal de garantir que al menys tres de les sumes siguin iguals?

**35E5.** El baricentre del triangle  $ABC$  és  $G$ . Denotem per  $g_a, g_b, g_c$  les distàncies des de  $G$  als costats  $a, b, c$ , respectivament. Sigui  $r$  el radi de la circumferència inscrita.

a) Demostreu que

$$g_a \geq \frac{2r}{3}, \quad g_b \geq \frac{2r}{3}, \quad g_c \geq \frac{2r}{3}.$$

b) Demostreu que

$$\frac{g_a + g_b + g_c}{r} \geq 3.$$


**35E6.** Es divideix el pla en un nombre finit de regions  $n$  per mitjà de tres famílies de rectes paral·leles. No hi ha tres rectes que passin pel mateix punt. ¿Quin és el mínim nombre de rectes necessàries per tal que  $n > 1999$ ?





Primera sessió. 10 de Desembre de 19989, de 16 h a 20 h.


**36C1.** Amb quadrats i triangles equilàters de costat unitat es poden construir polígons convexos. Per exemple, es poden unir dos triangles i un quadrat per a formar un hexàgon, i tres triangles i dos quadrats per a formar un heptàgon, com es mostra al dibuix (la regió tancada pel polígon ha d'estar recoberta exactament pels quadrats i triangles utilitzats).



Quin és el nombre màxim de costats d'un polígon convex que es pot construir amb aquest mètode?

**36C2.** En un triangle  $ABC$ , el radi de la circumferència circumscrita és  $R$ . Es tracen tres rectes tangents a la circumferència inscrita i paral·leles als costats, que formen tres triangles més petits en els vèrtexs del triangle, com es veu a la figura. Si es radiis de les circumferències circumscrites als tres triangles petits són  $R_A$ ,  $R_B$ ,  $R_C$ , demostreu que

$$R = R_A + R_B + R_C.$$



**36C3.** Un professor de matemàtiques va escriure a la pissarra el polinomi quadràtic  $x^2 + 10x + 20$ . Llavors cada alumne havia d'augmentar o disminuir en 1, o bé el terme constant, o bé el terme lineal. Finalment, va quedar escrit a la pissarra el polinomi  $x^2 + 20x + 10$ . Hi va haver en algun moment, escrit a la pissarra, un polinomi quadràtic amb zeros enters?

**36C4.** Tenim una calculadora que no funciona gaire bé. Només funcionen les tecles:  $\boxed{+}$  (suma),  $\boxed{-}$  (resta),  $\boxed{1/x}$  (invers). Com podem calcular el producte de dos nombres reals amb aquesta calculadora?

**36C5.** Un tetràedre complex que, per a cada vèrtex, la suma dels cosinus dels angles díedres de les tres arestes adjacents és 1. Demostreu que els díedres d'arestes oposades són iguals.

**36C6.** Si  $n$  és un nombre natural i  $2^{n+12}$  i  $2^n$  denoten la mesura d'un angle expressada en graus, demostreu que

$$\sin(2^{n+12}) = \sin(2^n) \text{ si } n \geq 3.$$

Trobeu també el valor més petit de  $n$  per al qual l'expressió  $\sin(2^n)$  pren el valor més gran possible.

**36C7.** En el pla tenim  $n$  rectes de les quals no n'hi ha tres que passin per un mateix punt. Aquestes rectes es tallen en 1999 punts.

- a) Determineu el valor màxim i mínim de  $n$ .
- b) Determineu els valors de  $n$  més grans que 500.

**36C8.** Demostreu que si el producte de dos nombres positius és constant, la suma d'aquests dos nombres és mínima quan els nombres són iguals.

Trobeu el valor mínim de la funció

$$f(x) = \frac{9x^2 \sin^2 x + 4}{x \sin x}$$

a l'interval  $0 < x < \pi$ .

Primera sessió. 30 de Març de 2000.


**36E1.** Siguin els polinomis:

$$P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1;$$

$$Q(x) = x^4 + cx^3 + bx^2 + ax + 1.$$

Trobeu les condicions que han de complir els paràmetres reals  $a$ ,  $b$  y  $c$ , ( $a \neq c$ ), per tal que  $P(x)$  y  $Q(x)$  tinguin dues arrels comunes, i resolcu en aquest cas les equacions  $P(x) = 0$ ;  $Q(x) = 0$ .

**36E2.** La figura mostra un planol amb carrers que delimiten 12 illes quadrades. Una persona  $P$  va des de  $A$  fins a  $B$  y una altra  $Q$  des de  $B$  fins a  $A$ . Totes dues surten a la vegada seguint camins de longitud mínima amb la mateixa velocitat constant. A cada punt amb dues possibles direccions a seguir, totes dues tenen la mateixa probabilitat. Trobeu la probabilitat que  $P$  i  $Q$  es creuin.



**36E3.** Dues circumferències  $C_1$  i  $C_2$  de radis  $r_1$  i  $r_2$  es tallen en els punts  $A$  i  $B$ . Per  $B$  es traça una recta variable que talla altra vegada  $C_1$  i  $C_2$  en dos punts que designarem per  $P_r$  i  $Q_r$ , respectivament.

Demostreu la següent propietat: Existeix un punt  $M$ , que depèn només de  $C_1$  i  $C_2$ , tal que la mediatriu del segment  $P_rQ_r$  passa per  $M$ .

**36E4.** Trobeu l'enter més gran  $N$  que compleixi les condicions següents:

a)  $E(N/3)$  té les tres xifres iguals.

b)  $E(N/3)$  és suma de nombres naturals consecutius a partir de 1, és a dir, existeix un natural  $n$  tal que

$$E(N/3) = 1 + 2 + 3 + \dots + n.$$


*Nota:*  $E(x)$  és la part entera de  $x$ .

**36E5.** Considerem quatre punts situats a l'interior o la frontera d'un quadrat de costat

1. Demostreu que al menys dos d'ells estan a una distància menor o igual que 1.

**36E6.** Demostreu que no existeix cap funció  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  que compleixi

$$f(f(n)) = n + 1.$$



## Geometria clàssica

Sebastià Gimbal / Descomps

# PART TEMÀTICA

Aquest capítol conté un propòsit **1** de geometria euclídea (seccions 1 i 2) i una col·lecció de problemes **2** amb una taula de solucions, que presentem en dues modalitats: d'una manera convencional a la secció 3 i amb forma de diàleg a la secció 4. La raó d'aquesta modalitat és que, malgrat el fet que els problemes són bàsicament d'una manera digna de ser estudiats, hi ha alguns problemes que poden ser útils a alguns lectors.

Al lector més interessat en la resolució de problemes de geometria euclídea, li hem de recomanar que comenci a treballar directament la llista de problemes, i que retorni a la matèria del capítol (o a algun dels sectors indicats a les referències) només quan ho consideri necessari.

En canvi, al lector més motivat per comprendre els seus fonaments geomètrics, li hem (una vegada més) recomanat que, per altra banda, pugi per una general del que el nivell de la nostra exposició pugui fer pensar, sense tot obstant, al tractament de la geometria que es dona a primària i secundària, i li hem de recomanar que estudi primer les seccions 1 i 2, una al punt d'omplir tots els detalls de les demostracions que s'ometen, o de les demostracions de les quals només es donen les conclusions principals, i de resoldre satisfactoriament els exercicis intercalats.

Per contrast amb un estudi convencional de la geometria, en el qual es presenten propietats més importants i s'organitzen sistemàticament a partir d'axiomes convenients, en aquesta exposició presentem un enfocament més lliure de les nocions i els enunciats més rellevants de la geometria euclídea: punts, línia, rectes, angles i circumferències. Existeix així una gran discrepància, relativa a la construcció i anàlisi metòdica d'aquests conceptes i enunciats, que no s'aportaria guaire més als propòsits del capítol i que, en tot cas, s'abandona en capítols específics de geometria.

El signe del al final d'un afirmació significa que es considera que la prova d'aquesta és fàcil i ràpida, però potser no totalment immediata, i per tant es recomana que el lector la comprovi efectivament abans de presentar-la a l'lectura.

30E4. Trobeu l'ordre dels nombres  $N$  que compleixen les condicions següents:

- $E(N/3)$  té les tres xifres iguals.
- $E(N/3)$  és suma de nombres naturals consecutius a partir de 1, és a dir, existeix un natural  $n$  tal que

$$E(N/3) = 1 + 2 + 3 + \dots + n.$$

Nota:  $E(x)$  és la part entera de  $x$ .

30E5. Considereu un quadrat amb la diagonal d'un quadrat de costat 1. Dibuixem una línia vertical que divideix el quadrat en dues parts iguals.

30E6. Trobeu el nombre de solucions enteres de l'equació

$$x^2 + y^2 = 1.$$

## Geometria clàssica

*Sebastià Xambó i Descamps*

Aquest capítol conté un promptuari de conceptes bàsics de geometria elemental (seccions 1 i 2) i una col·lecció de problemes (secció 3). També conté una mostra de solucions, que presentem en dues modalitats: d'una manera convencional a la secció 5 i amb forma de diàleg a la secció 4. La raó d'incloure aquesta modalitat està en el fet que ens permet introduir, d'una manera directa i breu, qüestions relatives a la resolució de problemes que poden ser útils a alguns lectors.

Al lector més interessat en la resolució de problemes de geometria clàssica, li hem de recomanar que comenci a treballar directament la llista de problemes, i que retorni a la matèria del capítol (o a algun dels textos indicats a les referències) només quan ho consideri necessari.

En canvi, al lector més motivat per completar els seus coneixements geomètrics bàsics (una necessitat que, per altra banda, pot ser més general del que el nivell de la nostra exposició podria fer pensar, sobretot atenent al tractament de la geometria que es dona a primària i secundària), li hem de recomanar que estudiï primer les seccions 1 i 2, fins al punt d'omplir tots els detalls de les demostracions que s'ometen, o de les demostracions de les quals només es donen les pinzellades principals, i de resoldre satisfactòriament els exercicis intercalats.

Per contrast amb un estudi sistemàtic de la geometria, en el qual els sistemes geomètrics més importants s'erigeixen sistemàticament a partir d'axiomes convenients, en aquesta exposició pressuposem un coneixement intuïtiu de les nocions i els enunciats més primitius de la geometria euclidiana plana, com ara els relatius a punts, rectes, angles i circumferències. Evitem així prolixes disquisicions, relatives a la construcció i anàlisi metòdica d'aquests conceptes i enunciats, que no aportarien gaire res als propòsits del capítol i que, en tot cas, s'estudien en cursos específics de geometria.

El signe [o] al final d'una afirmació significa que es considera que la prova d'aquesta és fàcil o rutinària, però potser no totalment immediata, i per tant es recomana que el lector la comprovi efectivament abans de prosseguir la lectura.

## 1 Triangles i circumferències

El fet que moltes figures es puguin estudiar relacionant-les amb triangles, com ara quan admeten una triangulació, fa que el triangle s'hagi de considerar com una figura fonamental, i és per aquesta raó que se li dedica un espai considerable en els textos de geometria clàssica. Per altra banda, l'estudi del triangle ha estat inseparable del de la circumferència, bàsicament a causa del fet que tot triangle determina una única circumferència en la qual és inscrit (*circumferència circumscrita*). Com a objecte d'aquesta secció ens hem proposat, doncs, fer una revisió d'algunes de les propietats bàsiques del triangle i d'algunes de les relacions més remarcables entre triangles i circumferències.

### Propietats bàsiques del triangle

Si  $ABC$  és un triangle, posarem  $a, b, c$  per indicar els costats oposats a  $A, B, C$ , respectivament. Els angles corresponents als vèrtexs es denotaran  $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ , o  $\alpha, \beta, \gamma$ ; són els angles oposats als costats  $a, b, c$ , respectivament. L'altura corresponent al vèrtex  $A$  es denotarà  $h_A$  o  $h_a$  (i, anàlogament,  $h_B$  o  $h_b$  per al vèrtex  $B$ , i  $h_C$  o  $h_c$  per al vèrtex  $C$ ). Amb les notacions  $AB$  i  $[AB]$  indiquem, respectivament, la recta que uneix els punts  $A$  i  $B$  i el segment (tancat) d'extremes  $A$  i  $B$ . El corresponent segment obert serà denotat  $(AB)$ . La longitud del segment  $[AB]$  serà denotada  $AB$  si pel context no hi ha perill que es pugui confondre amb la recta que uneix  $A$  i  $B$ ; en cas contrari, la denotarem  $|AB|$  o  $\overline{AB}$ .

### Igualtat de triangles

Un desplaçament és una transformació dels punts del pla que conserva les distàncies (vegeu el subapartat "Desplaçaments", pàg. 174). Dos triangles  $ABC$  i  $A'B'C'$  es diuen *iguals*, o *congruents*, quan hi ha un desplaçament  $\varphi$  tal que  $\varphi(A) = A'$ ,  $\varphi(B) = B'$  i  $\varphi(C) = C'$ . Per als tres criteris d'igualtat que segueixen, vegeu la figura 1.




Figura 1: Criteris d'igualtat de triangles

**Criteri CAC.** Dos triangles són iguals si tenen iguals, respectivament, dos costats i l'angle que formen. En particular, dos triangles rectangles són iguals quan els corresponents catets són iguals.




**Criteri ACA.** Dos triangles són iguals si tenen iguals, respectivament, un costat i els seus dos angles contigus. En particular, dos triangles rectangles són iguals si tenen iguals un catet i el corresponent angle agut.

**Criteri CCC.** Dos triangles són iguals si tenen iguals, respectivament, els tres costats.

### Suma dels angles d'un triangle

La suma dels tres angles de qualsevol triangle és  $\pi$  (figura 2).



**Figura 2:** Suma dels angles d'un triangle

**E.1.-** Proveu que l'altura sobre el major dels costats d'un triangle és interior al triangle i inferior a les altres dues altures.

**E.2.-** Sigui  $P$  el punt a l'interior d'un quadrat  $ABCD$  tal que  $\widehat{PCD} = \widehat{PDC} = 15^\circ$ . Demostreu que el triangle  $ABP$  és equilàter (indicació: formeu un triangle  $BCP'$  congruent amb  $CDP$  i amb  $P'$  interior al quadrat).

### Desigualtat triangular

En un triangle cada costat és inferior a la suma dels altres dos.

**E.3.-** Donat un punt  $P$  a l'interior d'un triangle  $ABC$ , demostreu que  $AP + BP < AC + BC$ .

### Àrea d'un triangle

S'obté com la meitat del producte d'un costat (base) per la corresponent altura (per exemple, àrea =  $\frac{1}{2}ah_A$ , on  $h_A$  denota l'altura corresponent al vèrtex  $A$ ). També és igual a la meitat del producte de dos costats pel sinus de l'angle que formen (per exemple,  $h_A = b \sin(\gamma)$ ) i, per tant, àrea =  $\frac{1}{2}ab \sin(\gamma)$ ). Observeu que si movem un vèrtex sobre la paral·lela a la base oposada, els triangles resultants tenen tots la mateixa àrea.

**E.4.-** Donat un quadrilàter convex  $ABCD$ , demostreu que la seva àrea és igual a  $\frac{1}{2}AC \cdot BD \cdot \sin(\alpha)$ , on  $\alpha$  és un qualsevol dels dos angles que formen les diagonals  $AC$  i  $BD$ .

## Geometria

E. 5.- (Teorema de Ceva.) Sigui  $ABC$  un triangle i  $X, Y$  i  $Z$  punts dels segments oberts  $(BC)$ ,  $(CA)$  i  $(AB)$ , respectivament. Demostreu que les rectes  $AX, BY$  i  $CZ$  són concurrents si i només si

$$\frac{BX}{XC} \cdot \frac{CY}{YA} \cdot \frac{AZ}{ZB} = 1$$

(si  $AX, BY$  i  $CZ$  són concurrents en el punt  $P$ , proveu que  $BX/XC$  és igual al quocient de les àrees dels triangles  $APB$  i  $APC$ ).

D'una recta que uneix un vèrtex  $A$  d'un triangle amb un punt del costat oposat  $[BC]$ , se'n diu una *ceviana* del triangle respecte del vèrtex  $A$ .

### Teorema de Pitàgores

En un triangle rectangle, el quadrat de la hipotenusa és la suma dels quadrats dels catets. Per a una demostració, vegeu l'exercici que segueix.




Figura 3: Teorema de Pitàgores

E. 6.- Amb les notacions de la figura 3, mostreu que si el triangle  $ABC$  és rectangle, amb  $A$  l'angle recte, i  $AP$  és l'altura corresponent al vèrtex  $A$ , llavors l'àrea del quadrat  $AD$  és igual a l'àrea del rectangle  $BPP'B'$ . Deduïu-ne el teorema del catet (vegeu l'epígraf "Teorema del catet", pàg. 179) i el teorema de Pitàgores.

*Teorema del cosinus*

En un triangle de costats  $a, b, c$ , es compleix que

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha),$$

on  $\alpha$  és l'angle oposat al costat  $a$  (aquest enunciat es dedueix fàcilment a partir del teorema de Pitàgores aplicat als triangles  $APC$  i  $BPC$ , on  $P$  és el peu de l'altura de  $C$ ).

**E. 7.-** Si dos triangles tenen dos parells de costats respectivament iguals i els corresponents angles desiguals, llavors entre els costats oposats a aquests angles hi ha la mateixa relació de desigualtat.

*Teorema del sinus*

En un triangle de costats  $a, b$  i  $c$ , i angles  $\alpha, \beta$  i  $\gamma$ , es compleix que

$$\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{c}.$$

Aquesta propietat surt directament de les definicions: si  $h$  és l'altura del vèrtex  $C$  d'un triangle  $ABC$ , llavors  $h = a \sin(\beta) = b \sin(\alpha)$ , d'on resulta la primera de les igualtats. Aplicant el mateix raonament als costats  $b$  i  $c$ , s'obté la segona igualtat. El valor comú dels quocients  $a/\sin(\alpha)$ ,  $b/\sin(\beta)$  i  $c/\sin(\gamma)$  serà determinat al subapartat "Radi de la circumferència circumscrita", pàg. (183).

**E. 8.-** Sigui  $ABC$  un triangle i suposem que  $\beta'$  i  $\gamma'$  són angles tals que  $\alpha + \beta' + \gamma' = \pi$  i  $b/\sin(\beta') = c/\sin(\gamma')$ . Demostreu que  $\beta' = \beta$  i  $\gamma' = \gamma$ .

*Longitud de les mitjanes*

Les *mitjanes* d'un triangle són les rectes que uneixen els seus vèrtexs amb els punts mitjans dels costats oposats corresponents.

Si  $M$  és el punt mitjà del costat  $AB$  i  $m = CM$ , on  $ABC$  és un triangle donat, aplicant el teorema del cosinus als triangles  $MAC$  i  $MBC$ , i sumant i restant les dues relacions que s'obtenen, s'arriba fàcilment a les dues relacions següents:

$$a^2 + b^2 = 2\left(\frac{c^2}{4} + m^2\right), \quad a^2 - b^2 = 2cd,$$

on  $d$  és la distància de  $M$  al peu  $P$  de l'altura del vèrtex  $C$  i on hem suposat  $a \geq b$ .

La primera de les relacions anteriors ens permet trobar la mitjana  $m$  en funció dels costats  $a, b, c$ :

$$m^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}.$$

**E. 9.-** Si en un triangle dues mitjanes són iguals, llavors el triangle és isòsceles.

## Geometria

E.10.- Siguin  $A$  i  $B$  dos punts,  $M$  el seu punt mitjà,  $c = AB$  i  $k \geq c^2/2$  un nombre real. Proveu que la circumferència de centre  $M$  i radi  $\sqrt{k/2 - c^2/4}$  coincideix amb el lloc geomètric dels punts tals que la suma dels quadrats de les seves distàncies a  $A$  i a  $B$  és igual a  $k$ .

E.11.- Amb les mateixes notacions i hipòtesis que en l'exercici anterior, proveu que el lloc geomètric dels punts tals que la diferència dels quadrats de les seves distàncies a  $B$  i a  $A$  és igual a  $k$ , coincideix amb la recta perpendicular a  $AB$  pel punt del segment  $[AM]$  que és a la distància  $k/(2c)$  de  $M$ .

### Alguns punts associats a un triangle

En cada triangle es poden considerar diversos punts que tenen, cada un d'ells, una relació geomètrica remarcable amb el triangle. En aquest apartat considerarem el circumcentre, l'ortocentre, l'incentre i els excentres. Més endavant n'estudiarem d'altres.





Figura 4: Circumcentre

#### Circumcentre

Les mediatrises dels costats d'un triangle  $ABC$  es tallen en un punt,  $O$ , anomenat *circumcentre* del triangle (la *mediatriu* d'un segment és la recta perpendicular pel seu punt mitjà; els seus punts són precisament els que equidisten dels extrems del segment). Així, doncs, el punt  $O$  equidista dels tres vèrtexs i és, per tant, el centre de l'única circumferència que passa per ells. Aquesta circumferència s'anomena *circumferència circumscrita* del triangle  $ABC$ . També ens hi referim dient que és la circumferència  $ABC^-$  (figura 4).


*Ortocentre i triangle òrtic*

Les altures d'un triangle es tallen en un punt,  $H$ , anomenat *ortocentre* del triangle (figura 5).



**Figura 5:** *Ortocentre i triangle òrtic*

Aquesta propietat és una senzilla conseqüència de l'exercici que segueix. El triangle  $PQR$  els vèrtexs del qual són els peus de les altures d'un triangle donat  $ABC$  s'anomena *triangle òrtic* de  $ABC$ .



**Figura 6:** *Circumcentre  $A'B'C' =$  ortocentre  $ABC$*

**E. 12.-** Proveu que les altures d'un triangle són les mediatrises del triangle els costats del qual

són les paral·leles pels vèrtexs del primer triangle als corresponents costats oposats (figura 6).

### Incentre

Les bisectrius dels angles d'un triangle es tallen en un punt,  $I$ , anomenat *incentre* del triangle (figura 7).




Figura 7: Incentre i excentre

La *bisectriu* d'un angle és la recta que el divideix en dos angles iguals; els seus punts són precisament els que equidisten dels dos costats de l'angle. Així, doncs, el punt  $I$  equidista dels tres costats i és, per tant, el centre de la *circumferència inscrita* al triangle, és a dir, la circumferència que és tangent als tres costats.

### Excentres


Les bisectrius exteriors de dos angles  $B$  i  $C$  d'un triangle es tallen en un punt  $I_a$  que equidista de les perllongacions dels dos costats ( $c$  i  $b$ ) del tercer angle  $A$  i del costat  $a$  oposat a  $A$ . Per tant, la bisectriu de  $A$  també passa per  $I_a$ , i així  $I_a$  és el centre d'una circumferència que és tangent al costat  $a$  del triangle i a les perllongacions de  $b$  i  $c$  (vegeu la figura 7). Es diu que el punt  $I_a$  és l'*excentre* del triangle relatiu al costat  $a$ . Els excentres  $I_b$  i  $I_c$  es defineixen anàlogament. Del fet que la bisectriu i la bisectriu exterior d'un angle d'un triangle siguin perpendiculars  $\perp$ , se'n dedueix sense dificultat que les bisectrius d'un triangle són les altures del triangle  $I_a I_b I_c$ .

### Circumferències i angles

La relació que hi ha entre un angle i una circumferència té propietats i aplicacions remarcables. Aquesta secció en conté una mostra.

*Angle inscrit en una circumferència*

Un angle inscrit en una circumferència (és a dir, un angle el vèrtex del qual està sobre la circumferència) és la meitat de l'angle central corresponent a l'arc comprès per aquell. És clar, doncs, que el valor de l'angle només depèn de l'arc que comprèn i no de la posició del seu vèrtex sobre la circumferència (figura 8).



**Figura 8:** Angles inscrits en una circumferència

**E. 13.-** Dos triangles rectangles amb la mateixa hipotenusa tenen la mateixa circumferència circumscrita. A més, el centre d'aquesta circumferència és el punt mitjà de la hipotenusa compartida.

**E. 14.-** Donat un triangle  $ABC$ , siguin  $P, V \in [BC]$  el peu de l'altura de  $A$  i el punt d'intersecció de la bisectriu de  $\hat{A}$  amb  $BC$ . Siguin  $D$  i  $E$  els peus de les perpendiculars a  $AB$  i  $AC$  per  $P$  i  $V$ , respectivament. Demostreu que si  $\alpha = \hat{A}/2$ , llavors  $\widehat{DPB} = \widehat{EPC} = \alpha$ .

Un angle inscrit en una circumferència és recte quan l'arc que comprèn és una semicircumferència (vegeu la figura 9.a). Aquesta propietat es pot usar per trobar les tangents a una circumferència  $C$  des d'un punt  $P$  exterior: són (figura 9.b) les rectes que uneixen  $P$  amb els punts d'intersecció de  $C$  amb la circumferència que té per diàmetre el segment  $OP$ , on  $O$  és el centre de  $C$ .

*Angle interior i angle exterior*

Un angle el vèrtex del qual és exterior a una circumferència i els dos costats del qual la tallen (s'admet també que un costat de l'angle, o els dos, siguin tangents), és la semidiferència dels dos angles centrals corresponents als dos arcs de la circumferència determinats per l'angle.




Figura 9: a) Angle recte inscrit. b) Tangents des d'un punt a una circumferència

Aquesta propietat és una conseqüència immediata del fet que un angle interior  $x$  d'un triangle és, amb les notacions de la figura 10.a, la diferència dels angles  $\alpha$  i  $\beta$ .

Anàlogament, un angle, el vèrtex del qual és interior a una circumferència, és la semisuma dels angles centrals corresponents als dos arcs determinats per l'angle (figura 10.b).




Figura 10: Angles exterior i interior a una circumferència

### Arc capaç

Donat un segment  $AB$  i un angle  $\alpha$ , el lloc geomètric dels punts  $P$  d'un dels semiplans definits per  $AB$  i tals que  $\widehat{APB} = \alpha$ , és un arc de circumferència els extrems del qual són  $A$  i  $B$  (d'aquest arc, se'n diu que és l'arc capaç de l'angle  $\alpha$  respecte del segment  $AB$ ). Vegem com es pot construir.

Suposem primer que  $\alpha \leq \frac{\pi}{2}$ . Sobre la mediatriu de  $AB$  (vegeu la figura 11), i en el semiplà en qüestió (a la figura 11 suposem que és el semiplà per sobre de  $AB$ ), considerem el punt  $O$  tal que  $\widehat{AOM} = \alpha$ , on  $M$  és el punt mitjà de  $AB$ . Llavors, els punts  $P$  de la






Figura 11: Arc capaç d'un angle respecte d'un segment

circumferència de centre  $O$  i radi  $OA$  que pertanyen a l'esmentat semiplà són precisament els que compleixen  $\widehat{APB} = \alpha$  i formen, amb les notacions de la figura 11, l'arc  $APB$ . Si ara ens fixem que l'arc  $AP'B$  és el capaç de  $\pi - \alpha$  respecte de  $AB$  en el semiplà oposat, esdevé també clar com podem construir l'arc capaç d'un angle  $\beta \in (\pi, 2\pi]$ .




Figura 12: Un vaixell determina la seva posició

**E. 15.-** A la figura 12, un vaixell situat al punt  $P$  ignora les coordenades d'aquesta posició, però mitjançant un mapa pot obtenir les dels punts  $A$ ,  $B$  i  $C$  situats a la costa i mitjançant un goniòmetre pot determinar els angles  $\alpha$  i  $\beta$ . Podeu obtenir les coordenades de  $P$ , sabent que  $A = (6, 5)$ ,  $B = (10, 28)$ ,  $C = (43, 48)$ ,  $\alpha = 1,04754$  rad i  $\beta = 0,53791$  rad?

### Criteri CAA

Dos triangles són iguals si tenen iguals, respectivament, un costat, un angle contigu a aquest costat i l'angle oposat. En particular, dos triangles rectangles són iguals si tenen iguals les hipotenuses i un angle agut. Aquestes afirmacions es poden obtenir aplicant el subapartat anterior. En particular, la construcció d'un triangle, del qual coneixem un costat, un dels seus angles contigus i l'angle oposat, es pot fer fàcilment construint l'arc capaç de l'angle oposat.

## 2 Semblances

En la geometria clàssica, les idees relacionades amb la noció de semblança de figures hi tenen un paper important. Per les necessitats d'aquest capítol, els enunciats més útils són els següents criteris de semblança de triangles:

**Criteri CAC.** Dos triangles són semblants si tenen un angle igual i els corresponents costats proporcionals.

**Criteri AA.** Dos triangles són semblants si tenen iguals dos angles corresponents.

**Criteri CCC.** Dos triangles són semblants si els corresponents costats són proporcionals.

El lector que no tingui dubtes sobre el significat d'aquests criteris, pot ometre l'apartat que segueix i continuar la lectura a l'apartat "Semblances i geometria del triangle".

### Generalitats

En aquest apartat exposem breument els conceptes i enunciats més rellevants relatius a les semblances. Primer considerem els desplaçaments. Després el teorema de Tales, que és l'eina essencial per a l'estudi de les homotècies, i tot seguit les semblances en general. Finalment, revisem les relacions que hi ha entre el producte dels nombres complexos i les semblances.

#### Desplaçaments

Un desplaçament del pla és una transformació que conserva les distàncies. Els desplaçaments conserven els angles. Un desplaçament es diu *directe* si conserva l'orientació del pla; altrament, es diu *invers*. Les translacions i els girs són exemples de desplaçaments directes. Donats dos punts  $P$  i  $P'$ , posarem  $t_{PP'}$  per denotar l'única translació que transforma  $P$  en  $P'$ . Donats un punt  $O$  i un angle  $\alpha$ , el gir de centre  $O$  i amplitud  $\alpha$  serà denotat  $g_{O,\alpha}$ .

Les simetries són exemples de desplaçaments inversos. La *simetria* respecte de la recta  $\ell$  serà denotada  $s_\ell$ : és la transformació  $P \mapsto P'$  tal que  $P'$  és el simètric de  $P$  respecte de  $\ell$ . La recta  $\ell$  s'anomena *eix* de la simetria.

Es pot veure que els punts fixos d'un desplaçament directe el classifiquen, en el sentit següent: si no té punts fixos, és una translació; si té exactament un punt fix, és un gir; si

té més d'un punt fix és la identitat. Pel que fa als desplaçaments inversos, hi ha dos casos: si té punts fixos, es tracta d'una simetria; altrament, és la composició  $ts_\ell$  d'una simetria  $s_\ell$  amb una translació  $t$  en la direcció de l'eix  $\ell$  (es parla d'una *simetria amb lliscament*).

**E. 16.-** Siguin  $s$  i  $s'$  les simetries respecte de les rectes  $\ell$  i  $\ell'$ . Per estudiar quin desplaçament és la composició  $s's$ , sigui  $\alpha$  l'angle format per  $\ell$  i  $\ell'$  i posem  $O$  per denotar el punt d'intersecció de  $\ell$  i  $\ell'$  quan  $\alpha \neq 0$ , i  $d$  per denotar la distància entre  $\ell$  i  $\ell'$  quan  $\alpha = 0$  (rectes paral·leles). Demostreu que  $s's$  és el gir de centre  $O$  i amplitud  $2\alpha$  si  $\alpha \neq 0$ , i la translació de magnitud  $2d$  segons la direcció perpendicular de  $\ell$  a  $\ell'$  si  $\alpha = 0$ . Noteu que  $s's$  es la identitat si  $\ell = \ell'$ .

**E. 17.-** Sigui  $ABC$  un triangle i construïm quadrats  $ACES$  i  $BCDT$  com a la figura 13. Demostreu que el punt  $M$  d'intersecció de l'altura  $h_C$  amb  $ED$  és el punt mitjà del segment  $ED$ .




Figura 13: L'altura de  $C$  passa pel punt mitjà de  $DE$

### Teorema de Tales

Si dues rectes són tallades per un sistema de rectes paral·leles, els segments així obtinguts sobre una de les rectes són proporcionals als corresponents segments obtinguts sobre l'altra (figura 14).

**E. 18.-** Si a la figura 14 les rectes  $L$  i  $L'$  són paral·leles i  $x/x' = y/y'$ , llavors  $L''$  també és paral·lela a  $L$ .

**E. 19 (Teorema de Menelau).**- Sigui  $ABC$  un triangle i  $X, Y$  i  $Z$  punts sobre les rectes  $BC, CA$  i  $AB$ , respectivament. Demostreu que  $X, Y$  i  $Z$  estan alineats si i només si

$$\frac{BX}{CX} \cdot \frac{CY}{AY} \cdot \frac{AZ}{BZ} = 1;$$

convenim que un quocient com ara  $BX/CX$  és positiu o negatiu segons que  $X$  sigui exterior o interior al segment  $[BC]$  (indicació: si  $X, Y$  i  $Z$  estan sobre una recta  $L$  i  $d_A, d_B$  i  $d_C$  indiquen les distàncies de  $A, B$  i  $C$  a  $L$ , respectivament, amb el convenció que aquestes

## Geometria




Figura 14: Teorema de Tales:  $\frac{x}{x'} = \frac{y}{y'} = \dots$

distàncies es compten com a positives a un costat de  $L$  i com a negatives a l'altre, llavors es compleix la relació  $BX/CX = d_B/d_C$ , i les anàlogues per  $Y$  i  $Z$ ).

### Homotècies

L'homotècia de centre  $O$  (un punt) i mòdul o raó  $k$  (un nombre real no nul) és la transformació  $A \mapsto A'$  tal que  $O' = O$  i, si  $A \neq O$ ,  $A'$  és el punt de la recta  $OA$  tal que  $OA'/OA = k$  (aquí fem el convenció que  $A'$  és de la semirecta  $OA$  si  $k > 0$  i de la semirecta oposada a  $OA$  si  $k < 0$ ). Els enunciats que segueixen es proven fàcilment emprant el teorema de Tales i l'exercici E.18.

La transformació d'una recta per una homotècia és una recta paral·lela a la primera. Val un enunciat anàleg per segments. D'aquí en resulta que angles homòlegs per una homotècia són iguals.

Les rectes pel centre d'homotècia són fixes, i són les úniques rectes fixes si  $k \neq 1$  (si  $k = 1$ , l'homotècia és la identitat).

Segments homòlegs per una homotècia són proporcionals segons el valor absolut  $|k|$  de la raó d'homotècia. D'aquí resulta que la transformació de la circumferència de centre  $P$  i radi  $r$  per l'homotècia  $h$  de raó  $k$  és la circumferència de centre  $h(P)$  i radi  $|k|r$ .

E. 20.- Dos triangles no congruents són homotètics si els costats d'un són paral·lels als corresponents costats de l'altre.

E. 21.- Dues circumferències sempre són homotètiques i els seus centres estan alineats amb el centre de qualsevol homotècia que transformi l'una en l'altra.

### Figures semblants

Dues figures són semblants si una es pot obtenir de l'altra mitjançant la composició d'una homotècia i un desplaçament. Una semblança transforma rectes en rectes i segments en segments. Segments homòlegs són proporcionals i angles homòlegs són iguals. Una semblança es diu *directa* o *inversa* segons que conservi l'orientació del pla o la inverteixi.

E. 22.- Proveu els criteris de semblança de triangles enunciats al principi d'aquesta secció.

**Raó àuria.** Donat un segment de longitud  $a > 0$ , el seu *segment auri* és el segment de longitud  $x > 0$  tal que  $a/x = x/(a-x)$ . Com que aquesta relació és equivalent a l'equació  $x^2 + ax - a^2 = 0$ , obtenim que  $x = \rho a$ , on

$$\rho = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

El nombre real  $\rho$  s'anomena la *raó àuria*. Com que  $\rho^2 + \rho - 1 = 0$ , resulta que

$$\rho^{-1} = 1 + \rho = \frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

Un *rectangle auri* és aquell pel qual la base menor és segment auri de la base major. Això equival a dir que el rectangle és semblant al que resulta de separar-ne el quadrat de costat la base menor (figura 15).




Figura 15: *Rectangle auri*

### *Semblances i nombres complexos*

Si representem els punts del pla per nombres complexos, i  $w = r_\alpha = r \cdot 1_\alpha$  és el nombre complex de mòdul  $r$  i argument  $\alpha$ , llavors la transformació  $z \mapsto wz$  és la composició del gir d'angle  $\alpha$  amb centre a l'origen seguit de l'homotècia de raó  $r$  amb el mateix centre. La raó d'això és que el mòdul i l'argument d'un producte de dos nombres complexos són el producte i la suma dels mòduls i arguments dels factors, respectivament ( $|wz| = |w||z|$  i  $\arg(wz) = \arg(w) + \arg(z)$ ).

E. 23.- Siguin  $ABC$  i  $A'B'C'$  dos triangles i interpretem  $B-A$ ,  $C-A$ ,  $B'-A'$  i  $C'-A'$  com a nombres complexos. Demostreu que  $ABC$  i  $A'B'C'$  són directament semblants si i només si  $(C'-A')/(B'-A') = (C-A)/(B-A)$ .

E. 24.- Siguin  $A_1A_2A_3$  i  $A'_1A'_2A'_3$  dos triangles directament semblants. Sigui  $t \in \mathbb{R}$  fix i definim  $A''_i = A_i + t(A'_i - A_i)$ ,  $i = 1, 2, 3$ . Demostreu que els triangles  $A_1A_2A_3$  i  $A''_1A''_2A''_3$

són directament semblants. Val la mateixa conclusió si tenim, en lloc de triangles, figures directament semblants  $A_1A_2\dots A_k$  i  $A'_1A'_2\dots A'_k$  i definim  $A''_i$  com abans per  $i = 1, 2, \dots, k$  (a la figura 16 il·lustrem el cas en què la figura és un pentàgon regular).




Figura 16:  $A''_i$  divideix  $A_iA'_i$  en la proporció 3/5

En la resta d'aquesta secció presentem, agrupades en dos apartats, un nombre de situacions geomètriques en les quals les semblances són l'element decisiu per provar els enuncisats.

## Semblances i la geometria del triangle

Vegem tot seguit algunes de les aplicacions més bàsiques de les semblances a l'estudi de les propietats del triangle.

### Mitjanes i baricentre

Les tres mitjanes es tallen en un punt,  $G$ , anomenat *baricentre* del triangle. Si  $A$  és un vèrtex qualsevol i  $A'$  el punt mitjà del costat oposat a  $A$ , llavors  $GA = 2GA'$  o, equivalentment,  $AA' = 3GA'$  (vegeu la figura 17 i noteu que els triangles  $ABG$  i  $A'B'G$  són semblants, pel criteri AAA de semblança, i que  $A'B' = \frac{1}{2}AB$ ).

### Teorema de l'altura

L'altura sobre la hipotenusa d'un triangle rectangle és la mitjana proporcional entre els dos segments en què el peu de l'esmentada altura divideix la hipotenusa. En símbols,  $CP^2 = AP \cdot BP$ , on el triangle  $ABC$  se suposa rectangle en el vèrtex  $C$  i on  $P$  és el peu de l'altura del vèrtex  $C$  (vegeu la figura 18). En efecte, els triangles  $BPC$  i  $CPA$  són semblants, ja que tenen els tres angles iguals (recordem que dos angles són iguals si els seus corresponents costats són perpendiculars). Així, doncs,  $x/h = h/(a-x)$ , igualtat que equival a la relació enuncuada.




Figura 17: Baricentre d'un triangle




Figura 18: Teoremes de l'altura i del catet


**Teorema del catet**

Amb les mateixes notacions de la figura 18, els triangles  $BPC$  i  $BCA$  són semblants, ja que són rectangles i tenen un angle comú. Per tant,  $x/a = a/c$ , la qual cosa ens diu que en un triangle rectangle la longitud d'un catet, per exemple  $a$ , és la mitjana proporcional entre la hipotenusa,  $c$ , i la projecció del catet,  $x$ , sobre aquella. Per a una altra demostració, i també una interpretació, vegeu l'exercici E.6.

Així, tenint en compte el subapartat anterior, tenim que els triangles rectangles  $ABC$ ,  $ACP$  i  $CBP$  són semblants. És clar, a més a més, que l'àrea de  $ABC$  és la suma de les àrees de  $ACP$  i  $CBP$ . Això ens proporciona una nova comprensió del teorema de Pitàgores: si el quocient de l'àrea del quadrat de costat  $AB$  per la del triangle  $ABC$  és  $k$ , és a dir, si  $c^2 = k \cdot ABC$ , llavors  $a^2 = k \cdot CBP$  i  $b^2 = k \cdot ACP$ , d'on  $a^2 + b^2 = k(CBP + ACP) = k \cdot ABC = c^2$ . Notem que aquest argument prova que si apliquem una mateixa construcció sobre la hipotenusa i els catets d'un triangle rectangle (suposant que la construcció proporcioni una àrea a partir d'un segment), llavors l'àrea de la figura sobre la hipotenusa és la suma de les àrees de les figures sobre els catets.

Per exemple, si la construcció és la del polígon regular de  $n \geq 3$  costats sobre un segment donat, obtenim que l'àrea del  $n$ -gon regular de costat la hipotenusa d'un triangle rectangle és

## Geometria




**Figura 19:** Teorema de Pitàgores per semicercles

la suma de les àrees dels  $n$ -gons regulars els costats dels quals són els catets. Anàlogament, tenim que l'àrea del semicercle que té per diàmetre la hipotenusa és la suma de les àrees dels semicercles que tenen per diàmetre els catets (figura 19).

### Potència d'un punt respecte d'una circumferència

Sigui  $P$  un punt i  $C$  una circumferència que no passa per  $P$ . Considerem dues rectes per  $P$  que tallen  $C$  en els punts  $A$  i  $A'$ ,  $B$  i  $B'$ , respectivament (figura 20). Aleshores els triangles  $PAB'$  i  $PBA'$  són semblants, ja que tenen dos angles iguals, i per tant  $PA/PB = PB'/PA'$ , o bé  $PA \cdot PA' = PB \cdot PB'$ . Així doncs, el producte  $PA \cdot PA'$  és independent de la recta que prenguem per  $P$  (entre les que tallen  $C$ ) i el seu valor s'anomena *potència de  $P$  respecte de  $C$* . Prenent la recta que passa per  $P$  i pel centre de  $C$ , veiem que la potència és igual a  $(d - r)(d + r) = d^2 - r^2$ , on  $d$  és la distància de  $P$  al centre de  $C$  i  $r$  el radi de  $C$ .



**Figura 20:** Potència d'un punt respecte d'una circumferència



**Punts concíclics.** Ara no hi ha dificultat a deduir que si  $A$  i  $A'$ ,  $B$  i  $B'$ , són dues parelles de punts distints i les rectes  $AA'$  i  $BB'$  es tallen en un punt  $P$ , aleshores els punts  $A$ ,  $A'$ ,  $B$  i  $B'$  són *concíclics* (això és, estan continguts en una mateixa circumferència) si i només si  $PA \cdot PA' = PB \cdot PB'$ .


**Eix radical.** El lloc geomètric dels punts que tenen la mateixa potència respecte de dues circumferències no concèntriques és una recta perpendicular a la que uneix els seus centres  $O_1$  i  $O_2$ , i s'anomena *eix radical* de les dues circumferències. En efecte, siguin  $d_1$  i  $d_2$  les distàncies d'un punt  $P$  als centres de les dues circumferències, i siguin  $r_1$  i  $r_2$  els seus radis. La condició que la potència de  $P$  sigui la mateixa respecte de les dues circumferències és  $d_1^2 - r_1^2 = d_2^2 - r_2^2$ , o bé  $d_1^2 - d_2^2 = r_1^2 - r_2^2$ . Com que  $\delta = r_1^2 - r_2^2$  és constant, el lloc geomètric és el dels punts  $P$  tals que  $d_1^2 - d_2^2 = \delta$ , que sabem que és la recta perpendicular a  $O_1O_2$  pel punt que està a la distància  $\delta/(2c)$  del punt mitjà del segment  $[O_1, O_2]$ , on  $c$  és la distància entre  $O_1$  i  $O_2$  (vegeu l'exercici E.11). És a dir, la posició del punt d'intersecció de l'eix radical amb la recta  $O_1O_2$  és  $m + (r_1^2 - r_2^2)/(2c)$ .

Si les dues circumferències es tallen, l'eix radical és la recta que uneix els dos punts d'intersecció (o la tangent comuna si són tangents). En efecte, els punts d'intersecció tenen la mateixa potència ( $= 0$ ) respecte de les dues circumferències.

**Centre radical.** El *centre radical* de tres circumferències que no tenen els centres alineats és l'únic punt que té la mateixa potència respecte de les tres circumferències. Aquest punt és la intersecció de dos qualssevol dels eixos radicals de les tres parelles de circumferències que podem formar.

*Propietats mètriques de les bisectrius*

Considerem el triangle  $ABC$  de la figura 21.



**Figura 21:** *Determinació de les bisectrius*

Sigui  $M$  el punt sobre  $BC$ , a continuació de  $C$ , tal que  $CM = b$ . Per construcció, el triangle  $ACM$  és isòceles. Per tant, la bisectriu  $v'$  de  $\widehat{ACM}$  és perpendicular a la base  $AM$ . Com que la bisectriu  $v$  és perpendicular a  $v'$ ,  $v$  és paral·lela a  $AM$ . Aplicant el teorema de

## Geometria

Tales, obtenim que

$$\frac{BV}{a} = \frac{VA}{b} = \frac{c}{a+b}.$$

Considerant el punt  $N$  del segment  $BC$  tal que  $NC = b$ , resulta que  $AN$  és paral·lela a  $v'$ , i raonant de manera similar, obtenim que

$$\frac{BV'}{a} = \frac{AV'}{b} = \frac{c}{a-b}.$$

Per altra banda, no és difícil veure que si  $D$  és el punt d'intersecció de la semirecta  $CV$  amb el cercle  $ABC$ , llavors els triangles  $AVC$  i  $DBC$  són semblants (tenen dos angles iguals: un per definició de bisectriu, l'altre pel fet de ser angles inscrits que comprenen el mateix arc  $BC$  de la circumferència  $ABC$ ). En resulta que  $a/v = (v + VD)/b$ , o bé  $ab = v^2 + v \cdot VD$ . Però com que  $v \cdot VD = VA \cdot VB = abc^2/(a+b)^2$ , tenim que


$$v^2 = ab - \frac{abc^2}{(a+b)^2} = ab \frac{(a+b)^2 - c^2}{(a+b)^2} = 4ab \frac{p(p-c)}{(a+b)^2}$$

on hem posat  $p = (a+b+c)/2$  (el *semiperímetre* del triangle).

**E. 25 (Steiner-Lehmus).**- Si en un triangle dues bisectrius són iguals, llavors el triangle és isòsceles.

### *Radi de les circumferències inscrita i exinscrita*

Considerem la figura 22. Si posem  $p = (a+b+c)/2$ , aleshores es compleix que  $AB' = AC' = p-a$ : la primera igualtat és clara i la segona resulta del fet que  $AB'+a = AB'+CA'+A'B = AB'+CA'+BC' = p$ . De la mateixa manera tenim que  $BA' = BC' = p-b$  i  $CA' = CB' = p-c$ . També tenim  $AB'' = AC''$  i com que  $AB'' = AC + CA''$  i  $AC'' = AB + BA''$ , veiem que  $AB'' = AC'' = p$  [o]. Per tant  $BA'' = BC'' = p-c$  i  $CB'' = CA'' = p-b$ . Finalment,  $C'C'' = B'B'' = AB'' - AB' = p - (p-a) = a$  i  $A'A'' = |BA' - BA''| = |p-b - (p-c)| = |b-c|$ .



**Figura 22:** Radi de les circumferències inscrita i exinscrita

Atès que els triangles  $AIC'$  i  $AI_aC''$  són semblants, serà  $r/r_a = (p-a)/p$ . I atès que els triangles  $BIC'$  i  $I_aBC''$  també són semblants,  $r/(p-b) = (p-c)/r_a$ , o bé  $rr_a = (p-b)(p-c)$ . De les dues equacions obtingudes es dedueix que

$$r = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}, \quad r_a = \sqrt{\frac{p(p-b)(p-c)}{p-a}}$$

Els radis  $r_b$  i  $r_c$  de les altres dues circumferències exinscrites s'obtenen permutant cíclicament  $a, b$  i  $c$  en la segona de les fórmules anteriors.

### Expressió de les altures en funció dels costats

Considerem la figura 23, en la qual  $N$  i  $M$  es defineixen de manera que estiguin alineats amb  $A$  i  $B$ , respectivament, amb  $BM = BC$  i  $AN = AC$ . Així doncs,  $NM = a + b + c = 2p$ . Per les consideracions fetes al subapartat "Propietats mètriques de les bisectrius" (pàg. 181), sabem que  $CM$  (respectivament,  $CN$ ) és paral·lela a la bisectriu interior  $IB$  (respectivament,  $IA$ ), de manera que els triangles  $AIB$  i  $NCM$  són semblants. En resulta que  $h_c/r = 2p/c$ , d'on

$$h_c = 2pr/c = \frac{2}{c} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Canviant  $c$  per  $b$  i per  $a$  s'obtenen les fórmules que donen  $h_b$  i  $h_a$ .

D'aquestes expressions és clar que l'àrea  $S$  del triangle és donada per la fórmula d'Heron:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$




Figura 23: Altures en funció dels costats

### Radi de la circumferència circumsrita

Considerem la figura 24. Els triangles  $APC$  i  $AC'O$  són semblants: els dos són rectangles i  $\widehat{AOC'}$  és la meitat de l'arc central comprès per l'angle inscrit  $\widehat{ACB}$ . Així, doncs,  $AO/AC' = AC/AP$ , o bé  $\rho/(c/2) = b/h_a$ . Per tant,  $\rho = bc/2h_a$  i, introduint l'expressió de  $h_a$  en funció dels costats,

$$\rho = \frac{abc}{4\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}$$

Notem també que si  $\gamma = \widehat{C}$  i  $c = AB$ , llavors  $c/\sin(\gamma) = 2AC'/\sin(\gamma) = 2\rho$ , ja que  $AC'/\rho = \sin(\gamma)$ . Això ens revela que el valor  $a/\sin(\alpha) = b/\sin(\beta) = c/\sin(\gamma)$  (teorema dels sinus) és  $2\rho$ , el diàmetre de la circumferència circumsrita.

## Geometria




Figura 24: Radi de la circumferència circumscrita

### Inversions

Donat un punt  $O$  i un nombre real  $\rho \neq 0$ , la *inversió de centre  $O$  i potència  $\rho$* ,  $inv_{O,\rho}$ , és l'aplicació  $A \mapsto A'$  ( $A \neq O$ ), definida per la fórmula

$$A' - O = \frac{\rho}{|OA|^2}(A - O).$$

Així  $A'$  és el punt que està sobre la recta  $OA$ , a una distància  $|\rho|/|OA|$  de  $O$ , a la mateixa semirecta que  $A$  si  $\rho > 0$  i a la semirecta oposada si  $\rho < 0$ . Atès que  $|OA'| = |\rho|/|OA|$ , tenim  $A'' = A$  (ho expressarem dient que la  $inv_{O,\rho}$  és *involutiva*).

Si  $\rho > 0$  i posem  $r = \sqrt{\rho}$ , llavors els punts  $A$  que  $inv_{O,\rho}$  deixa fixos són els de la circumferència de centre  $O$  i radi  $r$ , ja que si  $|OA| = r$  llavors  $\rho/|OA|^2 = 1$ . En aquest cas es diu també que  $inv_{O,\rho}$  és la inversió respecte de la circumferència  $S = S(O, r)$  de centre  $O$  i radi  $r$ , i que  $A'$  és l'*invers* de  $A$  respecte de  $S$ . Pel que ja hem dit, també es té que  $A$  és l'*invers* de  $A'$  respecte de  $S$ .

**Construcció.** El punt  $A'$  invers de  $A$  respecte de  $S$  es pot construir de la següent manera. Suposem primer que  $|OA| > r$ . Si  $P$  i  $Q$  són els punts d'intersecció de la circumferència de centre  $A$  i radi  $|OA|$  amb  $S$ , llavors els punts d'intersecció de les circumferències de radi  $r$  amb centres a  $P$  i  $Q$  són  $O$  i  $A'$  (figura 25).

En efecte, els triangles  $AOP$  i  $OPA'$  són semblants, ja que per construcció són isòscels i comparteixen l'angle del vèrtex  $O$ . Per tant,  $|OA|/|OP| = |OP|/|OA'|$ , que equival a  $|OA| \cdot |OA'| = r^2$ , on  $r = |OP|$ . Per construir l'*invers* d'un punt interior de  $S$  respecte de  $S$ , és suficient veure com podem reconstruir el punt exterior  $A$  a partir de  $A'$ . Ara bé, amb les notacions anteriors,  $PQ$  és la mediatriu de  $OA'$  i  $A$  és la intersecció de les tangents a  $S$  en els punts  $P$  i  $Q$ .

**Inversió de rectes i circumferències.** Una figura  $F'$  es diu *inversa* d'una figura  $F$  respecte de la circumferència  $S$  si quan  $A$  recorre els punts de  $F$  (diferents del centre  $O$  de  $S$ ), el punt




Figura 25: Construcció de l'invers de A

$A'$  invers de  $A$  respecte de  $S$  recorre els punts de  $F'$  (diferents de  $O$ ). Si  $F' = F$ , direm que la figura  $F$  és *doble* per la inversió. Per exemple, els punts dobles són els fixos per la inversió, és a dir, els punts de  $S$ ; per tant,  $S$  és una circumferència doble; de la definició d'inversió, en resulta immediatament que les rectes per  $O$  són dobles.





Figura 26: Inversa d'una circumferència pel centre d'inversió

Una circumferència  $C$  de diàmetre  $d$  pel centre d'inversió  $O$  (figura 26.a) i la recta perpendicular  $P'A'$  al diàmetre  $OP$  de  $C$  a una distància  $d' = r^2/d$  de  $O$ , són figures inverses (notem que  $OP$  és l'únic diàmetre de  $C$  que passa per  $O$ ). En efecte, els triangles  $OPA$  i  $OA'P$  són semblants, ja que són rectangles (a  $A$  i  $P'$ , respectivament) i tenen un angle comú. Tenint en compte que  $|OP| = d$  i  $|OP'| = r^2/d$ , tenim que  $|OA|/d = r^2/d|OA'|$ , d'on  $|OA| \cdot |OA'| = r^2$ . Remarquem que si  $A, B \in S$  (figura 26.b), llavors la recta  $AB$  i la circumferència  $OAB$  són figures inverses respecte de  $S$ , ja que la inversa de la recta  $AB$  és una circumferència que passa per  $O$  i pels punts dobles  $A$  i  $B$ .

Anem a veure ara que la inversa  $C'$  d'una circumferència  $C$  que no passa pel centre

## Geometria

d'inversió  $O$  és una circumferència. De fet, veurem que si  $P$  i  $Q$  són els extrems del diàmetre de  $C$  que passa per  $O$ , llavors  $C'$  és la circumferència de diàmetre  $P'Q'$  (figura 27), on  $P'$  i  $Q'$  són els inversos de  $P$  i  $Q$  respecte de  $S$ .



**Figura 27:** Inversa d'una circumferència  $C$  que no passa per  $O$

En efecte, sigui  $C'$  la circumferència que acabem de definir. De  $|OP| \cdot |OP'| = |OQ| \cdot |OQ'|$  obtenim  $|OP'|/|OQ| = |OQ'|/|OP|$ , valor que coincideix amb el mòdul  $k$  de l'homotècia de centre  $O$  que transforma  $C$  en  $C'$ . Sigui ara  $A$  un punt de  $C$  i determinem  $B$  i  $A'$  sobre  $C'$  com a la figura 27. Llavors  $|OB| = k|OA|$  i  $|OA'| \cdot |OB| = |OQ'| \cdot |OP'|$  (potència de  $O$  respecte de  $C'$ ). Per tant,

$$|OA| \cdot |OA'| = \frac{1}{k}|OB| \cdot |OA'| = \frac{1}{k}|OQ'| \cdot |OP'| = |OP| \cdot |OP'| = r^2,$$

i això acaba la prova.

Notem que la raó,  $k$ , de l'homotècia de centre  $O$  que transforma  $C$  en  $C'$  és igual a  $r^2/p$ , on  $p$  és la potència de  $O$  respecte de  $C$ :

$$k = \frac{|OP'|}{|OQ|} = \frac{|OP| \cdot |OP'|}{|OP| \cdot |OQ|} = \frac{r^2}{p}.$$

**E. 26.-** La recta  $PQ$  que uneix dos punts  $P$  i  $Q$  d'una circumferència  $C$  que no passa pel centre  $O$  d'una circumferència  $S$  i la recta  $P'Q'$  que uneix els inversos  $P'$  i  $Q'$  de  $P$  i  $Q$  respecte de  $S$ , o bé es tallen sobre l'eix radical de  $C$  i  $C'$ , o bé aquest eix és paral·lel a ambdues rectes (indicació: mostreu que els punts  $P, Q, P'$  i  $Q'$  estan sobre una circumferència  $K$ , amb la qual cosa el punt d'intersecció de  $PQ$  i  $P'Q'$  -si es tallen- és el centre radical de  $C, C'$  i  $K$ ).

**E. 27.-** Amb les notacions del problema anterior, mostreu que la recta tangent a  $C$  en un punt  $P$  i la recta tangent a  $C'$  en el punt  $P'$  formen angles iguals amb la recta  $PP'$ . A més a més, o bé es tallen sobre l'eix radical de  $C$  i  $C'$ , o bé aquest és paral·lel a ambdues.

**E. 28.-** Amb les notacions de la figura 26.a, mostreu que  $\widehat{OA'P'}$  és igual a l'angle agut que  $OA$  forma amb la tangent a  $C$  pel punt  $A$  (indicació: aquest darrer angle coincideix amb l'angle agut que forma la tangent a  $C$  en el punt  $O$  amb  $OA$ ).

**Conservació dels angles.** Els exercicis anteriors es poden usar per demostrar que les inversions conserven els angles. Per precisar més, un arc serà un segment (que pot ser una semirecta) o un arc de circumferència. Si dos arcs tenen el mateix origen, convindrem a mesurar l'angle que formen com el de les semirectes tangents als arcs en el vèrtex de l'angle. Com que les inversions transformen arcs en arcs, també transformen angles en angles i la propietat a què ens hem referit és que la mesura d'un angle coincideix amb la del seu transformat per una inversió. La demostració d'aquest fet es pot deixar com a exercici per al lector. Convé adonar-se, però, que el sentit del transformat d'un angle per una inversió és el contrari del de l'angle abans de transformar.

### 3 Problemes

Resoldre un problema, especialment un problema de geometria, és trobar un camí entre el que ens donen i el que ens demanen. Del que ens donen podem intentar *progressar* fent deduccions successives aplicant coneixements ja coneguts: és el procés de *síntesi* en el sentit dels antics grecs, i que en alguns diccionaris apareix reflectit com una de les accepcions del mot. Fixem-nos que els coneixements pertinents per avançar sovint esdevenen clars quan parem esment en les coses que ens donen.

A l'altra banda, allà on volem arribar, sovint és útil preguntar-se quina *mena de cosa* ens demanen, ja que les respostes a aquesta pregunta solen donar *claus* inequívokes sobre quins coneixements convé invocar per aconseguir-ho: és el procés d'*anàlisi* dels antics grecs.

Aquests principis, i d'altres, els podeu trobar il·lustrats a la mostra de solucions, presentades en forma dialogada, a la secció 4.

Una advertiment: l'ordre en el qual donem els problemes no pressuposa cap graduació progressiva de la seva dificultat.

**GE1.-** Amb les notacions de la figura 28, calculeu l'àrea del quadrat interior en funció de  $t$ .

**GE2.-** Donada una corda  $a$  d'una circumferència  $C$  de radi 1 i centre  $O$ , considereu la circumferència  $C'$  determinada imposant que  $a$  en sigui un diàmetre. Si  $P$  és el punt de  $C'$  més allunyat de  $O$ , quin és el valor màxim de la distància  $PO$ ?

**GE3.-** L'angle  $\hat{A}$  d'un triangle isòsceles  $ABC$  és igual a  $2/5$  d'un angle recte i  $\hat{B} = \hat{C}$ . La bisectriu de l'angle  $\hat{C}$  talla el costat oposat en el punt  $D$ . Calculeu les valors dels angles del triangle  $BCD$ . Expresseu la longitud,  $a$ , del costat  $BC$  en funció de la longitud,  $b$ , del costat  $AC$ .

**GE4.-** Sigui  $ABC$  un triangle isòsceles amb  $\hat{B} = \hat{C} = 80^\circ$ . Siguin  $D \in (A, B)$  i  $E \in (A, C)$  els punts tals que  $\widehat{BCD} = 50^\circ$  i  $\widehat{CBE} = 60^\circ$ . Quants graus té l'angle  $\widehat{BED}$ ?

**GE5 (Construcció de Descartes de segments auris).**- A la figura 29, la circumferència és tangent a  $AB$  al punt  $B$  i el seu diàmetre és igual a  $AB$ . Demostreu que  $AB$  és el segment auri de  $AD$  i que  $AC$  és el segment auri de  $AB$ .

## Geometria




Figura 28: Es demana l'àrea del quadrat gris en funció de  $t$




Figura 29: Una construcció geomètrica de segments auri

GE6.- Proveu que en un pentàgon regular el costat és segment auri de la diagonal.

GE7.- Donat un punt  $P$  interior a un triangle  $ABC$ , siguin  $X, Y$  i  $Z$  els peus de les perpendiculars des de  $P$  als costats  $BC, CA$  i  $AB$ , respectivament (es diu que  $XYZ$  és el triangle pedal del punt  $P$  relatiu al triangle  $ABC$ ). Proveu que

$$YZ = \frac{a}{2\rho} PA, \quad ZX = \frac{b}{2\rho} PB, \quad XY = \frac{c}{2\rho} PC,$$

on  $\rho$  és el radi de la circumferència circumscrita al triangle.

GE8.- En un triangle acutangle  $ABC$ , la bisectriu interior de l'angle  $\hat{A}$  talla el costat  $BC$  en el punt  $K$  i el cercle circumscrit en el punt  $M$ . Siguin  $L$  i  $N$  els peus de les perpendiculars per  $K$  a  $AB$  i  $AC$ , respectivament. Demostreu que el quadrilàter  $ALMN$  i el triangle  $ABC$  tenen la mateixa àrea.



GE9.- En cada un dels vèrtexs d'un quadrat, el costat del qual fa un quilòmetre, hi ha una casa, i les quatre cases volen fer camins amb els que es puguin comunicar les unes amb les altres. Què poden fer, si només disposen de materials per construir  $1 + \sqrt{3}$  km de camí?

GE10.- Proveu que els tres angles d'un triangle  $ABC$  són aguts si i només si existeixen punts  $A'$ ,  $B'$  i  $C'$  de l'interior dels costats  $BC$ ,  $AC$  i  $AB$ , respectivament, tals que els segments  $AA'$ ,  $BB'$  i  $CC'$  tenen la mateixa longitud.

GE11.- Demostreu que qualsevol polígon convex d'àrea 1 està contingut en un rectangle d'àrea no superior a 2.

GE12 (Teorema de Morley).- Donat un triangle  $ABC$ , construïm el triangle  $PQR$  tal com indica la figura 30. Demostreu que

$$|QR| = 8\rho \sin(\alpha) \sin(\beta) \sin(\gamma),$$

on  $\rho$  és el radi de la circumferència circumscrita a  $ABC$ . Notem que la simetria de la relació obtinguda mostra que el triangle  $PQR$  és equilàter, fet que és conegut com a *teorema de Morley*.




Figura 30: Teorema de Morley:  $PQR$  és equilàter

GE13.- Sigui  $ABC$  un triangle i  $P$  un punt tal que  $PA = 7$ ,  $PB = 5$  i  $PC = 3$ . Demostreu que si  $ABC$  té, amb aquestes condicions, perímetre màxim, llavors  $P$  és l'incentre de  $ABC$ .

GE14.- Siguin  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  i  $S$  els centres dels quadrats construïts externament sobre els quatre costats d'un rombe. Demostreu que  $PQRS$  és un quadrat. Si fixem el centre, el costat i l'orientació del rombe, i deixem que l'angle entre dos costats contigus variï, quin lloc geomètric descriu el punt  $P$ ?

GE15.- Proveu que un quadrilàter convex és circumscriptible a una circumferència si i només si les sumes dels dos parells de costats oposats són iguals.

## Geometria

**GE16.-** Demostreu que la suma de les distàncies d'un punt interior a un triangle als tres vèrtexs és superior a la meitat del perímetre i inferior al perímetre.


**GE17.-** Sigui  $2p$  el perímetre d'un triangle i  $\mu$  la suma de les seves tres mitjanes. Demostreu que

$$\frac{3p}{2} < \mu < 2p.$$

**GE18.-** Demostreu que un quadrilàter convex és inscripcible en una circumferència (és a dir, que existeix una circumferència que passa pels seus vèrtexs) si i només si té dos angles oposats suplementaris.

**GE19.-** Proveu que les altures d'un triangle són les bisectrius del seu triangle òrtic (vegeu la figura 5). Resulta, així, que l'ortocentre d'un triangle coincideix amb l'incentre del seu triangle òrtic.

**GE20 (Cercle d'Euler).**- Demostreu que els punts mitjans dels costats d'un triangle (figura 31) i els peus de les seves altures estan sobre un cercle.



**Figura 31:** Cercle d'Euler, o dels nou punts

**GE21.-** El cercle d'Euler d'un triangle també passa pels punts mitjans dels segments que uneixen els vèrtexs d'un triangle amb l'ortocentre (per aquesta raó el cercle d'Euler s'anomena també *cercle dels nou punts* del triangle; figura 31).

**GE22.-** Sigui  $P$  un punt,  $ABC$  un triangle i  $X, Y, Z$  els peus de les perpendiculars per  $P$  als costats  $BC, CA$  i  $AB$ , respectivament. Demostreu que  $X, Y$  i  $Z$  estan alineats si i només si  $P$  està sobre la circumferència circumscrita de  $ABC$  (en aquest cas, la recta que conté els punts  $X, Y$  i  $Z$  s'anomena *recta de Simson* de  $P$  relativa al triangle  $ABC$ ; vegeu la figura 32).




Figura 32: Recta de Simson

**GE23** (Problema de Fagnano).- Demostreu que el mínim perímetre d'un triangle inscrit en un triangle acutangle donat és el del triangle òrtic (vegeu la figura 5).

**GE24.-** Trobeu el punt interior d'un triangle acutangle tal que la suma de les seves distàncies als vèrtexs sigui mínima (*punt de Fermat* del triangle).

**GE25.-** Demostreu que les circumferències circumscrites dels triangles equilàters construïts sobre els tres costats d'un triangle, al seu exterior, passen pel punt de Fermat. A més a més, els centres d'aquests tres triangles formen un altre triangle equilàter.

**GE26** (Teorema de Ptolemeu).- En un quadrilàter convex la suma dels productes de les dues parelles de costats oposats és no inferior al producte de les dues diagonals, i la igualtat val si i només si el quadrilàter és inscriuible.

**GE27.-** Sigui  $ABC$  un triangle isòsceles amb  $BC$  com a costat desigual. Sigui  $Q$  el peu de l'altura pel vèrtex  $B$  i  $P$  el peu de la perpendicular a  $BC$  per  $Q$ . Trobeu l'àrea del triangle en funció de  $x = BP$  i  $y = PC$ .

**GE28.-** En un triangle  $ABC$  escollim punts  $X, Y$  i  $Z$  sobre els costats  $BC, CA$  i  $AB$ , respectivament. Considerem les rectes per  $X, Y$  i  $Z$  que són perpendiculars a  $BC, CA$  i  $AB$ , respectivament. Proveu que les tres rectes són concurrents si i només si  $AZ^2 + BX^2 + CY^2 = AY^2 + CX^2 + BZ^2$ .

**GE29.-** Sigui  $O$  el centre d'una circumferència  $K$ ,  $AB$  un diàmetre,  $t$  la recta tangent a  $K$  en el punt  $B$ . Donat un punt  $P$  de  $K$  diferent de  $A$  i  $B$ , siguin  $C$  i  $D$  els punts d'intersecció amb  $t$  de la tangent a  $K$  pel punt  $P$  i de la recta  $AP$ . Proveu que  $BC = CD$ .


## Geometria

**GE30.-** Trobeu l'àrea d'un octògon convex inscrit en una circumferència sabent que té quatre costats consecutius de longitud 2 i els altres quatre de longitud 3.

**GE31.-** Siguin  $P$  i  $O$  punts fixos. Trobeu el lloc geomètric del simètric de  $P$  respecte d'una recta variable per  $O$ .

**GE32.-** Sigui  $H$  l'ortocentre d'un triangle,  $P$  el peu d'una altura i  $Q$  el punt d'intersecció de la semirecta  $HP$  amb el cercle circumscrit. Demostreu que  $HP = PQ$ .

**GE33.-** Proveu que el baricentre d'un triangle  $ABC$  és el punt  $G$  del segment  $HO$  tal que  $GO = \frac{1}{2}GH$  i que el punt mitjà de  $HO$  és el centre de la circumferència circumscrita en el triangle  $A'B'C'$  els vèrtexs del qual són els punts mitjans dels costats de  $ABC$  (la recta  $HO$  s'anomena *recta d'Euler* del triangle  $ABC$ ; vegeu la figura 33).



**Figura 33:** *Recta d'Euler*

**GE34.-** Si la recta d'Euler d'un triangle passa per un dels vèrtexs, el triangle és rectangle o isòceles.

**GE35.-** Amb les notacions de la figura 31, sigui  $P'$  el punt de l'arc  $A'P$  del cercle d'Euler tal que  $\text{arc}(A'P') = \frac{1}{3}\text{arc}(A'P)$ . Definim  $Q'$  i  $R'$  de manera similar. Demostreu que llavors el triangle  $P'Q'R'$  és equilàter (figura 44).

**GE36.-** Siguin  $A$  i  $B$  dos punts no diametralment oposats d'un cercle  $C$  donat i sigui  $XY$  un diàmetre variable de  $C$ . Determineu el lloc geomètric del punt d'intersecció de les rectes  $AX$  i  $BY$ .




Figura 34: Una aplicació de les inversions

**GE37** (Erdős–Mordell).- Sigui  $E$  un punt a l'interior d'un triangle  $ABC$ ,  $s$  la suma de les distàncies de  $E$  als vèrtexs i  $t$  la suma de les distàncies de  $E$  als peus de les rectes  $E$  perpendiculars als costats. Demostreu que  $s \geq 2t$ .

**GE38**.- Sigui  $E$  un punt interior d'un triangle  $ABC$ . Siguin  $x, y$  i  $z$  les distàncies de  $E$  als vèrtexs  $A, B$  i  $C$ , respectivament, i  $p, q$  i  $r$  les distàncies de  $E$  als costats  $BC, CA$  i  $AB$ , respectivament. Llavors,

$$xyz \geq (p+q)(p+r)(q+r).$$

**GE39**.- Siguin  $S$  i  $K$  circumferències diferents. Demostreu que  $K$  és doble per la inversió respecte de  $S$  si i només si  $K$  i  $S$  són ortogonals.

**GE40**.- A la figura 34, l'arc  $AB$  és un quadrant de la circumferència de centre  $O$  i radi  $|OA| = 1$ , i  $AC$  és l'arc que correspon a la circumferència de radi 2 amb centre en el punt simètric de  $A$  respecte del punt  $O$ . Comproveu que  $K$  i  $K'$  són circumferències inverses respecte de la circumferència  $S$  de centre  $A$  i radi 1. Si  $P'$  és l'invers de  $A$  respecte de  $K'$ , proveu que  $P'$  i el centre  $P$  de  $K$  són inversos respecte de  $S$ . Trobeu també la posició del centre  $Q$  de  $K'$  (i noteu que  $Q$  i  $P'$  són diferents).

**GE41**.- Siguin  $P$  i  $A$  dos punts diferents donats i  $O$  un punt variable en una semirecta  $\sigma$  d'origen  $A$  donada. Sigui  $S$  la circumferència de centre  $O$  i radi  $|OA|$  i  $P'$  l'invers de  $P$  respecte de  $S$ . Sigui  $L$  la recta perpendicular a  $\sigma$  pel punt  $A$ . Demostreu que el límit de




Figura 35: Càlcul del diàmetre de les circumferències entre  $L$ ,  $C$  i  $C'$

$P'$  quan  $O$  s'allunya indefinidament de  $A$  és el punt simètric de  $P$  respecte de la recta  $L$  (si mirem  $L$  com el límit de  $S$  quan  $O$  s'allunya indefinidament de  $A$ , veiem que podem considerar la simetria respecte de  $L$  com el límit de la inversió respecte de  $S$ ).


**GE42.-** Sigui  $S$  una circumferència de centre  $O$ , i  $P$  i  $P'$  dos punts no pertanyents a  $S$  i diferents de  $O$ . Demostreu que les condicions següents són equivalents:

- 1)  $P$  i  $P'$  són inversos respecte de  $S$ .
- 2)  $P$  i  $P'$  estan alineats amb  $O$  i existeix una circumferència  $K$  ortogonal a  $S$  que passa per  $P$  i  $P'$ .
- 3) Existeixen dues circumferències distintes  $K$  i  $K'$  que passen per  $P$  i  $P'$  i són ortogonals a  $S$ .

**GE43.-** Sigui  $S$  una circumferència de centre  $O$ ,  $L$  una recta que no passa per  $O$  i  $C = L'$  la circumferència inversa de  $L$  respecte de  $S$ . Demostreu que si  $P$  i  $Q$  són punts simètrics respecte de  $L$ , llavors els inversos  $P'$  i  $Q'$  de  $P$  i  $Q$  respecte de  $S$  són inversos respecte de  $C$  (és a dir, la simetria respecte de  $L$  i la inversió respecte de  $C$  es corresponen per la inversió respecte de  $S$ ).

**GE44.-** Considerem la figura 35, en la qual  $C$  i  $C'$  són dues circumferències tangents del mateix radi  $R$ . La recta  $L$  és una tangent comuna a  $C$  i  $C'$  i les circumferències  $C'_n$  ( $n \geq 1$ ) es determinen de manera que estiguin contingudes a la regió entre  $L$ ,  $C$  i  $C'$  i que  $C'_n$  sigui tangent a  $C'_{n-1}$ ,  $C$  i  $C'$  (convenim que  $C'_0 = L$ ). Comproveu que  $C'_n$  és la inversa de  $C_n$  respecte de la circumferència puntejada i useu aquest fet per demostrar que el diàmetre de  $C'_n$  és igual a  $R/n(n+1)$  (la circumferència puntejada és la que passa pels punts de contacte de  $L$  amb  $C$  i  $C'$  i que té per centre el punt de contacte de  $C$  i  $C'$ ).

**GE45.-** A la figura 36, la circumferència  $C'$  és interior, i tangent en el punt  $B$ , a la circumferència  $C$  i les circumferències  $C_0, C_1, \dots$  es construeixen tal com indica la figura. Proveu

Figura 36: Quin diàmetre té  $C_n$ ?

que el diàmetre de  $C_n$  ( $n \geq 1$ ) és igual a  $y_n/n$ , on  $y_n$  és la distància del centre de  $C_n$  a la recta  $AB$  (indicació: trobeu les inverses de  $C_0, C_1, \dots, C_{n-1}, C_n$  respecte de la circumferència de centre  $B$  que és orthogonal a  $C_n$ ).

#### 4 La Raquel i en Pau resolen problemes


En aquesta secció donem les solucions, en forma dialogada, de cinc problemes de la llista (GE6, GE16, GE17, GE23 i GE35). Ens hem decidit a emprar aquest mitjà perquè ens ha semblat adient per intentar explicar, a més a més de la solució, algunes idees i processos que ens semblen rellevants per a la resolució de problemes de geometria. Les solucions convencionals dels mateixos problemes, que són les que, en definitiva, s'exigeixen, les podeu trobar a la secció 5.

Als diàlegs, en Pau i la Raquel són estudiants dedicats a la tasca d'aprendre a resoldre problemes de geometria. A l'aula de ciència-ficció on treballen, l'Ariadna, una terminal de darreríssima generació, segueix atentament els seus passos. Ocasionalment, quan ho creu oportú, fa que l'Euclides, un dels seus mòduls més avançats, ajudi els estudiants a retrobar el fil de les seves disquisicions. Per a aprofitar de manera òptima les cavil·lacions de l'Euclides, convé remarcar que té dos modes de funcionament. Un, que podem qualificar de *declaratiu*, imita el procés de "síntesi" dels antics grecs, és a dir, enuncia conclusions que s'obtenen directament de les proposicions generades fins al moment mitjançant coneixements establerts (i generalment coneguts). L'altre, que podem qualificar d'*interrogatiu*, imita el procés d'"anàlisi" en el sentit dels antics, és a dir, fa *preguntes clau* amb les quals usualment es redueixen a un curt nombre els coneixements que cal posar en joc per intentar aconseguir l'objectiu del problema. Com veurem, els estudiants aprenen ràpidament les tècniques de resolució de problemes, i progressivament l'ajut que necessiten de l'Euclides es fa més esporàdic

i considerablement més sofisticat.

**Problema GE6**

Després de llegir l'enunciat, en Pau i la Raquel dibuixen la figura 37. Recorden molt bé que a l'inici de les classes el professor els va dir que, quan es tracta de resoldre problemes de geometria, un dibuix pot ésser decisiu. Amb tot això, però, és el primer problema, estan una mica cohibits i no saben ben bé com començar. Veient la situació, l'Ariadna sol·licita a l'Euclides que els ajudi.



**Figura 37:** El pentàgon i la raó àuria

Euclides: El quadrilàter  $PQUT$  és un paral·lelogram.

Raquel: Té raó, la diagonal  $QS$  és paral·lela al costat  $PT$  i la diagonal  $TR$  és paral·lela al costat  $PQ$ .

Euclides: El quadrilàter  $PQUT$  és un rombe.

Pau: És clar,  $PT = PQ$  perquè el pentàgon és regular.

Euclides: Així  $QU = PT$ .

Raquel: Obvi.

Euclides: Per tant,  $QS - PT = QS - QU = US$ .

P. i R.: Evident.

Euclides: Els triangles  $QTU$  i  $RUS$  són semblants.

Raquel: Ja ho veig, podem aplicar el criteri AAA de semblança.

Pau: El que diu que dos triangles són semblants quan tenen els tres angles iguals?

Raquel: Sí, si no ho recordo malament.

*L'Euclides ha aprofitat aquests instants per acabar la seva tasca i descarrega dues línies de símbols:*



## S. Xambó

Euclides: Per tant  $\frac{QU}{US} = \frac{QT}{RS} = \frac{QS}{PT}$ . I com que  $\frac{QU}{US} = \frac{PT}{QS-PT}$ , pel que ja hem vist, obtenim que  $\frac{QS}{PT} = \frac{PT}{QS-PT}$ .

*Passen els moments i l'Euclides ja no diu res més.*

R. i P.: I...?

Euclides: Què volíeu demostrar?

Pau: Que el costat del pentàgon regular és segment auri de la diagonal.

Euclides: I això què vol dir?

Raquel: Segons la definició, que si  $a$  és la diagonal i  $x$  el costat, llavors  $a/x = x/(a-x)$ .

Euclides: I fins on hem arribat en mode directe?

*L'Euclides diu "mode directe" al que nosaltres n'hem dit "declaratiu", i diu "mode invers" al que n'hem dit "interrogatiu", això és, el que ha emprat després de "I...?"*

Pau: Fins a la relació  $\frac{QS}{PT} = \frac{PT}{QS-PT}$ .

R. i P.: Ah, ja ho veiem! Efectivament s'ha establert que el costat  $PT$  és segment auri de la diagonal  $QS$ , i això acaba la prova!

### Problema GE16

*Ariadna també sol·licita l'ajuda de l'Euclides, que comença en mode interrogatiu.*

Euclides: Quina mena de coses us demanen?

Pau: No entenc què vol dir.

Raquel: Jo crec que ho sé: hem de demostrar que es compleixen unes certes desigualtats.

Euclides: Magnífic. Desigualtats..., entre què?

Pau: Entre distàncies.

Euclides: Excel·lent. I de què disposeu per demostrar desigualtats entre distàncies?

Pau: Jo només conec la desigualtat triangular.

Euclides: Pots enunciar-la?

Pau: Sí: en un triangle, tot costat és inferior a la suma dels altres dos.

Euclides: I com podríem intentar aplicar-la a les desigualtats que ens demanen?

*En Pau i la Raquel pensen un moment. No saben ben bé què dir. L'Euclides hi intervé, en mode declaratiu, per facilitar-los la tasca.*

Euclides: El problema demana dues desigualtats; en realitat estem en presència de dos problemes.

Raquel: Hauríem de fer un dibuix.

## Geometria




Figura 38: Figures usades per resoldre el problema 16

Amb un no res dibuizen la figura 38.a.

Raquel: Si posem  $2p$  per denotar el perímetre de  $ABC$ , hem de veure, d'una banda, que  $p < x + y + z$ , i, de l'altra, que  $x + y + z < 2p$ .

Euclides: Us faré una pregunta més explícita que l'anterior: com podeu usar la desigualtat triangular per establir  $p < x + y + z$ ?

Pau: Hauríem de cercar triangles, a la figura 38.a, en els que un costat estés relacionat amb el perímetre i els altres dos amb els segments  $x$ ,  $y$  i  $z$ .

Raquel: Els triangles  $PAB$ ,  $PBC$  i  $PCA$ , per exemple?

Pau: Sí, per exemple. La desigualtat triangular, aplicada a  $PAB$ , ens dóna  $c < x + y$ .

Raquel: I aplicada als altres dos ens dóna, anàlogament,  $a < y + z$  i  $b < z + x$ .

Pau: Sumant les tres desigualtats tenim  $a + b + c < 2x + 2y + 2z$ .

Raquel: I com que  $a + b + c = 2p$ , en resulta que  $p < x + y + z$ , com volíem demostrar.

Euclides: Heu demostrat una part del problema 16.

Pau: L'altra part era la desigualtat  $x + y + z < 2p$ .

Raquel: Si intentem de prosseguir l'anàlisi de l'Euclides, ara ens hauríem de preguntar com podem usar la desigualtat triangular per establir  $x + y + z < 2p$ .

Pau: Com en el cas anterior, hauríem de cercar triangles en els quals, a la inversa d'abans, un costat estigui relacionat amb els segments  $x$ ,  $y$  i  $z$ , i els altres dos, amb el perímetre.

Miren la figura 38.a i no aconsegueixen veure cap triangle que compleixi el que volen. Per un moment no saben què fer. Tot d'una, però, la Raquel té un idea; li sembla bona i això l'empeny a explicar les seves conseqüències sense pausa:

Raquel: No ens cal la desigualtat triangular: és evident que  $x + y < b + a$ ; anàlogament,  $y + z < c + b$  i  $z + x < a + c$ ; sumant,  $2x + 2y + 2z < 2a + 2b + 2c$ , és a dir,  $x + y + z < 2p$ . I ja està, hem acabat!

Pau: Això ha estat brillant, Raquel. Però... com veus que  $x + y < a + b$ ?

Raquel: Hum!

Pau: Com que és una desigualtat entre distàncies, potser el que hem d'intentar és provar-la aplicant de nou la desigualtat triangular.

Raquel: Tens raó; ja ens hem convençut que és l'única eina que coneixem per intentar resoldre aquesta mena de qüestions.


*En Pau completa la figura 38.a fins a obtenir la figura 38.b.*

Pau: Crec que ja ho tenim. Fixa-t'hi:  $x < AQ + QP$ , per la desigualtat triangular; per tant  $x + y < AQ + QP + y = AQ + QB$ ; ara  $QB < QC + CB$ , altra cop per la desigualtat triangular, d'on  $AQ + QB < AQ + QC + CB = AC + CB = b + a$ . Per tant,  $x + y < b + a$ .

Raquel: Efectivament. I així sí que la demostració és completa!

**Problema GE17**

*Abans de passar a intentar resoldre el problema 17, en Pau i la Raquel llegeixen el seu enunciat amb molta cura i dibuixen la figura 39.a.*



**Figura 39:** Figures usades per resoldre el problema 17

Pau: Em pregunto si el problema anterior, aplicat al baricentre  $G$ , ens donaria alguna cosa.

Raquel: Podem provar-ho. Només ens caldria saber el valor de  $x + y + z$  [amb les notacions del problema anterior i amb  $P = G$ ] en termes de  $\mu$  [la suma de les tres mitjanes].

Pau: Això és fàcil. Sabem que  $AG = \frac{2}{3}AA'$ , on  $A'$  és el punt mitjà de  $BC$ . En altres paraules,  $x = \frac{2}{3}m_A$ , on  $m_A$  és la mitjana corresponent al vèrtex  $A$ . Per tant  $x + y + z = \frac{2}{3}\mu$ .

Raquel: I com que  $p < x + y + z$  (pel problema 16), resulta que  $p < \frac{2}{3}\mu$ .

Pau: Que és equivalent a  $\frac{3}{2}p < \mu$ , la primera de les relacions que volem demostrar. Què passarà amb la segona?

Raquel: Si apliquem la segona desigualtat del problema anterior, obtenim  $\frac{2}{3}\mu < 2p$ .

Pau: Però el que volem és  $\mu < 2p$ . I  $\mu < 2p$  és més forta que  $\frac{2}{3}\mu < 2p$ .

## Geometria

- Raquel: Perquè  $\frac{2}{3}\mu < \mu$ , oi? Què hi farem! Haurem d'investigar una altra via.
- Pau: Podem intentar aplicar la desigualtat triangular una altra vegada.
- Raquel: Bona idea! Pel que hem après fins ara, ens cal trobar triangles amb un costat relacionat amb  $\mu$ , i els altres dos, amb el perímetre.

*Pensen una mica. Al final dibuixen la figura 39.b.*

- Pau: Com que  $A'B' = c/2$ , el triangle  $AA'B'$  té un costat,  $AA'$ , que és la mitjana  $m_A$ , mentre que els altres dos costats són iguals a  $c/2$  i  $b/2$ .
- Raquel: Ergo,  $m_A < c/2 + b/2$ . Anàlogament tenim  $m_B < a/2 + c/2$  i  $m_C < b/2 + a/2$ .
- Pau: I sumant,  $\mu < 2(a/2 + b/2 + c/2) = 2p$ .

*La Raquel i en Pau es disposen a celebrar l'èxit. Encara no han tingut temps de començar, quan l'Euclides pregunta:*

Euclides: Creieu que les desigualtats obtingudes són òptimes?

*L'interès amb què reben aquesta qüestió no els priva de prendre's un descans.*

Consiguem aquí només que quan van tornar a la qüestió es van adonar de les coses següents. Al problema 16, si fem  $P = C$ , llavors  $x + y + z = a + b + 0$ . Per tant, si fem que  $c$  sigui cada vegada més petit, llavors  $2p = a + b + c$  tendeix a  $a + b = x + y + z$ , i per tant la desigualtat  $x + y + z < 2p$  no es pot millorar. Per altra banda, si fem  $P = A$  i fem tendir  $c$  a 0, llavors  $x + y + z = 0 + a + c$  tendeix a  $a$  i  $p = (a + b + c)/2$  tendeix a  $(2a)/2 = a$ , amb la qual cosa es veu que la desigualtat  $p < x + y + z$  tampoc no es pot millorar. Pel que fa al problema 17, es van adonar, considerant un triangle amb  $c$  cada vegada més petit, que la desigualtat  $\mu < 2p$  no es pot millorar, i considerant un triangle en el que  $C$  tendeix al punt mitjà de  $AB$ , que tampoc no es pot millorar la desigualtat  $\frac{3}{2}p < \mu$ .

### Problema GE23

- Euclides: Què ens demanen?
- Raquel: Demostrar que el triangle òrtic d'un triangle donat és el que té el perímetre més petit entre tots els triangles inscrits al primer.
- Pau: És a dir, es tracta de veure que una certa longitud és mínima entre les que satisfan unes certes condicions.
- Euclides: Quins enunciats coneixeu que permetin concloure que una longitud és mínima?
- Raquel: Jo només conec que entre totes les corbes que uneixen dos punts, la recta és la que té longitud menor.
- Euclides: Podríem usar aquest coneixement per determinar si un triangle inscrit té perímetre mínim?
- Pau: No ho veig pas fàcil, ja que el triangle és una línia tancada.




Figura 40: Resolució del problema de Fagnano

Fan una pausa per dibuixar la figura 40.a.

Raquel: Potser podríem obrir-lo [el triangle  $PQR$ ]; obrir-lo d'alguna manera que ens fos útil.

Pau: Genial! Potser una manera d'aconseguir-ho sigui canviar els costats  $QR$  i  $PR$  pels seus simètrics  $QR'$  i  $QR''$  respecte dels costats  $AC$  i  $BC$ .

Raquel: Vegem quin aspecte tindria fent una figura.

Dibuixen la figura 40.b.

Raquel: La línia  $R'QPR''$  té, doncs, la mateixa longitud que el perímetre del triangle inscrit  $PQR$ .

Pau: Sí, és clar; per les propietats de les simetries sabem que  $R'Q = RQ$  i  $R''P = RP$ .

Raquel: A més a més,  $R'$  i  $R''$  no depenen en absolut de  $P$  i  $Q$ ; només depenen de la posició de  $R$ .

Pau: Ja veig com usar la propietat de la línia recta!

En Pau dibuixa la figura 41.a, mentre explica:




Figura 41: Resolució del problema de Fagnano (continuació)

Pau: Si considerem el segment  $R'R''$ , i aquest talla els segments  $AC$  i  $BC$  en els punts  $Q'$  i  $P'$ , llavors  $R'R''$  és el perímetre del triangle  $P'Q'R'$ . I com que  $R'R''$  és més curt que  $R'QPR''$  (o igual, si per casualitat fos  $Q' = Q$  i  $P' = P$ ), el triangle  $P'Q'R'$  té el perímetre més petit (o igual) que  $PQR$ . De fet, és el de perímetre més petit sempre que mantinguem  $R$  fix.

## Geometria

Raquel: Ara hauríem de veure, doncs, per quin punt  $R$  el segment  $R'R''$  té longitud mínima, ja que llavors el triangle  $P'Q'R$  serà la solució del problema.

*En Pau i la Raquel romanen en silenci. No veuen què poden fer. Han arribat fins aquí ajudats per l'Euclides en mode invers. Perquè puguin seguir, l'Euclides canvia súbitament a mode directe.*

Euclides: El triangle  $CR'R''$  és isòsceles.

Raquel: Per què?

Euclides:  $CR' = CR = CR''$  per les propietats de la simetries.

*Per poder seguir, dibuixen la figura 41.b. Decideixen oblidar-se dels punts  $P$  i  $Q$  del triangle inscrit inicial i usar les lletres  $P$  i  $Q$  per designar els punts que abans eren  $P'$  i  $Q'$ .*

Pau: De fet, doncs,  $CR'R$  i  $CRR''$  també són isòsceles.

Raquel: A més,  $CA$  i  $CB$  són les altures dels dos darrers triangles respecte del vèrtex  $C$ .

Pau: En resulta que l'angle  $\widehat{R'CR''}$  és el doble de l'angle  $\widehat{ACB}$ . Com que aquest darrer és fix,  $\widehat{R'CR''}$  també és fix; vull dir que no depèn de  $R$ .

Raquel: Tenim un triangle isòsceles,  $R'CR''$ , volem minimitzar la seva base  $R'R''$ , i sabem que l'angle oposat a la base és constant.

Pau: Sota aquestes condicions, la base serà mínima quan els costats (que són iguals) siguin mínims.

Raquel: Com que els costats són iguals a  $CR$ , la base  $R'R''$  serà mínima quan el segment  $CR$  ho sigui.

Pau: Fantàstic!  $CR$  és mínim quan  $R$  és el peu de l'altura respecte del vèrtex  $C$ !

Raquel: Per tant, el triangle inscrit de perímetre mínim és tal que  $R$  és el peu de l'altura i  $P$  i  $Q$  es construeixen com ja s'ha indicat.

Pau: Com que el paper de  $R$  en les consideracions anteriors el podrien haver fet  $P$  o  $Q$ , realment  $P$  i  $Q$  també són els peus de les corresponents altures.

Raquel: De fet, hem demostrat, doncs, que el triangle inscrit de perímetre mínim és el triangle òrtic, i que els simètrics d'un vèrtex del triangle òrtic respecte dels dos costats que no el contenen estan alineats amb els altres dos vèrtexs (del triangle òrtic).

Pau: És ben curiós!

*Mentre celebren alegrement aquestes excel·lents conclusions...*

Euclides: On heu usat la hipòtesi que el triangle és acutangle? És, aquesta hipòtesi, indispensable? Podríeu usar la vostra conclusió per resoldre el problema 19?

## Problema GE35

La Raquel i en Pau recorden que el cercle dels nou punts és el cercle  $A'B'C'$ , on  $A', B', C'$  són els punts mitjans dels costats, i que aquest cercle, també anomenat "d'Euler", passa pels peus  $P, Q, R$  de les altures i pels punts mitjans  $A'', B'', C''$  dels segments  $HA, HB, HC$ . També recorden, pel que han vist en problemes anteriors, que l'homotècia de centre  $G$ , el baricentre, transforma el cercle circumscrit  $ABC$  en  $A'B'C'$ . Abans de decidir què fer, dibuixen la figura 42 (s'ho arrangeu de manera que  $\hat{A} \geq \hat{B} \geq \hat{C}$ ). D'acord amb l'enunciat, el punt  $P'$  de l'arc  $A'P$  es defineix de manera que l'arc  $A'P' = \frac{1}{3}A'P$ ; i els punts  $Q'$  i  $R'$  es defineixen de manera similar.

Raquel: Volem veure que  $P'Q'R'$  és un triangle equilàter.

Pau: Segur que aquí l'Euclides preguntaria: Com podem veure que un triangle és equilàter?

Raquel: Una manera de fer-ho és aplicar la definició: un triangle és equilàter quan els seus tres costats són iguals. També n'hi ha prou veient que els seus tres angles són iguals (necessàriament d'amplitud  $\pi/3$ ). El que encara no veig és com aplicar algun d'aquests criteris al problema.

Pau: Atès que  $P'Q'R'$  estan sobre el cercle d'Euler, potser el segon criteri aniria millor.




Figura 42: Punts  $P', Q', R'$  del cercle d'Euler

Raquel: A mi també m'ho sembla. Hauríem de veure que, en el triangle  $P'Q'R'$ , els angles  $\widehat{P'}$ ,  $\widehat{Q'}$  i  $\widehat{R'}$  tenen amplitud  $\pi/3$ .

Pau: Com que aquests angles estan inscrits al cercle d'Euler, això és equivalent a dir que els arcs  $P'Q'$ ,  $Q'R'$  i  $R'P'$  sobre el cercle d'Euler tenen una amplitud de  $2\pi/3$  radians.

## Geometria

Raquel: Potser no serà tan difícil com podia semblar. Sobre el cercle d'Euler hi tenim ara 12 punts i potser ens aniria bé, abans de seguir, de deduir les amplituds d'alguns dels arcs entre aquests punts.

Pau: Em sembla bé. Els arcs  $A'B'$ ,  $B'C'$  i  $C'A'$ , per exemple, són fàcils: les seves amplituds són les mateixes que les dels arcs  $AB$ ,  $BC$  i  $CA$  sobre el cercle circumscrit  $ABC$ , és a dir, iguals a  $2\hat{C}$ ,  $2\hat{A}$  i  $2\hat{B}$ .

Raquel: Suposo que la primera afirmació que fas prové de l'homotècia que transforma  $ABC$  en  $A'B'C'$ , i que la segona surt directament del que sabem d'angles inscrits.

Pau: Efectivament.

$$A'B' = 2\hat{C}, \quad B'C' = 2\hat{A}, \quad C'A' = 2\hat{B}.$$

Ara ja no en veig cap més.

Raquel: Jo veig una relació que potser ens pot donar quelcom més. Fixa-t'hi [mentre ho diu, dibuixa la figura 43]: Com que  $A'$  és el punt mitjà de  $BC$  i  $C''$  el punt mitjà de  $BH$ , resulta que  $A'C''$  és paral·lela a l'altura  $BH$ .




Figura 43: Determinació d'angles centrals sobre el cercle d'Euler

Pau: Anàlogament  $A'B''$  és paral·lela a l'altura  $CR$ , etc.

Raquel: I així  $A'C''HB''$  és un paral·lelogram.



Pau: I tot això què té a veure amb els angles?

*La Raquel posa la lletra  $\alpha$  a l'angle  $\widehat{A'C''H}$  i a l'angle  $\widehat{HB''A'}$ .*

Raquel: Són iguals perquè són angles oposats en un paral·lelogram.

Pau: Ja ho veig. Per angles inscrits altra vegada,  $2\alpha$  és igual a l'arc  $A'C'R$  i també a l'arc  $A'B'Q$ .

Raquel: Els costats  $C''A'$  i  $C''H$  de l'angle  $\widehat{A'C''H}$  són perpendiculars, respectivament, als costats  $AC$  i  $AB$ . Per tant, de fet,  $\alpha = \widehat{A}$ .

Pau: Un gran pas: ara ja tenim que l'amplitud dels arcs  $A'B'Q$  i  $A'C'R$  és igual a  $2\widehat{A}$ .

Raquel: I per diferència [ $B'Q = A'Q - A'B'$  i  $C'R = A'R - A'C'$ ] obtenim que  $B'Q = 2\widehat{A} - 2\widehat{C}$  i  $C'R = 2\widehat{A} - 2\widehat{B}$ . Anàlogament, serà  $A'P = 2\widehat{B} - 2\widehat{C}$ . És a dir,

$$B'Q = 2\widehat{A} - 2\widehat{C}, \quad C'R = 2\widehat{A} - 2\widehat{B}, \quad A'P = 2\widehat{B} - 2\widehat{C}.$$

Pau: Ara ja podem calcular l'arc  $P'Q'$ :

$$\begin{aligned} P'Q' &= \frac{1}{3}A'P + A'B' + \frac{1}{3}B'Q \\ &= \frac{1}{3}(2\widehat{B} - 2\widehat{C}) + 2\widehat{C} + \frac{2}{3}(\widehat{A} - \widehat{C}) \\ &= \frac{2}{3}(\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C}) \\ &= \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

Que  $Q'R' = \frac{2\pi}{3}$  i  $R'P' = \frac{2\pi}{3}$ , es veu de manera anàloga.

*En Pau i la Raquel dibuizen la figura 44, simplement per gaudir de veure amb imatges el que han vist abans amb els ulls de la geometria. Abans de tenir temps de tancar la teminal i els quaderns, l'Euclides té temps de generar una pregunta.*

Euclides: Què en podeu dir de les tres parelles d'arcs  $A'C''$  i  $B'C''$ ,  $PB''$  i  $C'B''$ ,  $QA''$  i  $RA''$ ?

Podem transcriure breument que la Raquel i en Pau van veure ràpidament, usant que les altures són bisectrius del triangle òrtic, que  $RA'' = QA''$  i, usant el treball fet en el darrer problema, que  $RA'' = QA'' = \pi - 2\widehat{A}$ . Anàlogament  $PB'' = RB'' = \pi - 2\widehat{B}$  i  $PC'' = QC'' = \pi - 2\widehat{C}$ . Això, i de nou amb els resultats del primer problema, els permet veure que  $B'C'' = C'B'' = \pi - 2\widehat{A}$  i  $A'C'' = PB'' = \pi - 2\widehat{B}$ .

## 5 Mostra de solucions

En aquesta secció s'inclouen solucions convencionals dels problemes GE6, GE16, GE17, GE23 i GE35. Aquestes mateixes solucions les podeu trobar exposades en forma dialogada

## Geometria




Figura 44: El triangle equilàter  $P'Q'R'$

a la secció 4, la qual cosa pot tenir interès pels lectors que vulguin reflexionar amb més deteniment sobre el procés de resolució de problemes.

### Problema GE6

Considerem la figura 37 (pàg. 196). El quadrilàter  $PQUT$  és un rombe, ja que la diagonal  $QS$  és paral·lela al costat  $PT$ , la diagonal  $TR$  és paral·lela al costat  $PQ$  i  $PT = PQ$  (perquè el pentàgon és regular). Així  $QU = PT$ , d'on resulta que  $QS - PT = QS - QU = US$ .

Per altra banda, els triangles  $QTU$  i  $RUS$  són semblants (criteri AAA de semblança). Per tant  $\frac{QU}{US} = \frac{QT}{RS} = \frac{QS}{PT}$ . I com que  $\frac{QU}{US} = \frac{PT}{QS-PT}$ , pel que ja hem vist, obtenim que  $\frac{QS}{PT} = \frac{PT}{QS-PT}$ . Per tant, el costat  $PT$  és segment auri de la diagonal  $QS$ , per la definició de segment auri.

### Problema GE16

Com que ens demanen que demostrem dues desigualtats entre distàncies, intentarem aplicar la desigualtat triangular. Amb les notacions de la figura 38.a, si posem  $2p$  per denotar el perímetre de  $ABC$ , hem de veure, d'una banda, que  $p < x + y + z$ , i, de l'altra, que  $x + y + z < 2p$ .

Per establir que  $p < x + y + z$ , fixem-nos en els triangles  $PAB$ ,  $PBC$  i  $PCA$ . La desigualtat triangular, aplicada a  $PAB$ , ens dona  $c < x + y$ . Anàlogament,  $a < y + z$  i  $b < z + x$ . Sumant les tres desigualtats tenim  $a + b + c < 2x + 2y + 2z$ . Com que  $a + b + c = 2p$ , en resulta que  $p < x + y + z$ .

Manca veure la desigualtat  $x + y + z < 2p$ . Considerem la figura 38.b. Aplicant la desigualtat triangular obtenim:  $x + y < AQ + QP + y = AQ + QB < AQ + QC + CB = AC + CB = b + a$ . Anàlogament,  $y + z < c + b$  i  $z + x < a + c$ ; sumant,  $2x + 2y + 2z < 2a + 2b + 2c$ , és a dir,  $x + y + z < 2p$ .

### Problema GE17

El problema 16, aplicat al baricentre  $G$ , ens dona la primera desigualtat. En efecte, amb les notacions de la figura 39.a, sabem que  $AG = \frac{2}{3}AA'$ , on  $A'$  és el punt mitjà de  $BC$ . En altres paraules,  $x = \frac{2}{3}m_A$ , on  $m_A$  és la mitjana corresponent al vèrtex  $A$ . Per tant  $x + y + z = \frac{2}{3}\mu$ . Com que  $p < x + y + z$  (pel problema 16), resulta que  $p < \frac{2}{3}\mu$ , que és equivalent a  $\frac{3}{2}p < \mu$ . Val a remarcar que si apliquem la segona desigualtat del problema 16, obtenim  $\frac{2}{3}\mu < 2p$ , que és una desigualtat més feble que la desigualtat  $\mu < 2p$  que volem demostrar.

Per veure que  $\mu < 2p$ , considerem la figura 39.b. Com que  $A'B' = c/2$ , el triangle  $AA'B'$  té un costat,  $AA'$ , que és la mitjana  $m_A$ , mentre que els altres dos costats són iguals a  $c/2$  i  $b/2$ . Per tant,  $m_A < c/2 + b/2$ . Anàlogament, tenim  $m_B < a/2 + c/2$  i  $m_C < b/2 + a/2$ . Si ara sumem aquestes tres desigualtats, obtenim  $\mu < 2(a/2 + b/2 + c/2) = 2p$ .

### Problema GE23

Considerem la figura 40.a. Volem veure que  $PQR$  té perímetre mínim si i només si  $PQR$  és el triangle òrtic de  $ABC$ . Siguin  $R'$  i  $R''$  els simètrics del punt  $R$  respecte dels costats  $AC$  i  $BC$ , respectivament (figura 40.b). La línia  $R'QPR''$  té la mateixa longitud que el perímetre del triangle inscrit  $PQR$ . Si considerem els punts d'intersecció,  $Q'$  i  $P'$ , de  $R'R''$  amb els costats  $AC$  i  $BC$ , respectivament (figura 41.a), llavors el perímetre de  $P'Q'R$  és igual a  $R'R''$ . Com que la longitud de  $R'R''$  és inferior (o igual) a la longitud de la línia  $R'QPR''$ , veiem que el triangle  $P'Q'R$  és el de perímetre més petit entre tots els triangles inscrits  $PQR$  (amb  $R$  fix). Ara ens cal veure per quin punt  $R$  del costat  $AB$  té el segment  $R'R''$  longitud mínima, ja que llavors el triangle  $P'Q'R$  serà la solució del problema.

Remarquem que el triangle  $CR'R''$  és isòsceles ( $CR' = CR = CR''$  per les propietats de la simetries; vegeu la figura 41.b). De fet,  $CR'R$  i  $CRR''$  també són isòsceles i  $CA$  i  $CB$  són perpendiculars a  $RR'$  i  $RR''$ . En resulta que l'angle  $\widehat{RCR''}$  és el doble de l'angle  $\widehat{ACB}$ . Com que aquest darrer és fix,  $\widehat{RCR''}$  també és fix (és a dir, no depèn de  $R$ ). Per tant la base  $R'R''$  del triangle isòsceles  $R'CR''$  té longitud mínima si i només si els seus costats tenen longitud mínima. Però com que els costats són iguals a  $CR$ , la base  $R'R''$  serà mínima quan el segment  $CR$  ho sigui, és a dir, si i només si  $R$  és el peu de l'altura del vèrtex  $C$ . Anàlogament, es veuria que  $P$  i  $Q$  han de ser els peus de les altures de  $A$  i  $B$ , respectivament.

### Problema GE35

Recordem que el cercle dels nou punts és el cercle  $A'B'C'$ , on  $A', B', C'$  són els punts mitjans dels costats, i que aquest cercle, també anomenat *d'Euler*, passa pels peus  $P, Q, R$  de les altures i pels punts mitjans  $A'', B'', C''$  dels segments  $HA, HB, HC$ . Recordem també, pel que hem vist en problemes anteriors, que l'homotècia de centre  $G$  (el baricentre), transforma el cercle circumscrit  $ABC$  en  $A'B'C'$ .

Considerem la figura 42 (suposarem que  $\widehat{A} \geq \widehat{B} \geq \widehat{C}$ ). D'acord amb l'enunciat, el punt  $P'$  de l'arc  $A'P$  es defineix de manera que l'arc  $\text{arc}(A'P') = \frac{1}{3}\text{arc}(A'P)$ ; i els punts  $Q'$  i  $R'$  es defineixen de manera similar. Volem veure que  $P'Q'R'$  és un triangle equilàter, per la qual cosa és suficient veure que els angles  $\widehat{P'Q'R'}$  i  $\widehat{P'}$  (del triangle  $P'Q'R'$ ) tenen amplitud  $\pi/3$ . Com que aquests angles estan inscrits al cercle d'Euler, això és equivalent a dir que els arcs  $P'Q', Q'R'$  i  $R'P'$  sobre el cercle d'Euler tenen una amplitud de  $2\pi/3$  radians.

Les amplituds dels arcs  $A'B', B'C'$  i  $C'A'$  coincideixen amb les dels arcs  $AB, BC$  i  $CA$

## Geometria

sobre el cercle circumscrit  $ABC$ , és a dir, són iguals a  $2\widehat{C}$ ,  $2\widehat{A}$  i  $2\widehat{B}$  (per l'homotècia que transforma  $ABC$  en  $A'B'C'$  i per les propietats dels angles inscrits al cercle  $ABC$ ). Per tant,

$$\text{arc}(A'B') = 2\widehat{C}, \text{arc}(B'C') = 2\widehat{A}, \text{arc}(C'A') = 2\widehat{B}.$$

Considerem ara la figura 43. Com que  $A'$  és el punt mitjà de  $BC$  i  $C''$  el punt mitjà de  $BH$ , resulta que  $A'C''$  és paral·lela a l'altura  $BH$ . Anàlogament,  $B'A''$  és paral·lela a l'altura  $CH$  i  $C'B''$  és paral·lela a l'altura  $AH$ . Per tant,  $A'C''HB'$  és un paral·lelogram. Així obtenim que els angles  $\widehat{A'C''H}$  i  $\widehat{HB'A'}$  són iguals. Però, per angles inscrits altra vegada,  $2\alpha$  és igual a l'arc  $A'C'R$  i també a l'arc  $A'B'Q$ . A més a més, els costats  $C''A'$  i  $C''H$  de l'angle  $\widehat{A'C''H}$  són perpendiculars, respectivament, als costats  $AC$  i  $AB$ . Per tant,  $\alpha = \widehat{A}$ . Tenim, doncs, que l'amplitud dels arcs  $A'B'Q$  i  $A'C'R$  és igual a  $2\widehat{A}$ . Per diferència [ $B'Q = A'Q - A'B'$  i  $C'R = A'R - A'C'$ ] obtenim que  $B'Q = 2\widehat{A} - 2\widehat{C}$  i  $C'R = 2\widehat{A} - 2\widehat{B}$ . Anàlogament serà  $A'P = 2\widehat{B} - 2\widehat{C}$ . És a dir,

$$\text{arc}(B'Q) = 2\widehat{A} - 2\widehat{C}, \text{arc}(C'R) = 2\widehat{A} - 2\widehat{B}, \text{arc}(A'P) = 2\widehat{B} - 2\widehat{C}.$$

Ara ja podem calcular l'arc  $P'Q'$ :

$$\begin{aligned} \text{arc}(P'Q') &= \frac{1}{3}\text{arc}(A'P) + \text{arc}(A'B') + \frac{1}{3}\text{arc}(B'Q) \\ &= \frac{1}{3}(2\widehat{B} - 2\widehat{C}) + 2\widehat{C} + \frac{1}{3}(2\widehat{A} - 2\widehat{C}) \\ &= \frac{2}{3}(\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C}) \\ &= \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

Que  $\text{arc}(Q'R') = \frac{2\pi}{3}$  i  $\text{arc}(R'P') = \frac{2\pi}{3}$ , es veuen de manera anàloga.

## 6 Referències

COXETER, H. S. M., *Fundamentos de Geometría*. Limusa.

COXETER, H. S. M., GREITZER, S. L., *Geometry revisited*, 6a, The Mathematical Association of America, 1967.

EVES, H., *A survey of geometry*, Allyn and Bacon.

JOHNSON, R. A., *Advanced Euclidian Geometry*, Dover.

LARSON, L. C., *Problem-solving through problems*, Springer-Verlag.

PUIG ADAM, P., *Curso de Geometría métrica, (Tomo I - Fundamentos)*. Gómez Puig Ediciones.

*FORUM de problemes 93/94, Societat Catalana de Matemàtiques, IEC.*

En aquest capítol ens proposem aprendre a resoldre problemes d'Àritmètica. Segurament que la paraula aritmètica et sonarà a qualcun que varen aprendre a l'escola primària i que no t'has sentit a parlar més al llarg dels estudis secundaris. Per això, pensar ara a aprendre a resoldre problemes d'aritmètica et semblarà un xic estrany, potser fins i tot pensaràs que està fora de lloc per la seva inutilitat. Si és així, estàs ben lluny de la realitat. Hi ha problemes d'aritmètica molt difícils tant que alguns d'ells s'ha tardat molt temps a resoldre o potser de treballar-hi grans matemàtics. És certament a'hent tingut un exemple: El Teorema de Fermat. Aquest teorema diu: "Si  $n$  és un nombre natural més gran que 2, l'equació  $x^n + y^n = z^n$  no té solucions en nombres enters." El va enunciar Fermat cap a la meitat del segle XVII; fins l'any passat (1995) no s'ha trobat la demostració, i aquesta s'ha obtingut mitjançant mitjans de la més alta matemàtica. El Teorema de Fermat és un problema d'aritmètica perquè imposa que les solucions siguin nombres enters. Hi ha altres problemes d'aritmètica, com per exemple l'última de la Conjectura de Goldbach, enunciat per aquest matemàtic l'any 1742, i que diu: "Tot nombre parell més gran que dos és suma de dos primes", que encara no està resolt.

Si donem un cop d'ull als problemes proposats, que presenten de una manera dels problemes d'aritmètica que es poden presentar a aquest nivell, veiem que sempre han de fer intervenir nombres enters i en alguns cas racionals. Per això els problemes d'aritmètica. Han estat seleccionats de manera que els podem resoldre, o bé utilitzant propietats dels nombres enters que potser no les hem vistes mai però tenim prou matemàtica matemàtica per entendre-les, o bé amb mètodes d'àlgebra i d'anàlisi que hem après en el batxillerat. Però si intentem resoldre'ls, potser moltes vegades no aconseguim ni per un camí.

Per això, encara que considerem prioritari estudiar les propietats dels nombres enters abans



## ARITMÈTICA

Griselda Pascual i Xufré

### Introducció.

En aquest capítol ens proposem aprendre a resoldre problemes d'Aritmètica. Segurament que la paraula aritmètica us sonarà a quelcom que vàreu aprendre a l'escola primària i que no n'heu sentit a parlar més al llarg dels estudis secundaris. Per això, pensar ara a aprendre a resoldre problemes d'aritmètica us semblarà un xic estrany, potser fins i tot pensareu que està fora de lloc per la seva senzillesa. Si és així, esteu ben lluny de la realitat. Hi ha problemes d'aritmètica molt difícils; tant, que alguns d'ells s'ha tardat molt temps a resoldre a pesar de treballar-hi grans matemàtics. Recentment n'hem tingut un exemple: *El Teorema de Fermat*. Aquest teorema diu: "Si  $n$  és un nombre natural més gran que 2, l'equació  $x^n + y^n = z^n$  no té solucions en nombres enters." El va enunciar Fermat cap a la meitat del segle XVII; fins l'any passat (1995) no s'ha trobat la demostració, i aquesta s'ha obtingut utilitzant mitjans de la més alta matemàtica. El Teorema de Fermat és un problema d'aritmètica perquè imposa que les solucions siguin nombres enters. Hi ha altres problemes d'aritmètica, com per exemple l'anomenada *Conjectura de Goldbach*, enunciada per aquest matemàtic l'any 1742, i que diu "Tot nombre parell més gran que dos és suma de dos primers", que encara no estan resolts.

Si doneu un cop d'ull als problemes proposats, que pretenen ser una mostra dels problemes d'aritmètica que es poden presentar a aquest nivell, veureu que sempre només hi intervenen nombres enters i en algun cas racionals. Per això són problemes d'aritmètica. Han estat seleccionats de manera que els pogueu resoldre, o bé utilitzant propietats dels nombres enters que potser no les heu estudiat mai però teniu prou maduresa matemàtica per entendre-les, o bé amb recursos d'àlgebra i d'anàlisi que heu après en el batxillerat. Però si intenteu resoldre'ls, potser moltes vegades no sabreu ni per on començar.

Per això, encara que considerem prioritari revisar les propietats del nombres enters abans

esmentades, en lloc de fer-ne un llistat, ens ha semblat millor escollir de forma adequada uns quants problemes que intentarem pensar conjuntament, i incloure dins la forma de resoldre'ls les definicions i proposicions que siguin necessàries. (Donem per sabudes la definició de nombres enters i llurs operacions).

Observareu que hi ha dos tipus de problemes. Uns demanen que es busquin els nombres enters que satisfacin determinades condicions. Altres que es demostrï alguna propietat de determinats nombres enters. Tant per als uns com per als altres hem procurat indicar una metodologia per a la seva resolució. Però, com podreu comprovar, moltes vegades compta molt l'enginy matemàtic que cal cultivar resolent molts problemes.

També veureu que de les proposicions que intercalem en els problemes, algunes van acompanyades de les demostracions i d'altres no. S'ha posat la demostració sempre que aquesta ens podia donar un camí per arribar a la solució del problema. Les altres proposicions podeu o intentar demostrar-les o bé cercar la demostració en algun llibre.

Finalment, només voldríem aconsellar-vos que us féssiu vosaltres un petit promptuari d'aritmètica, extraient dels problemes totes les definicions i propietats que hi trobeu. Crec que us serà útil quan us proposeu de resoldre altres problemes.

**Problema 1.** Trobeu tots els triangles rectangles de costats enters que tenen el perímetre igual a l'àrea. (És un problema clàssic).

En principi és un problema de geometria, ja que ens cal saber propietats dels triangles rectangles. Però com que l'única cosa que hem d'utilitzar són les mesures dels costats podem enunciar el mateix problema aritmèticament. Si designem per  $x$ ,  $y$  les mesures dels catets i per  $z$  la de la hipotenusa, el teorema de Pitàgores diu que  $z^2 = x^2 + y^2$ ; el perímetre del triangle és  $x + y + z$  i l'àrea  $\frac{1}{2}xy$ . Per tant podem enunciar el problema així:

Trobeu totes les solucions en nombres naturals (les mesures són sempre positives) del sistema d'equacions

$$\begin{aligned} z^2 &= x^2 + y^2 \\ x + y + z &= \frac{1}{2}xy. \end{aligned}$$

*Solució.* Fent us dels coneixements d'àlgebra, com que la segona equació és lineal en  $z$ ,



### G. Pascual

aïllarem  $z$  en aquesta equació i la substituïrem a la primera. Obtindrem

$$z = \frac{1}{2}xy - (x + y)$$

$$\left(\frac{1}{2}xy - (x + y)\right)^2 = x^2 + y^2.$$

La segona equació és una equació de segon grau en dues incògnites que, després de desenvolupada i simplificada, queda de la forma:

$$x^2y^2 - 4xy(x + y) + 8xy = 0$$

o sigui

$$xy(xy - 4(x + y) + 8) = 0$$

Les solucions d'aquesta equació són  $x = 0, y = 0$ , i els valors que són solució de l'equació  $xy - 4(x + y) + 8 = 0$ .

En aquest moment entra l'aritmètica. Quins valors naturals de  $x, y$  satisfan aquesta equació? Per trobar-los només necessitem un xic d'enginy. Observem que si en el numerador en lloc d'un 8 hi hagués un 16 les coses serien molt senzilles. Doncs bé, fem entrar el 16 escrivint:

$$x = \frac{4y - 16}{y - 4} + \frac{8}{y - 4} = 4 + \frac{8}{y - 4}.$$

D'aquí resulta que  $x$  serà natural si i només si  $y - 4$  divideix 8. Com que els divisors de 8 són 8, 4, 2, 1 haurà de ser  $y - 4 = 8, 4, 2, 1$  i per tant les solucions són

$$y = 12, x = 5; \quad y = 8, x = 6; \quad y = 6, x = 8; \quad y = 5, x = 12.$$

Els únics triangles rectangles solució del problema seran el que tingui catets 12 i 5 i hipotenusa 13, i el que tingui catets 8 i 6 i hipotenusa 10.

**Problema 2.** El nombre 9687600 es pot escriure com a producte de nombres enters consecutius, un dels quals és primer. Calculeu quins són aquests factors.

Aquest problema és clarament un problema d'aritmètica; només hi intervenen nombres enters. Necessitem saber què és un nombre primer, amb la qual cosa entrem a la *divisibilitat* de nombres enters. En el problema anterior ja hem utilitzat que els nombres naturals divisors de 8 són 1, 2, 4, 8 sense donar la definició de divisor. Ho fem a continuació.

## Aritmètica

**Definició.** Donats dos nombres enters  $a$  i  $b$  es diu que  $b$  és múltiple de  $a$  o  $a$  divisor de  $b$  si existeix un nombre enter que multiplicat per  $a$  doni  $b$ ; és a dir si l'equació  $ax = b$  té solució en nombres enters. S'escriu  $b = a$  o bé  $a|b$ .

Tot nombre natural diferent de 1 té almenys dos divisors que són ell mateix i la unitat.

**Definició.** Un nombre natural es diu que és primer quan només té dos divisors. Quan té més de dos divisors es diu que és compost. El nombre 1 no és ni primer ni compost; es diu que és una unitat.

El nom de primer ve suggerit pel següent teorema, que per la seva importància, s'anomena

**Teorema fonamental.** Tot nombre natural compost descompon de manera única (sense tenir en compte l'ordre) en producte de factors primers.

Ara ja tenim el que necessitem per resoldre el problema. Veiem que el nombre 9687600 és compost ja que acaba en dos zeros. Descomponem-lo en factors primers:

$$9687600 = 2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 13 \cdot 23.$$

També aquí fem servir l'enginy per agrupar adequadament els factors i trobem que

$$8687600 = 23 \cdot 24 \cdot 25 \cdot 26.$$

**Problema 3.** Trobeu totes les solucions enteres de l'equació

$$p(x + y) = xy$$

on  $p$  és un nombre primer.

Observem que el primer membre de l'equació és el producte d'un nombre primer per la suma dels dos nombres que hem de cercar, i el segon el producte d'aquests dos nombres. Per resoldre'l utilitzarem la següent

**Propietat.** Si un nombre primer divideix un producte de dos nombres enters, en divideix almenys un.

Suposem que  $p$  divideix  $x$  i posem  $x = pt$  amb  $t$  un nombre enter. Substituint aquesta expressió a l'equació donada es té:

$$p(pt + y) = pty, \quad \text{d'on } pt + y = ty, \quad \text{o } pt = y(t - 1).$$

Com que  $t$  i  $t - 1$  no tenen cap divisor en comú, o  $p$  divideix  $y$ , o  $p = t - 1$  i  $y = t$ .

Si  $p$  divideix  $y$  és  $y = pu$  amb  $u$  un nombre enter, i substituint a l'equació que havíem obtingut resulta  $pt = pu(t - 1)$  d'on  $t = u(t - 1)$ . Si  $t = 0$ , com que  $t - 1$  és diferent de zero ha de ser  $u = 0$ , i aquests valors ens proporcionen la solució  $x = 0$ ,  $y = 0$ . Si  $t \neq 0$  ha de ser  $t - 1 \neq 0$  i  $u = \frac{t}{t-1} = 1 + \frac{1}{t-1}$ . Com que  $u$  ha de ser un enter diferent de zero, haurà de ser  $t - 1 = 1$ , és a dir  $t = 2$  i  $u = 2$ , d'on s'obté la solució  $x = 2p$ ,  $y = 2p$ . Si  $p = t - 1$  i  $y = t$  s'obté la solució  $y = p + 1$ ,  $x = py = p(p + 1)$ . Com que l'equació és simètrica en  $x, y$  el mateix raonament fet amb la incògnita  $x$  es pot fer amb la incògnita  $y$  amb la qual cosa obtindrem la solució  $x = p + 1$ ,  $y = p(p + 1)$ .

*Exemple.* Si  $p = 5$  les solucions són  $x = 0, y = 0$ ;  $x = 10, y = 10$ ;  $x = 30, y = 6$ ;  $x = 6, y = 30$ .

**Problema 4.** Trobeu un nombre natural  $n$  sabent que admeti només dos divisors primers diferents, que el nombre dels seus divisors és 6 i que la suma de tots els seus divisors és 28.

Per resoldre aquest problema ens cal saber calcular el nombre de divisors d'un nombre natural  $n$  i la suma de tots els seus divisors. Per això tenim la següent

**Proposició.** Si  $n$  descompon en factors primers de manera que

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}$$

amb  $p_i$ , ( $i = 1, 2, \dots, r$ ) nombres primers diferents, s'indica per  $d(n)$  el nombre de divisors de  $n$  i per  $s(n)$  la suma de tots aquests divisors, i es compleix

$$d(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_r + 1); \quad s(n) = \frac{p_1^{a_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{a_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdots \frac{p_r^{a_r+1} - 1}{p_r - 1}.$$

Intenteu demostrar aquesta proposició.

Ja estem en condicions de resoldre el problema. Posem  $n = p^a q^b$  on  $p$  i  $q$  representen els dos divisors primers diferents que divideixen  $n$ . Per les fórmules de la proposició ha de ser

$$(a + 1)(b + 1) = 6; \quad \frac{p^{a+1} - 1}{p - 1} \cdot \frac{q^{b+1} - 1}{q - 1} = 28$$

### Aritmètica

Com que  $a \geq 1$ ,  $b \geq 1$ , l'única descomposició possible de 6 vàlida és  $6 = 2 \cdot 3$ ; per tant de la primera equació resulta  $a + 1 = 2$ ,  $b + 1 = 3$ , o sigui  $a = 1$ ,  $b = 2$ .

Llavors la segona equació pren la forma

$$\frac{p^2 - 1}{p - 1} \cdot \frac{q^3 - 1}{q - 1} = 28 \quad \text{i simplificant} \quad (p + 1)(q^2 + q + 1) = 2^2 \cdot 7.$$

Com que  $p$  és primer  $p + 1 = 4$  i  $p = 3$ , i de  $q^2 + q + 1 = 7$  resulta  $q = 2$ . El nombre cercat és per tant  $n = 2^2 \cdot 3 = 12$ .

**Problema 5.** Resoldre amb nombres naturals el sistema d'equacions

$$\left. \begin{array}{l} xy = 51840 \\ \text{mcd}(x, y) = 24 \end{array} \right\}.$$

En aquest problema hi intervé el concepte de màxim comú divisor de dos nombres naturals. Recordem-ho,

**Definició.** El màxim comú divisor de dos nombres naturals  $a$  i  $b$  és el nombre natural  $d$  que divideix  $a$  i  $b$  i que tot altre divisor de  $a$  i  $b$  el divideix. S'indica per  $\text{mcd}(a, b) = d$ . Si  $d = 1$  és diu que els dos nombres són primers entre si o primers entre ells.

**Proposició.** Si es divideixen dos nombres  $a$  i  $b$  pel seu màxim comú divisor, s'obtenen dos nombres primers entre ells.

Ara tenim tot el que necessitem per resoldre el problema.

Posem  $x = 24t$ ,  $y = 24u$  on  $t$  i  $u$  representen enters primers entre si. Llavors  $24^2 tu = 51840$  i per tant  $tu = \frac{51840}{576} = 90$ . Només ens cal ara, descompondre 90 de totes les maneres possibles amb factors primers entre si, per obtenir totes les solucions del problema.  $90 = 45 \cdot 2 = 9 \cdot 10 = 18 \cdot 5$ . Fent  $t = 45$ ,  $u = 2$  es té  $x = 1080$ ,  $y = 48$ ; fent  $t = 9$ ,  $u = 10$  es té  $x = 216$ ,  $y = 240$ ; i finalment fent  $t = 18$ ,  $u = 5$  es té  $x = 432$ ,  $y = 120$ . Permutant la  $x$  i la  $y$  s'obté una altra terna de solucions.

Per tal de determinar el màxim comú divisor de dos nombres naturals cal tenir en compte que es disposa d'un algorisme molt útil que només fa ús de la divisió entera.

### G. Pascual

**Algorisme d'Euclides.** Siguin  $a$  i  $b$  dos nombres naturals,  $a > b$ . La divisió entera de  $a$  per  $b$  ens dóna dos nombres  $q_1, r_1$  que compleixen  $a = bq_1 + r_1$ ,  $r_1 < b$ . Dividint  $b$  per  $r_1$  tindrem  $b = r_1q_2 + r_2$  amb  $r_2 < r_1$ ; dividint  $r_1$  per  $r_2$  serà  $r_1 = r_2q_3 + r_3$  amb  $r_3 < r_2$ . Seguint aquest procés, com que els residus formen una successió de nombres naturals decreixent, s'arribarà a un residu 0. L'últim residu no nul obtingut és el màxim comú divisor de  $a$  i  $b$ . Per facilitar el càlcul s'acostumen a posar els diversos nombres que intervenen a l'algorisme en la forma següent:

	$q_1$	$q_2$	$\cdots$	$q_{k+1}$	$q_{k+2}$	$q_{k+3}$	
$a$	$b$	$r_1$	$\cdots$	$r_k$	$r_{k+1}$	$r_{k+2}$	$r_{k+2} = \text{mcd}(a, b)$
$r_1$	$r_2$	$r_3$	$\cdots$	$r_{k+2}$	0		

**Problema 6.** Trobeu dos nombres enters que satisfacin l'equació

$$1547x + 560y = 7.$$

Anem a veure con l'algorisme d'Euclides es pot utilitzar per resoldre aquesta equació. Comencem aplicant-lo per trobar el  $\text{mcd}(1547, 560)$ .

	2	1	3	4	1	3
1547	560	427	133	28	21	7
427	133	28	21	7	0	

i observeu que  $\text{mcd}(1547, 560) = 7$ . Escriviu els resultats parcials

$$7 = 28 - 1 \cdot 21$$

$$21 = 133 - 4 \cdot 28$$

$$28 = 427 - 3 \cdot 133$$

$$133 = 560 - 1 \cdot 427$$

$$427 = 1547 - 2 \cdot 560$$

i feu les successives substitucions:

$$7 = 28 - 1 \cdot 21 = 28 - 1 \cdot (133 - 4 \cdot 28) = 5 \cdot 28 - 1 \cdot 133 = 5 \cdot (427 - 3 \cdot 133) - 1 \cdot 133$$

$$= 5 \cdot 427 - 16 \cdot 133 = 427 - 16 \cdot (560 - 1 \cdot 427) = 21 \cdot 427 - 16 \cdot 560$$

$$= 21 \cdot (1547 - 2 \cdot 560) - 16 \cdot 560 = 21 \cdot 1547 - 58 \cdot 560.$$

## Aritmètica

amb la qual cosa heu obtingut la igualtat

$$1547 \cdot 21 + 560 \cdot (-58) = 7$$

Per tant  $x = 21$ ,  $y = -58$  són dos dels nombres cercats. Aquests no són els únics ja que posant

$$x = 21 - 560t \quad y = -58 + 1547t$$

i substituint a l'equació resulta

$$1547 \cdot (21 - 560t) + 560 \cdot (-58 + 1547t) = 7.$$

Donant a  $t$  tots els valors enters obtindreu totes les solucions.

**Problema 7.** Resoleu el sistema d'equacions

$$\left. \begin{array}{l} \text{mcm}(x, y) = 54612 \\ xy = 983016 \end{array} \right\}$$

En aquest problema intervé el concepte de mínim comú múltiple. Recordem la

**Definició.** El mínim comú múltiple de dos nombres naturals  $a$  i  $b$  és el nombre natural  $m$  que és múltiple de  $a$  i  $b$  i que divideix tot altre múltiple de  $a$  i  $b$ .

El problema es pot ara reduir al Problema 5 aplicant la següent

**Propietat.** Es compleix sempre

$$\text{mcm}(a, b) = \frac{ab}{\text{mcd}(a, b)} \quad \text{o bé} \quad \text{mcd}(a, b) = \frac{ab}{\text{mcm}(a, b)}.$$

Resulta

$$\text{mcd}(x, y) = \frac{983016}{54612} = 18$$

i ja estem en les condicions del Problema 5. Seguint aquells passos obtenim les solucions

$$x = 1332, y = 738; \quad x = 1476, y = 666; \quad x = 36, y = 27306.$$

**Problema 8.** Els tres nombres naturals  $1652_{(b)}$ ,  $2012_{(b)}$ ,  $2042_{(b)}$  (escrits en base  $b$ ) estan en progressió aritmètica. Determineu la base  $b$  i la raó de la progressió.

En aquest problema hi intervenen dos conceptes, el de base d'un sistema de numeració i el de progressió aritmètica. El primer resulta de la següent

**Proposició.** Donat un nombre natural  $b \geq 2$ , tot nombre natural  $n$  es pot escriure de manera única de la forma

$$n = a_0 + a_1b + a_2b^2 + \dots + a_rb^r$$

on els  $a_i$ ,  $i = 0, 1, \dots, r$  són nombres naturals menors que  $b$  amb  $a_r \neq 0$ . El nombre expressat així es diu que està escrit en el sistema de numeració de base  $b$ .

Recordem el segon concepte del problema.

**Definició.** Una successió de nombres  $a_1, a_2, \dots, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n, \dots$  forma una progressió aritmètica quan la diferència de dos termes consecutius  $a_{i+1} - a_i$  és un nombre constant  $r$  que s'anomena raó de la progressió.

Sabent això la resolució del problema proposat no presenta cap dificultat.

S'ha de complir

$$(2b^3 + 4b + 2) - (2b^3 + b + 2) = (2b^3 + b + 2) - (b^3 + 6b^2 + 5b + 2)$$

que després d'operar queda de la forma

$$b^3 - 6b^2 - 7b = 0$$

Ara cal resoldre aquesta equació de tercer grau amb l'incògnita  $b$ . En aquest cas és fàcil perquè es pot treure  $b$  factor comú i resoldre

$$b(b^2 - 6b - 7) = 0$$

Una solució és  $b = 0$ , i les altres dues les solucions de l'equació de segon grau  $b^2 - 6b - 7 = 0$  es veuen immediatament:  $b = -1$ ,  $b = 7$ . D'aquestes tres solucions la única vàlida pel nostre problema és  $b = 7$  ja que s'ha de complir la condició  $b \geq 2$ .

La raó de la progressió és  $r = 3b = 21$ .

## Aritmètica

**Problema 9.** Trobeu quin és l'exponent de 2 en la descomposició en factors primers de  $29!$ .

Per analitzar el problema escrivim el desenvolupament de  $29!$ .

$$\begin{aligned}
 29! &= 1 \cdot \underline{2} \cdot 3 \cdot \underline{4} \cdot 5 \cdot \underline{6} \cdot 7 \cdot \underline{8} \cdot 9 \cdot \underline{10} \cdot 11 \\
 &\quad \cdot \underline{\underline{12}} \cdot 13 \cdot \underline{14} \cdot 15 \cdot \underline{\underline{\underline{16}}} \cdot 17 \cdot \underline{18} \cdot 19 \cdot \underline{\underline{20}} \\
 &\quad \cdot 21 \cdot \underline{\underline{22}} \cdot 23 \cdot \underline{\underline{\underline{24}}} \cdot 25 \cdot \underline{26} \cdot 27 \cdot \underline{\underline{28}} \cdot 29
 \end{aligned}$$

Subratllem amb una ratlleta els múltiples de 2 i observem que d'aquests n'hi ha uns que només tenen una vegada el factor 2 i d'altres que el tenen més d'una vegada. Subratllem amb una altra ratlleta els que tenen el factor 2 dues vegades és a dir els múltiples de 4; també d'aquests n'hi ha que només el tenen dues vegades i d'altres que el tenen més de dues vegades. Subratllem amb una altra ratlleta els que el tenen més de dues vegades és a dir els múltiples de 8. També d'aquests n'hi ha que el tenen només tres vegades i d'altres que el tenen més de tres vegades és a dir els múltiples de 16 que els subratllem amb una altra ratlleta. Observem que no n'hi ha cap que tingui el factor 2 més de quatre vegades, ja que si algun el tingués cinc vegades seria múltiple de 32 i  $32 > 29$ . L'exponent amb què figura 2 a la descomposició de  $29!$  és igual al total del nombre de ratlletes que hem dibuixat o sigui  $14+7+3+1=25$ . Si recordem que la part entera d'un nombre  $x$  és el nombre enter més gran que és més petit o igual que  $x$ , que l'expressem per  $[x]$ , observarem que  $14 = \left[ \frac{29}{2} \right]$ ,  $7 = \left[ \frac{29}{2^2} \right]$ ,  $3 = \left[ \frac{29}{2^3} \right]$ ,  $1 = \left[ \frac{29}{2^4} \right]$ . Per tant podem escriure que l'exponent amb què figura 2 a la descomposició amb factors primers de  $29!$  és

$$a = \left[ \frac{29}{2} \right] + \left[ \frac{29}{2^2} \right] + \left[ \frac{29}{2^3} \right] + \left[ \frac{29}{2^4} \right].$$

El mateix raonament que hem fet amb  $29!$  i el primer 2 és vàlid per a  $n!$ ,  $n$  un enter qualsevol i un nombre primer  $p$ .

Per exemple, si volem calcular l'exponent  $a$  en què figura 7 en la descomposició de  $1000!$ , com que  $7^4 = 2401 > 1000$ , farem

$$a = \left[ \frac{1000}{7} \right] + \left[ \frac{1000}{7^2} \right] + \left[ \frac{1000}{7^3} \right] = 142 + 20 + 2 = 164.$$

Seria vàlid el raonament si  $p$  no fos primer? Intenta amb un exemple donar la resposta.



En general podem enunciar la següent

**Proposició.** L'exponent  $a$  en que figura un primer  $p$  en la descomposició de  $n!$  en factors primers és

$$a = \left[ \frac{n}{p} \right] + \left[ \frac{n}{p^2} \right] + \left[ \frac{n}{p^3} \right] + \dots$$

Encara que hem posat punts suspensius aquesta suma sempre acabarà ja que  $\left[ \frac{n}{p^k} \right] = 0$  si  $p^k > n$ .

**Problema 10.** Determineu les possibles bases de numeració  $x$  en les quals el nombre  $532_{(x)}$  és múltiple de 5.

Pel problema 8 sabem que aquest problema és equivalent a trobar tots els nombres naturals  $x \geq 2$  tals que  $5x^2 + 3x + 2$  és múltiple de 5.

Observem, en primer lloc, que  $5x^2$  és múltiple de 5 per qualsevol valor enter de  $x$ ; per tant el problema queda reduït a trobar tots els valors enters de  $x \geq 2$  tals que  $3x + 2$  és múltiple de 5, és a dir  $3x + 2 = 5k$  on  $k$  ha de ser un nombre enter. Seguint les indicacions del problema 6, i pensant un xic, podríem resoldre en nombres enters l'equació  $3x - 5k = 2$ . Però podem trobar un camí més curt introduint un concepte nou que, com veurem més endavant, ens serà molt útil per resoldre molts problemes. És la noció de *congruència* de nombres enters respecte d'un nombre natural  $m > 1$  que s'anomena *mòdul* de la congruència.

Comencem amb un exemple que ens servirà per resoldre el problema proposat.

Considerem el conjunt  $\mathbb{Z}$  dels nombres enters on hi tenim definit la suma, el producte, i divisió entera. Prenem  $m = 5$  com a mòdul de la congruència. Observem que tot nombre enter o serà múltiple de 5, o en dividir-lo per 5 donarà residus 1, 2, 3, o 4. Això ens permet classificar el conjunt  $\mathbb{Z}$  en cinc classes disjunctes que designarem per  $\bar{0}$ ,  $\bar{1}$ ,  $\bar{2}$ ,  $\bar{3}$ ,  $\bar{4}$ , posant a la classe  $\bar{0}$  els múltiples de 5, i a les classes  $\bar{1}$ ,  $\bar{2}$ ,  $\bar{3}$ ,  $\bar{4}$  els nombres que donin respectivament residu 1, 2, 3, 4 en dividir-los per 5. És a dir

$$\bar{0} = 5k, \quad \bar{1} = 5k + 1, \quad \bar{2} = 5k + 2, \quad \bar{3} = 5k + 3, \quad \bar{4} = 5k + 4$$

on en cada cas  $k$  pren tots els valors enters. Donem ara la següent

## Aritmètica

**Definició.** Dos nombres  $a, b \in \mathbb{Z}$  són congrus (o congruents) segons el mòdul 5, i s'indica per  $a \equiv b \pmod{5}$ , quan pertanyen a la mateixa classe, és a dir, quan donen el mateix residu en dividir-los per 5.

És fàcil provar que  $a \equiv b \pmod{5}$  si i només si  $a - b$  és múltiple de 5. Per tant es pot donar la definició equivalent

**Definició.** Es diu que dos nombres enters  $a$  i  $b$  són congrus (o congruents) segons el mòdul 5 quan  $a - b$  és múltiple de 5.

Les classes  $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$  s'anomenen classes de congruències mòdul 5.

Observem que el mateix que hem fet amb el 5, podem fer-ho agafant per mòdul qualsevol enter  $m > 1$  i per tant donar en general la següent

**Definició.** Dos nombres enters  $a, b$  són congrus (o congruents) segons el mòdul  $m$  quan donen el mateix residu en dividir-los per  $m$ . S'escriu  $a \equiv b \pmod{m}$ .

O equivalentment

**Definició.** Dos nombres enters  $a, b$  són congrus (o congruents) segons el mòdul  $m$  quan la diferència  $a - b$  és múltiple de  $m$ .

(Intentem demostrar l'equivalència d'aquestes dues definicions).

Segons el mòdul  $m$  es tenen  $m$  classes de congruència que corresponen als diferents residus  $0, 1, 2, 3, \dots, m - 1$  que s'obtenen en dividir un nombre enter per  $m$ .

La relació  $a \equiv b \pmod{m}$  és una relació de congruència o abreujadament es diu que és una congruència.

Les congruències tenen les següents

### Propietats.

- 1) Si  $a \equiv b \pmod{m}$  i  $c \equiv d \pmod{m}$ , llavors  $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ .
- 2) Si  $a \equiv b \pmod{m}$  i  $c$  és un enter qualsevol, llavors  $ca \equiv cb \pmod{m}$ .
- 3) Si  $a \equiv b \pmod{m}$  i  $c \equiv d \pmod{m}$ , llavors  $ac \equiv bd \pmod{m}$ .

4) Si  $a \equiv b \pmod{m}$  i  $d$  divideix  $m$ , llavors  $a \equiv b \pmod{d}$   
i  $a \equiv b \pmod{m/d}$ .

5) Si  $ca \equiv cb \pmod{m}$  i  $\text{mcd}(c, m) = 1$ , llavors  $a \equiv b \pmod{m}$ .

Observeu que a la propietat 5) és necessari que  $\text{mcd}(a, b) = 1$ . Per exemple  $10 \equiv 16 \pmod{6}$  i  $5 \not\equiv 8 \pmod{6}$ .

(Intentem demostrar aquestes propietats).

Apliquem ara les congruències a la resolució del problema proposat.

Ha de ser  $5x^2 + 3x + 2 \equiv 0 \pmod{5}$ . Com que per tot enter  $x$  és  $5x^2 \equiv 0 \pmod{5}$ , els valors buscats seran tots els enters  $x$  més grans que 1 que satisfacin la congruència  $3x + 2 \equiv 0 \pmod{5}$ , o sigui  $3x \equiv -2 \pmod{5}$ . Però  $-2 \equiv 3 \pmod{5}$  per tant  $3x \equiv 3 \pmod{5}$  i simplificant  $x \equiv 1 \pmod{5}$ .

D'aquí resulta que les bases de numeració possibles són tots els enters de la forma  $x = 5k+1$  on  $k$  representa qualsevol enter positiu.

**Problema 11.** Trobeu tots els enters positius  $n$  tals que  $2^n - 1$  és divisible per 7.

*Solució.* Escriviu l'enunciat en la forma  $2^n - 1 \equiv 0 \pmod{7}$  o sigui  $2^n \equiv 1 \pmod{7}$ . Només cal veure quines potències de 2 són congrües amb 1 segons el mòdul 7. Es té:

$$2^0 \equiv 1 \pmod{7}, \quad 2^1 \equiv 2 \pmod{7}, \quad 2^2 \equiv 4 \pmod{7}, \quad 2^3 \equiv 1 \pmod{7}.$$

A partir d'aquí, per les propietats de les congruències, els residus s'aniran repetint de 3 en 3, és a dir

$$2^4 \equiv 2 \pmod{7}, \quad 2^5 \equiv 4 \pmod{7}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{7}, \text{ etc.}$$

D'aquí resulta que

$$2^n \equiv 1 \pmod{7} \iff n \equiv 0 \pmod{3}$$

$$2^n \equiv 2 \pmod{7} \iff n \equiv 1 \pmod{3}$$

$$2^n \equiv 4 \pmod{7} \iff n \equiv 2 \pmod{3}.$$

Com que  $2^n - 1$  és múltiple de 7 si i només si  $n$  és múltiple de 3, les solucions del problema són tots els enters positius múltiples de 3.

Fixeu-vos que a més a més de resoldre el problema proposat hem obtingut tots aquests altres resultats.

La solució amb enters positius de l'equació  $2^n + 6 \equiv 0 \pmod{7}$  la formen tots els enters positius  $n \equiv 0 \pmod{3}$ .

## Aritmètica

Les solucions amb enters positius de les equacions  $2^n - 2 \equiv 0$  i  $2^n + 5 \equiv 0 \pmod{7}$  les formen tots els enters positius  $n \equiv 1 \pmod{3}$ .

Les solucions amb enters positius de les equacions  $2^n - 4 \equiv 0$  i  $2^n + 3 \equiv 0 \pmod{7}$  les formen tots els enters positius  $n \equiv 2 \pmod{3}$ .

Les equacions  $2^n - 6 \equiv 0$ ,  $2^n + 1 \equiv 0$ ,  $2^n - 3 \equiv 0$ ,  $2^n + 4 \equiv 0 \pmod{7}$  no tenen solució amb enters positius.

**Problema 12.** Trobeu totes les parelles de nombres enters  $(x, y)$  tals que  $x^2 = 21 + 4y^2$ .

Aquest és un problema d'aritmètica que té una interpretació geomètrica important. L'equació donada es pot escriure en la forma  $\frac{x^2}{21} - \frac{y^2}{\frac{4}{4}} = 1$ , on reconeixem que es tracta de l'equació d'una hipèrbola de semieixos  $a = \sqrt{21}$ ,  $b = \frac{1}{2}\sqrt{21}$ . Per tant el problema s'hauria pogut enunciar així:

*Trobeu tots els punts de coordenades enteres de la cònica  $x^2 = 21 + 4y^2$ .*

Aquest és un cas particular del problema següent: Trobar els punts de coordenades enteres d'una cònica donada per una equació amb coeficients enters.

En general aquest és un problema d'aritmètica difícil, però en casos particulars com per exemple la nostra cònica, es pot resoldre fàcilment.

Si escrivim l'equació de la cònica en la forma  $x^2 - 4y^2 = 21$ , observarem que el primer membre és una diferència de quadrats i per tant es pot posar en la forma  $(x-2y)(x+2y) = 21$ . Com que  $x, y$  han de ser enters, també ho han de ser  $x-2y$ ,  $x+2y$  i aquests podran prendre tants valors com possibles descomposicions en factors enters del nombre 21. Com que  $21 = 1 \cdot 21 = (-1) \cdot (-21) = 3 \cdot 7 = (-3) \cdot (-7)$ , les solucions estaran entre les dels sistemes:

$$\left. \begin{array}{l} x - 2y = 1 \\ x + 2y = 21 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} x - 2y = 21 \\ x + 2y = 1 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} x - 2y = -1 \\ x + 2y = -21 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} x - 2y = -21 \\ x + 2y = -1 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} x - 2y = 3 \\ x + 2y = 7 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} x - 2y = 7 \\ x + 2y = 3 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} x - 2y = -3 \\ x + 2y = -7 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} x - 2y = -7 \\ x + 2y = -3 \end{array} \right\}$$

Aquestes són respectivament  $(11, 5)$ ,  $(11, -5)$ ,  $(-11, -5)$ ,  $(-11, 5)$ ,  $(5, 1)$ ,  $(5, -1)$ ,  $(-5, 1)$ , i com que totes són enteres, totes són solucions del problema. Per tant els únics punts de coordenades enteres de la hipèrbola d'equació  $x^2 = 21 + 4y^2$  són els que acabem de trobar. Intenteu dibuixar aquesta hipèrbola.

**Problema 13.** Per cada nombre natural  $n$  escrivim

$$(1 + \sqrt{2})^{2n+1} = a_n + b_n\sqrt{2}$$

i així tenim dues successions de nombres enters

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots \qquad b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$$

- a) Demostreu que  $a_n$  i  $b_n$  són senars per tot nombre natural  $n$ .  
 b) Demostreu que  $b_n$  és la hipotenusa d'un triangle rectangle de catets

$$\frac{a_n + 1}{2}, \quad \frac{a_n - 1}{2}.$$

Observeu que en aquest cas es tracta de demostrar unes propietats que les satisfan tots els nombres naturals. Per als problemes d'aquest tipus és sempre molt útil tenir present una propietat que és característica del conjunt dels nombres naturals, i que ara enunciarem.

### Principi d'inducció matemàtica.

Si  $C$  és un conjunt de nombres naturals que compleix

- 1) 1 pertany a  $C$
- 2) si un nombre natural  $k$  pertany a  $C$ , el seu següent  $k + 1$  també pertany a  $C$

llavors  $C$  és el conjunt de tots els nombres naturals.

Aquest principi és un axioma pel conjunt dels nombres naturals, és a dir no es demostra. El podem aplicar sempre que volguem demostrar que una propietat és certa per tots els nombres naturals. N'hi ha prou a provar que és certa per a 1 i que si és certa per a un natural arbitrari  $k$  també ho és per al seu següent  $k + 1$ .

És interessant veure com induïnt podríem descobrir les propietats enunciades en el problema.

Part a). Calculeu el valor de l'expressió  $(1 + \sqrt{2})^{2n+1}$  per uns quants nombres naturals consecutius, començant per  $n = 1$ .

$$n = 1 \quad (1 + \sqrt{2})^3 = (1 + \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})^2 = (1 + \sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) = 7 + 5\sqrt{2}$$

$$n = 2 \quad (1 + \sqrt{2})^5 = (1 + \sqrt{2})^3(1 + \sqrt{2})^2 = (7 + 5\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) = 41 + 29\sqrt{2}$$

$$n = 3 \quad (1 + \sqrt{2})^7 = (1 + \sqrt{2})^5(1 + \sqrt{2})^2 = (41 + 29\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) = 239 + 169\sqrt{2}$$

### Aritmètica

Podeu continuar un xic més donant a  $n$  uns quants valors més, i observem que en tots els casos és

$$(1 + \sqrt{2})^{2n+1} = a_n + b_n\sqrt{2}$$

on  $a_n$  i  $b_n$  són nombres enters imparells. Ens preguntem si això serà cert per tots els valors de  $n$ . La resposta la trobem aplicant el principi d'inducció.

Ja hem vist que és cert per a  $n = 1$ .

Suposem que és cert per a un natural qualsevol  $n = k$ , és a dir que se satisfà

$$(1 + \sqrt{2})^{2k+1} = a_k + b_k\sqrt{2}$$

on  $a_k$  i  $b_k$  són nombres naturals imparells. Calculem

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{2})^{2(k+1)+1} &= (1 + \sqrt{2})^{2k+3} = (1 + \sqrt{2})^{2k+1}(1 + \sqrt{2})^2 = (a_k + b_k\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) \\ &= (3a_k + 4b_k) + (2a_k + 3b_k)\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Com que  $a_k$  i  $b_k$  són per hipòtesi nombres naturals imparells,  $a_{k+1} = 3a_k + 4b_k$  i  $b_{k+1} = 2a_k + 3b_k$  també seran imparells, i pel principi d'inducció seran imparells per tot valor natural de  $n$ .

Part b). És clar que en ser  $a_n$  imparell,  $\frac{a_n - 1}{2}$  i  $\frac{a_n + 1}{2}$  seran enters. Calculem-los per uns quants valors de  $n$ .

$$\begin{aligned} n = 1 \quad \frac{a_1 - 1}{2} &= 3 \quad \frac{a_1 + 1}{2} = 4 \quad b_1 = 5 \\ n = 2 \quad \frac{a_2 - 1}{2} &= 20 \quad \frac{a_2 + 1}{2} = 21 \quad b_2 = 29 \\ n = 3 \quad \frac{a_3 - 1}{2} &= 119 \quad \frac{a_3 + 1}{2} = 120 \quad b_3 = 169 \end{aligned}$$

Observem que és  $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$ ,  $20^2 + 21^2 = 881 = 29^2$ ,  $119^2 + 121^2 = 28651 = 169^2$  és a dir que les ternes  $(3, 4, 5)$ ,  $(20, 21, 29)$ ,  $(119, 120, 169)$  són solucions de l'equació  $x^2 + y^2 = z^2$  i per tant compleixen el teorema de Pitàgoras.

Per demostrar que per a tot  $n$  se satisfà

$$\left(\frac{a_n - 1}{2}\right)^2 + \left(\frac{a_n + 1}{2}\right)^2 = b_n^2$$

escrivim aquesta igualtat en la forma

$$a_n^2 + 1 = 2b_n^2$$

que ja hem vist que és certa per a  $n = 1$ . Suposem que és certa per a un natural qualsevol  $n = k$  és a dir que  $a_k^2 + 1 = 2b_k^2$  i anem a provar que també ho és per a  $n = k + 1$ . Com que  $a_{k+1} = 3a_k + 4b_k$  i  $b_{k+1} = 2a_k + 3b_k$  resulta

$$a_{k+1}^2 + 1 = (3a_k + 4b_k)^2 + 1 = 9a_k^2 + 24a_k b_k + 16b_k^2 + 1 = 8a_k^2 + 24a_k b_k + 18b_k^2 = 2(2a_k + 3b_k)^2 = 2b_{k+1}^2.$$

Pel principi d'inducció queda demostrat que per a tot natural  $n$ ,  $\frac{a_n - 1}{2}$  i  $\frac{a_n + 1}{2}$  són els catets d'un triangle rectangle de hipotenusa  $b_n$ .

**Problema 14.** Proveu que si  $n \in \mathbb{Z}$  és positiu i  $p$  és primer, llavors  $n^p - n$  és múltiple de  $p$ .

Com que un enter positiu s'identifica amb un nombre natural podem aplicar el principi d'inducció.

Per a  $n = 1$  és  $1^p - 1 = 0$  i com que el zero és múltiple de tots els nombres, és múltiple de  $p$ .

Suposem que per a un nombre natural qualsevol  $k$  és  $k^p - k$  múltiple de  $p$ , i calculem

$$\begin{aligned} (k+1)^p - (k+1) &= k^p + \binom{p}{1}k^{p-1} + \binom{p}{2}k^{p-2} + \dots + \binom{p}{j}k^{p-j} + \dots + \binom{p}{p-1}k + 1 \\ &\quad - (k+1) \\ &= k^p - k + \binom{p}{1}k^{p-1} + \binom{p}{2}k^{p-2} + \dots + \binom{p}{j}k^{p-j} + \dots + \binom{p}{p-1}k. \end{aligned}$$

Com que per la hipòtesi d'inducció  $k^p - k$  és múltiple de  $p$ , només cal demostrar que la suma restant és múltiple de  $p$ . Demonstrarem que cada sumand és múltiple de  $p$  (que és més fort que el que ens demanen), provant que  $\binom{p}{j}k^{p-j}$   $j = 1, 2, \dots, p-1$  és múltiple de  $p$ . Sabem de la teoria combinatòria que

$$\binom{p}{j} = \frac{p!}{j!(p-j)!}$$

i que és un nombre natural; pel problema 9 sabem que l'exponent en que figura  $p$  en  $p!$  és 1, i com que  $j < p$  i  $p-j < p$  en  $j!$  i en  $(p-j)!$  hi figurarà amb exponent 0 per tant en el quocient  $\frac{p!}{j!(p-j)!}$  amb exponent 1, és a dir és múltiple de  $p$ .

Als matemàtics, meditar sobre un problema resolt els porta quasi sempre a fer-se noves preguntes. Anem a fer-nos-en nosaltres. Fixeu-vos que a l'enunciat del problema s'imposa la condició que  $n$  sigui un enter positiu, i això ens ha permès fer la demostració per inducció.

Primera pregunta. És pot afirmar el mateix quan  $n$  és negatiu? És clar que la demostració per inducció no és vàlida. Però considereu alguns casos particulars. Per exemple poseu  $p = 5$  i calculeu  $n^5 - n$  per uns quants valors negatius de  $n$ , i trobareu que sempre és múltiple de 5. Abans de arriscar-nos a conjeturar res proveu per a alguns altres nombres primers per exemple  $p = 7, 11$  i trobareu que sempre se satisfà. Ara ens atrevim a conjeturar

*Per tot enter  $a$  i tot primer  $p$ ,  $a^p - a$  és múltiple de  $p$ .*

Cal intentar de trobar una demostració.

Per això posarem  $a^p - a = a(a^{p-1} - 1)$ . Si  $a$  és múltiple de  $p$  és obvi que  $a(a^{p-1} - 1)$  és múltiple de  $p$ . Però si  $p$  no divideix  $a$  i la conjectura és certa,  $p$  ha de dividir  $a^{p-1} - 1$  que és el que hem de demostrar. Això és cert, i és una proposició molt important d'aritmètica que s'anomena *Congruència de Fermat*, fent honor al matemàtic que la va enunciar per primera vegada. Pel seu nom ja deveu sospitar que per demostrar-la utilitzarem les congruències que vàrem introduir en el problema 10. Anunciarem la proposició així:

**Congruència de Fermat.** Si  $p$  és un nombre primer, i  $a$  un enter qualsevol primer amb  $p$ , és compleix

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

*Demostració.* Considerem els nombres  $1, 2, \dots, p-1$ . Cadascun d'ells pertany a una classe diferent mòdul  $p$ , i com que són tots els residus possibles que es podem obtenir en dividir un enter per  $p$ , les classes a les quals pertanyen són totes les classes possibles. Considerem ara els nombres  $a \cdot 1, a \cdot 2, \dots, a \cdot (p-1)$ . Aquests nombres són incongrus dos a dos ja que si  $a \cdot k \equiv a \cdot l \pmod{p}$ ,  $1 \leq k, l \leq p-1$  seria  $a \cdot k - a \cdot l = a(k-l)$  múltiple de  $p$  i com que  $p$  no divideix  $a$ ,  $p$  hauria de dividir  $k-l$  o sigui que seria  $k \equiv l \pmod{p}$  en contra del que hem dit abans. Per tant com que en tenim  $p-1$ , cadascun d'ells haurà de ser congru amb un i només un dels  $1, 2, \dots, p-1$ . Aplicant les propietats de les congruències és pot escriure

$$a \cdot 1 \cdot a \cdot 2 \cdot a \cdot 3 \cdots a \cdot (p-1) \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}$$

o sigui  $a^{p-1} \cdot (p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$ . Com que  $\text{mcd}(p, (p-1)!) = 1$  és pot simplificar la congruència dividint els dos membres per  $(p-1)!$  i s'obté

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$



que és el que volíem demostrar.

Segona pregunta. Què passa quan el mòdul no és un nombre primer? Comenceu amb un cas particular prenent, per exemple, per mòdul  $m = 6$  i fent  $a = 5$ . És  $\text{mcd}(5, 6) = 1$ , i  $a^{m-1} = 5^5 \equiv 5 \pmod{6}$ , per tant no es compleix la congruència de Fermat. Alguna cosa de la demostració falla quan el mòdul no és primer. Repasseu-la a veure si ho trobeu. Podríem deixar aquí la qüestió per acabada, però encara ens farem una

Tercera pregunta. Pot ser que per un altre exponent  $\phi(m)$  relacionant amb el mòdul d'una manera que es pugui determinar, resulti que si  $\text{mcd}(a, m) = 1$  és  $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ ? La resposta és afirmativa, i anem a veure qui pot ser  $\phi(m)$ . Hem vist que en el cas en què  $m$  no és primer, la interpretació de l'exponent com el mòdul menys 1 no és vàlida; però es pot trobar una altra interpretació de l'exponent que sí que sigui vàlida. Fixem-nos que si  $p$  és primer, els nombres  $1, 2, 3, \dots, p-1$  són tots primers amb  $p$ , per tant  $p-1$  és també el nombre de nombres naturals primers amb  $p$  i menors que  $p$ . Serà aquesta la interpretació vàlida de l'exponent? Tornem al cas  $m = 6$ . Els nombres primers amb 6 i menors que 6 són 1 i 5, és a dir n'hi ha dos. Calculem  $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{6}$ . És cert!. Proveu-ho per alguns altres nombres i veureu que sempre és cert. Si heu fet el que us he dit de mirar on fallava la demostració, probablement ja us haureu adonat que els nombres que presentaven dificultats eren els menors que  $m$  i no primers amb  $m$ , per tant la conclusió a la que hem arribat tampoc és estranya. Procedim a enunciar correctament i a demostrar la següent proposició que s'anomena

**Congruència d'Euler.** Si  $m$  és un nombre natural  $m > 1$ ,  $a$  és un nombre enter primer amb  $m$ , i s'indica per  $\phi(m)$  el nombre de nombres naturals primers amb  $m$  i menors que  $m$ , es compleix:

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Observeu que la congruència de Fermat és un cas particular de la congruència d'Euler.

*Demostració.* Siguin  $b_1, b_2, \dots, b_{\phi(m)}$  tots els nombres naturals primers amb  $m$  i menors que  $m$ . Ara només cal seguir el raonament fet a la congruència de Fermat. Aquests nombres són incongrus dos a dos segons el mòdul  $m$ . Com que  $\text{mcd}(a, m) = 1$ , els nombres  $a \cdot b_1, a \cdot b_2, \dots, a \cdot b_{\phi(m)}$  seran també incongrus dos a dos i cadascun d'ells congru amb un i només un dels  $b_1, b_2, \dots, b_{\phi(m)}$ . Per tant

$$a \cdot b_1 \cdot a \cdot b_2 \cdots a \cdot b_{\phi(m)} \equiv b_1 \cdot b_2 \cdots b_{\phi(m)} \pmod{m}$$

o sigui

$$a^{\phi(m)}(b_1 \cdot b_2 \cdots b_{\phi(m)}) \equiv b_1 \cdot b_2 \cdots b_{\phi(m)} \pmod{m}$$

Com que cada  $b_i$  és primer amb  $m$  és pot simplificar la congruència i s'obté

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

que és el que volíem demostrar.

Ens queda encara una

Quarta pregunta. Com podem calcular el nombre  $\phi(m)$  anomenat *indicador* de  $m$ ? És clar que si  $m$  és un nombre primer  $\phi(m)$  és  $m - 1$ . El pas següent que sembla natural fer és calcular  $\phi(p^a)$  on  $p$  és un nombre primer. Els nombres menors que  $p^a$  i que són primers amb  $p^a$  són els nombres compresos entre 1 i  $p^a$  que no són múltiples de  $p$ . Com que múltiples de  $p$  n'hi ha  $p^{a-1}$  d'aquí resulta que

$$\phi(p^a) = p^a - p^{a-1} = p^{a-1}(p - 1)$$

Si  $m$  no és la potència d'un primer podem pensar en descompondre  $m$  en factors primers, és a dir  $m = p^{a_1} \cdot p^{a_2} \cdots p^{a_n}$ , però no sabem com es comporta l'indicador respecte del producte. Com sempre posem-nos un exemple. Volem calcular  $\phi(18)$ ; si contem quants nombres hi ha primers amb 18 i menors que 18 veurem que n'hi ha 6. Posem  $18=3 \cdot 6=2 \cdot 9$ ; si l'indicador del producte fos igual al producte dels indicadors resultaria  $\phi(18)=\phi(3) \phi(6)=4$ , la qual cosa és falsa. Però en canvi si posem  $\phi(18)=\phi(2) \phi(9)=6$  i això és cert. Observem que l'indicador del producte no és sempre igual al producte dels indicadors dels factors; ha resultat fals en el cas en què els dos factors tenen un divisor comú, i vertader quan són primers entre si. El que hem observat és cert i podem enunciar la següent proposició que no demostrarem perquè encara no tenim tots els recursos necessaris.

**Proposició.** Si  $k$  i  $l$  són dos nombres naturals tals que  $\text{mcd}(k, l) = 1$ , llavors

$$\phi(k \cdot l) = \phi(k)\phi(l)$$

Aquesta proposició ens diu com hem de calcular  $\phi(m)$ . Si  $m = p^{a_1} \cdot p^{a_2} \cdots p^{a_n}$ , com que  $\text{mcd}(p_i^{a_i}, p_j^{a_j}) = 1$  per  $i, j = 1, 2, \dots, r$ , es té la fórmula següent:

$$\phi(m) = p_1^{a_1-1} \cdot p_2^{a_2-1} \cdots p_r^{a_r-1} \cdot (p_1 - 1) \cdot (p_2 - 1) \cdots (p_r - 1).$$

Encara un parell d'observacions.

1) La congruència d'Euler afirma que si  $\text{mcd}(a, m) = 1$  és  $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ . Però es poden donar casos que per alguns nombres  $a$  (que poden ser tots segons quin sigui el mòdul  $m$ ) existeixin nombres  $k$  menor que  $\phi(m)$  tals que  $a^k \equiv 1 \pmod{m}$ . Per exemple per  $m = 11$ ,  $\phi(11) = 10$  però  $3^5 \equiv 1 \pmod{11}$ . És clar que  $k$  ha de ser sempre un divisor de  $\phi(m)$ ; efectivament 5 divideix 10.

2) Hem de fixar-nos molt bé en el que s'afirma en una proposició. Per exemple algú podria caure en la temptació de pensar que si segons un mòdul  $m$  es compleix la congruència de Fermat, aquest mòdul és primer. Això seria un gran error perquè afirmaria la recíproca de la congruència de Fermat. I efectivament no és cert, ja que existeixen nombres compostos que la compleixen, i aquests nombres s'anomenen nombres de Carmichael. El més petit d'ells és  $m = 561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ , és a dir es compleix que si  $\text{mcd}(a, 561) = 1$ ,  $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$ .

**Problema 15.** Proveu que  $\sqrt{7}$  no és racional.

Aquest problema és equivalent a demostrar que l'equació  $x^2 = 7$  no té cap solució en nombres racionals.

Observeu que n'hi ha prou provant que no té cap solució racional positiva, ja que si un nombre és solució també ho és el seu oposat.

És clar que no en té cap d'entera. Demostrarem que no en té cap de fraccionària fent la demostració per reducció a l'absurd, que consisteix a suposar que té una solució i veure que s'arriba a una contradicció.

Suposem que  $\frac{p}{q}$  és el representant irreductible d'una solució de l'equació  $x^2 = 7$ , és a dir,  $\text{mcd}(p, q) = 1$  i  $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 7$ . D'aquí resulta  $\frac{p^2}{q^2} = 7$ , i  $p^2 = 7q^2$ . Com que 7 és primer i 7 divideix  $p^2$ , també 7 divideix  $p$ . Posant  $p = 7p'$  resulta  $7^2(p')^2 = 7q^2$ , i simplificant  $7p'^2 = q^2$ . Repetint el raonament, com que 7 és primer i divideix  $q^2$ , també divideix  $q$ , per tant 7 divideix  $p$  i  $q$  contra l'hipòtesi de ser  $\text{mcd}(p, q) = 1$ .

**Problema 16.** Sigui la successió 3, 7, 11, 15, ... Demostreu que en aquesta successió hi ha infinits nombres primers.

Aquest problema conté implícitament la afirmació que de nombres primers n'hi ha infinits, i això per ara no ho sabem, ja que podria ocórrer que a partir d'un nombre endavant tots els nombres naturals fossin compostos. Llavors el nostre problema no tindria sentit.

Aquesta pregunta se la van formular els grecs i Euclides en va donar una resposta afirmativa demostrant per reducció a l'absurd la següent

**Proposició.** La sèrie natural conté infinits primers.

La demostració és aquesta. Si només n'hi hagués un nombre finit hi hauria un primer  $p$  que seria el més gran. Formem el producte  $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdots p$  de tots els nombres primers i considerem el nombre

$$N = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdots p + 1$$

Com que  $N$  és més gran que 1 o és primer o descompon en producte de factors primers. No pot ser primer perquè tots els primers figuren en el producte  $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdots p$  i  $N$  és més gran que aquest producte, per tant més gran qualsevol dels factors. Sigui  $q$  un factor primer de  $N$ . Com que el producte  $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdots p$  conté tots els nombres primers,  $q$  ha de ser un d'ells. Per tant com que  $q$  divideix  $N$  i divideix  $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdots p$ ,  $q$  divideix 1, i això és una contradicció. D'aquí resulta que ha d'existir un primer  $q$  més gran que  $p$  i per tant, infinits.

Altres vegades hem enunciat una proposició i hem omès la demostració, però en aquest cas l'hem feta per veure com ens pot inspirar per resoldre el nostre problema. Observem que la proposició que hem demostrat la podríem enunciar de la forma equivalent:

*La progressió aritmètica de terme general  $2n + 1$  conté infinits nombres primers.* Per altra part observem que la successió del problema és una progressió aritmètica de primer terme 3 i raó 4 és a dir de terme general  $4n - 1$ ,  $n = 1, 2, \dots$

*Resolució del problema.* Procedim com abans per reducció l'absurd, és a dir, suposem que a partir d'un primer endavant tots els primers són de la forma  $4n + 1$ , ja que tot nombre imparell és de una de les dues formes  $4n - 1$  o  $4n + 1$ . Sigui  $p$  el primer més gran de la forma  $4n - 1$ . Seguint la demostració anterior formem un nombre  $N$  adequat

$$N = 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdots p - 1$$

on el producte  $3 \cdots (p - 1)$  conté tots els primers imparells menors o igual a  $p$ . Com que  $N$  és de la forma  $4n - 1$  i és més gran que  $p$  no pot ser primer; per tant descompondrà en producte de factors primers. Tot primer que divideix  $N$  ha de ser més gran que  $p$ , ja que si no dividiria  $N$  i el producte  $4 \cdot 3 \cdots p - 1$  i per tant dividiria 1, la qual cosa és absurda. Com que  $p$  és el més gran de la forma  $4n - 1$ , tot primer que divideixi a  $N$  ha de ser de

la forma  $4n + 1$  i per tant el seu producte  $N$  també de la forma  $4n + 1$  i això és fals tal com s'ha construït  $N$ .

Per tant la progressió aritmètica considerada conté infinits nombres primers.

Observem que en el raonament que acabem de fer hi entra d'una manera molt clara la forma particular de la progressió. Això ja ens fa pensar que potser en alguns altres casos particulars és podran fer raonaments anàlegs, però que en general, per qualsevol progressió aritmètica no.

Considerem per exemple la progressió 5, 8, 11, 14,... és a dir la de terme general  $4n + 1$ , que és la primera que ens salta a la vista. Seguim el raonament anterior i veiem que tot va bé fins que arribem a formar el producte de primers de la forma  $4n - 1$  ja que el producte d'un nombre parell d'ells és de la forma  $4n + 1$  i per tant no hi ha contradicció.

Intentem cercar un altre camí de demostració que, per aquest cas, veurem que també el tenim; es tracta de demostrar que donat un nombre natural qualsevol  $N > 1$  sempre existeix un primer de la forma  $4n + 1$  que és més gran que  $n$ . Per això utilitzarem la Congruència de Fermat.

Considerem un nombre natural  $N > 1$  i formem el nombre imparell

$$m = (N!)^2 + 1$$

Sigui  $p$  el factor primer més petit de  $m$ , que serà més gran que  $N$  ja que tot nombre menor o igual a  $N$  divideix  $N!$ . Com que  $p$  divideix  $m = (N!)^2 + 1$  serà  $(N!)^2 \equiv -1 \pmod{p}$ . Elevant els dos membres d'aquesta congruència al quadrat s'obté

$$(N!)^{p-1} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Com que  $p$  no divideix  $N!$  per la congruència de Fermat és

$$(N!)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Per tant de les dues congruències resulta  $(-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ . Si  $\frac{p-1}{2}$  fos imparell seria  $-1 \equiv 1 \pmod{p}$  és a dir  $p = 2$  la qual cosa no és possible perquè  $m$  és imparell. Per tant  $\frac{p-1}{2} = 2n$  és a dir  $p$  és de la forma  $4n + 1$  i per tant pertany a la progressió donada.

Per a algunes altres progressions aritmètiques particulars podríem trobar mètodes com aquests (o encara que un xic més difícils), que sense gaire esforç es poden arribar a entendre. Però queda la pregunta general:

## Aritmètica

*Tota progressió aritmètica conté infinits termes primers?* La resposta és afirmativa si en té un. És clar que si el primer terme i la raó de la progressió tenen algun factor comú, la progressió no té cap terme primer. Però pels altres casos és compleix el següent

**Teorema.** Si  $\text{mcd}(a, r) = 1$  la progressió aritmètica  $a + rn$   $n = 1, 2, \dots$  conté infinits nombres primers.

Aquest és un teorema molt important de l'aritmètica, i és de demostració molt difícil. Es necessiten mètodes analítics que van més enllà, però molt més enllà, del que es pot entendre a aquests nivells.

**Problema 17.** Determineu tots els triangles rectangles de costats enters.

Aquest problema és equivalent al problema aritmètic següent:

Trobeu totes les solucions enteres positives de l'equació

$$X^2 + Y^2 = Z^2.$$

Observeu en primer lloc que si tenim una solució  $(X_0, Y_0, Z_0)$ , qualsevol terna  $(\lambda X_0, \lambda Y_0, \lambda Z_0)$ , on  $\lambda$  és qualsevol nombre enter positiu, serà també solució; i si els tres membres de la terna tenen un divisor comú, s'obtindrà una altra solució dividint-los per aquest divisor comú. Per tant n'hi ha prou a cercar totes les solucions en les que  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  són primers entre si. Aquestes solucions s'anomenen primitives i a partir d'elles s'obtindran totes les altres multiplicant-les per tots els nombres naturals. També és clar per la forma de l'equació que, si els tres nombres  $X_0$ ,  $Y_0$ ,  $Z_0$  són primers entre si, també seran primers entre si dos a dos. Feta aquesta observació, passem a resoldre el problema. Com que  $Z$  ha de ser diferent de 0, podem dividir els dos membres per  $Z^2$  i s'obté l'equació

$$\left(\frac{X}{Z}\right)^2 + \left(\frac{Y}{Z}\right)^2 = 1$$

y posant  $\frac{X}{Z} = x$ ,  $\frac{Y}{Z} = y$  obtenim una equació de la forma

$$x^2 + y^2 = 1$$

que representa una circumferència de centre l'origen de coordenades i radi 1.

Si  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  són nombres enters  $Z \neq 0$ ,  $\frac{X}{Z}$ ,  $\frac{Y}{Z}$  seran nombres racionals, i per tant a les solucions del nostre problema els corresponen punts racionals de la circumferència.

Intentem doncs de resoldre aquest altre

**Problema 18.** Trobeu tots els punts de coordenades racionals de la circumferència d'equació  $x^2 + y^2 = 1$ .

Observeu en primer lloc que el punt  $A(-1, 0)$  pertany a la circumferència. Escriviu l'equació del feix de rectes que passen per aquest punt  $y = t(x + 1)$  on  $t$  és un paràmetre. Busqueu els punts d'intersecció de les rectes d'aquest feix amb la circumferència, resolent el sistema d'equacions amb les incògnites  $x, y$

$$\left. \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 1 \\ y = t(x + 1) \end{array} \right\}$$

Es té  $x^2 + t^2(x + 1)^2 = 1$ , o sigui  $x^2 - 1 + t^2(x + 1)^2 = 0$  i traient  $x + 1$  factor comú

$$(x + 1)(x - 1 + t^2(x + 1)) = 0$$

Una solució es troba fent  $x + 1 = 0$ , o sigui  $x = -1$ , que correspon al punt  $A(-1, 0)$  que pertany a la circumferència i a totes les rectes del feix. L'altra s'obté resolent l'equació  $x - 1 + t^2(x + 1) = 0$  o sigui  $x(1 + t^2) = 1 - t^2$  d'on resulta

$$x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad y = t(x + 1) = t \left( \frac{1 - t^2}{1 + t^2} + 1 \right) = \frac{2t}{1 + t^2}$$

A cada valor real de  $t$  correspondrà un punt de la circumferència i a cada punt de la circumferència menys  $A(-1, 0)$  que ja l'havíem trobat abans, un valor real de  $t$ .

Si  $x, y$  son nombres racionals diferents de  $-1$ ,  $t = \frac{y}{x + 1}$  serà un nombre racional, y si  $t$  és un nombre racional, pels resultats obtinguts  $x, y$  seran nombres racionals.

Suposeu  $t$  racional i sigui  $\frac{m}{n}$  el seu representant irreductible. Substituint  $t$  per aquest valor a les expressions obtingudes per  $x, y$  resulta:

$$x = \frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2}, \quad y = \frac{2mn}{n^2 + m^2}$$

Donant a  $m$  i  $n$  tots els parells de valors enters primers entre si obtindreu tots els punts racionals de la circumferència  $x^2 + y^2 = 1$  menys el punt  $A(-1, 0)$ .

Tornem al nostre problema:

Com que havíem posat  $\frac{X}{Z} = x, \frac{Y}{Z} = y$  serà

$$\frac{X}{Z} = \frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2}, \quad \frac{Y}{Z} = \frac{2mn}{n^2 + m^2}$$

i com que havíem suposat que  $\text{mcd}(X, Z) = 1, \text{mcd}(Y, Z) = 1$  ha de ser

$$n^2 - m^2 = \lambda X, \quad 2mn = \lambda Y, \quad n^2 + m^2 = \lambda Z$$

## Aritmètica

per a algun valor enter de  $\lambda$  que cal calcular:  $\lambda$  divideix  $n^2 - m^2$  i  $n^2 + m^2$  i per tant divideix la seva suma  $2n^2$  i la seva diferència  $2m^2$ , i per tant ha de dividir 2 ja que hem suposat  $m$  i  $n$  primers entre si. És a dir  $\lambda$  només pot ser 1 o 2. Anem a veure que no pot ser 2.

$X$ ,  $Y$  no poden ser a la vegada parells ni a la vegada imparells. El primer és clar ja que  $\text{mcd}(X, Y) = 1$ . Si fossin ambdós imparells, observant que el quadrat d'un nombre imparell és sempre congru amb 1 segons el mòdul 4, seria  $X^2 + Y^2 \equiv 2 \pmod{4}$  i  $Z^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$ . Per tant o bé  $X$  serà parell i  $Y$  imparell o al revés, però n'hi ha prou en considerar un dels dos casos ja que l'equació  $X^2 + Y^2 = Z^2$  és simètrica respecte les incògnites  $X$ ,  $Y$ . Suposem  $X$  parell i  $\lambda = 2$ .  $\lambda X$  seria divisible per 2 però no per 4 i  $n^2 - m^2 \equiv 2 \pmod{4}$ . Però  $m^2$  i  $n^2$  seran o un congru amb 0 i l'altre congru amb 1 segons el mòdul 4 o tots dos seran congrus amb 1 segons el mòdul 4. Per tant  $\lambda$  no pot ser 2; és a dir ha de ser  $\lambda = 1$ . Hem arribat així a la solució del problema:

Les longituds dels costats dels triangles rectangles primitius s'obtenen posant

$$X = n^2 - m^2, \quad Y = 2mn, \quad Z = n^2 + m^2$$

i donant a  $m$ ,  $n$  totes les parelles de valors naturals possibles primers entre si.

**Problema 19.** Trobeu totes les solucions amb nombres naturals de l'equació

$$x^3 + y^3 = 1729.$$

Si mireu un xic detingudament el nombre 1729, observareu sense gran esforç que

$$1729 = 1000 + 729 = 10^3 + 9^3 \quad \text{i també} \quad 1729 = 1 + 1728 = 1^3 + 12^3$$

per tant ja heu obtingut les quatre solucions

$$x = 10, y = 9; \quad x = 9, y = 10; \quad x = 1, y = 12; \quad x = 12, y = 1.$$

Però el problema ens les demana totes. N'hi ha d'altres? Anem a veure que són les úniques. Per això escrivim l'equació proposada d'una altra manera observant que

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2) \quad \text{i que} \quad 1729 = 7 \cdot 13 \cdot 19.$$

$$\text{i per tant} \quad (x + y)(x^2 - xy + y^2) = 7 \cdot 13 \cdot 17.$$



Ara es tracta d'igualar de totes les maneres possibles els factors del primer membre amb factors del segon membre, però per evitar-nos feina farem un raonament més general.

Posem

$$\left. \begin{array}{l} x + y = a \\ x^2 - xy + y^2 = b \end{array} \right\} \quad \text{amb} \quad ab = 1729 = 7 \cdot 13 \cdot 19$$

Resolem el sistema d'equacions aïllant  $x$  a la primera i substituint a la segona; després de fer operacions arribem a l'equació de segon grau

$$3x^2 - 3ax + a^2 - b = 0.$$

Per tant

$$x = \frac{3a \pm \sqrt{12b - 3a^2}}{6}$$

Mirem totes les condicions que han de satisfer  $a$  i  $b$ . Recordem que  $a \cdot b = 7 \cdot 13 \cdot 19$ ; a més a més ha de ser  $a > 1$ ,  $12b - 3a^2 \geq 0$  i quadrat d'un nombre enter. Amb aquestes condicions veureu tot seguit que els únics valors de  $a$  i  $b$  són  $a = 13$ ,  $b = 7 \cdot 19$ ;  $a = 19$ ,  $b = 7 \cdot 13$ ; a aquests valors corresponen els valors de  $x$ ,  $y$  que havíem obtingut al principi.

Per tant aquelles són les úniques solucions

## Problemes

**AR1.** Proveu que si els tres costats d'un triangle rectangle vénen expressats per tres nombres naturals en progressió aritmètica llavors el seu perímetre és múltiple de 12.

**AR2.** Els tres nombres naturals  $1652_{(n)}$ ,  $2012_{(n)}$ ,  $2042_{(n)}$  (escrits en base  $n$ ) estan en progressió aritmètica. Determineu la base  $n$  de numeració i la raó de la progressió.

**AR3.** Un nombre de tres xifres en base 10 s'escriu  $xyz$  en el sistema de base 7 i  $zyx$  en el sistema de base 9. Determineu aquest nombre escrit en base 10.

**AR4.** Proveu que l'única parella d'enters positius  $(a, b)$  per a la qual la suma coincideix amb el producte és la  $(2, 2)$ .

**AR5.** Proveu que només hi ha una parella d'enters positius  $(a, b)$  tal que  $a^b = b^a$  i trobeu-la.

### Aritmètica

**AR6.** Resoleu en el conjunt dels nombres naturals l'equació

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{16} = 1.4375.$$

**AR7.** En un nombre de tres xifres, la suma d'elles és 15, la xifra de les desenes és doble de la de les unitats, i la diferència entre el nombre i el que resulta d'invertir les xifres és 297. Determineu aquest nombre.

Discuti el problema en el cas general, és a dir si la suma de les xifres és  $s$  i la diferència que s'obté en invertir l'ordre de les seves xifres és  $d$ .

**AR8.** Trobeu els valors naturals de  $x$  per als quals  $x^2 + 5x + 160$  és un quadrat perfecte.

**AR9.** Determineu els enters  $N$  que contenen solament els factors 2 i 3 i tals que el nombre de divisors de  $N^2$  és triple del nombre de divisors de  $N$ .

**AR10.** Un nombre té 216 divisors, el seu doble té 270 divisors, la seva tercera part té 180 divisors i la seva cinquena part té 144 divisors. Trobeu aquest nombre amb la condició que sigui el més petit possible.

**AR11.** Trobeu un nombre de quatre xifres, quadrat perfecte, sabent que la suma de les seves xifres és igual a la suma de les xifres de la seva arrel quadrada. Determineu totes les solucions.

**AR12.** Demostreu que per a tot valor natural de  $n$ ,

$$3^{2n+2} + 2^{6n+1}$$

és múltiple de 11.

**AR13.** Una pila de boles de base rectangular té a la base  $m \cdot n$  boles i les altres capes es formen col·locant una bola en el forat que deixen les quatre boles de la capa anterior, i així successivament fins que s'arriba a una capa formada per una sola fila. Calculeu quantes boles té la pila sabent que  $m$  és el nombre de diagonals que té un decàgon i  $n$  és el menor nombre que dividit per 4 dóna residu 3, dividit per 5 dóna residu 4 i dividit per 6 dóna residu 5.

G. Pascual

- AR14. Determineu en quants zeros acaba 1000!
- AR15. Proveu que  $\pi(n) \geq \frac{\log n}{\log 4}$ , on  $\pi(n)$  és el nombre de primers que no sobrepassen el nombre natural  $n$ . (Teorema de Waclaw Sierpinski).
- AR16. Determineu  $x, y$  i  $z$  per tal que el nombre  $33xy49z$  (escrit en base 10) sigui múltiple de 693.
- AR17. Calculeu dos nombres de la forma  $aa, bbcc$  tals que
- $$aa = \sqrt{bbcc}.$$
- AR18. Calculeu l'enter més petit  $x$  pel qual  $x^2 + x + 41$  és compost.
- AR19. Demostreu que si dos nombres enters són de la mateixa paritat, la meitat de la suma dels seus quadrats és una suma de dos quadrats.
- AR20. a) Trobeu tots els enters positius  $n$  tals que  $2^n - 1$  és divisible per 7.  
b) Demostreu que no existeix cap enter positiu tal que  $2^n + 1$  és divisible per 7.
- AR21. Demostreu que si  $2^n - 1$  és primer, llavors  $n$  és primer.
- AR22. Demostreu
- a) Per tot  $n$  existeixen  $n$  nombres consecutius compostos.  
b) Per tot  $n$  existeixen  $n$  nombres consecutius tals que cap d'ells és la potència d'un primer.
- AR23. Determineu quina condició han de complir les xifres de les desenes de dos nombres acabats en 6 per tal que el seu producte acabi en 36.

### Aritmètica

**AR24.** Trobeu els nombres de quatre xifres que són iguals al quadrat de la suma del nombre format per les dues primeres xifres i el format per les dues darreres xifres.

**AR25.** Proveu que  $2^{2^n} + 2^{2^{n-1}} + 1$  no pot ser expressat com a producte de menys de  $n$  primers (no necessàriament diferents).

**AR26.** El nombre natural

$$3^n + 2 \cdot 17^n$$

no és quadrat perfecte per cap natural  $n$ .

**AR27.** La suma dels díigits de  $N = 4444^{4444}$  (escrit en notació decimal) és  $A$ . La suma dels díigits de  $A$  és  $B$  i la suma dels díigits de  $B$  és  $C$ . Calculeu  $C$ .

**AR28.** Siguin  $n, m$  nombres naturals qualssevol. Demostreu que

$$\frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!}$$

és un enter.

**AR29.** Demostreu que si  $a$  i  $b$  són enters positius, llavors, si

$$\frac{a^2 + b^2}{ab + 1}$$

és un enter, és un quadrat perfecte.

**AR30.** Un nombre natural és perfecte si és igual a la suma dels seus divisors menors que ell. Demostreu que si  $2^n - 1$  és primer llavors  $2^{n-1}(2^n - 1)$  és perfecte.

**AR31.** Proveu que si  $p$  és un nombre primer diferent de 2 i 5,  $p$  divideix infinits termes de la successió 9, 99, 999, 9999, ... Proveu el mateix per la successió 1, 11, 111, 1111, ...

**AR32.** Proveu que  $n^2 + 3n + 5$  no és mai divisible per 121.

**AR33.** Proveu que  $2222^{5555} + 5555^{2222}$  és divisible per 7.

G. Pascual

**AR34.** Proveu que si tots els coeficients de l'equació  $ax^2 + bx + c = 0$  són imparells, les arrels d'aquesta equació no poden ser racionals.

**AR35.** Proveu que tots els nombres de la forma 10001, 100010001, 1000100010001,...són compostos.

**AR36.** Trobeu totes les solucions en nombres enters de l'equació

$$x^2y^2 = 5x^2y + 20x + 16.$$

**AR37.** Si  $T_0 = 2$ ,  $T_{n+1} = T_n^2 - T_n + 1$ , proveu que  $\text{mcd}(T_n, T_m) = 1$ ,  $m \neq n$ .

**AR38.** Proveu que  $1^{1983} + 2^{1983} + \dots + 1986^{1983} \equiv 0 \pmod{1987}$ .

**AR39.** Si  $a, b, x, y$  són nombres naturals,  $\text{mcd}(a, b) = 1$  i  $x^a = y^b$ , proveu que existeix un nombre natural  $n$  tal que  $x = n^b$ ,  $y = n^a$ .

**AR40.** Trobeu totes les solucions en nombres naturals del sistema d'equacions

$$\left. \begin{aligned} a^3 - b^3 - c^3 &= 3abc \\ a^2 &= 2(b + c) \end{aligned} \right\}$$

**AR41.** Proveu que l'equació  $x^2 + y^2 = 3z^2$  només té en nombres enters la solució  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ . Com a conseqüència proveu que la circumferència  $x^2 + y^2 = 3$  no té cap punt de coordenades racionals.

**AR42.** Trobeu tots els punts de coordenades racionals de la circumferència  $x^2 + y^2 = 2$ .

**AR43.** Trobeu totes les solucions amb nombres enters de l'equació  $x^3 + y^3 = 793$ .

**AR44.** Proveu que si  $p$  és un nombre primer imparell, l'equació  $x^3 + y^3 = p$  o bé no té cap solució en nombres enters, o bé  $p$  és de la forma  $3n^2 + 3n + 1$ .

Mostra de solucions

Solució del problema AR4

La condició  $ab = a + b$  es pot escriure  $(a - 1)(b - 1) = 1$  que només té les solucions enteres  $a - 1 = 1, b - 1 = 1$  o bé  $a - 1 = -1, b - 1 = -1$ . La segona parella queda exclosa perquè dóna  $a = 0, b = 0$ . La primera dóna  $a = 2, b = 2$ .

Si  $a, b$  fossin racionals (o reals), l'equació tindria una infinitat de solucions

$$a = \frac{b}{b - 1}$$

on  $b$  és un racional (real) arbitrari diferent de 1.

Solució del problema AR5

Suposem  $a^b = b^a$  amb  $1 < a < b$  enters positius. Podem escriure  $b = a + n$  amb  $n \geq 1$  i queda  $b^a = a^b = a^{a+n} = a^a a^n$  d'on surt  $a^n = (b/a)^a$ . Si fem  $\lambda = b/a > 1$  queda  $b = \lambda a$  i  $n = b - a = a(\lambda - 1)$ . Substituint,  $a^{a(\lambda-1)} = \lambda^a$  o bé  $a^{\lambda-1} = \lambda$ , d'on, fent  $a = 1 + k$ , queda  $\lambda = (1 + k)^{\lambda-1}$  o bé

$$(\lambda - 1)(k - 1) + \binom{\lambda - 1}{2} k^2 + \dots + \binom{\lambda - 1}{\lambda - 1} k^{\lambda - 1} = 0.$$

En ser tots els termes no negatius, només s'anul·la l'expressió si tots són nuls. Tenim, doncs, que ha de ser  $k = 1$  o bé  $\lambda = 1$ . Aquest darrer cas ens dóna el cas trivial  $a = b$ .

Si  $k = 1$  queda  $a = 2$  i  $2^{\lambda-1} = \lambda$  que només es compleix per  $\lambda = 2$ , d'on  $b = 4$ .

Si suposem que  $a$  i  $b$  són racionals amb  $b > a$  podem posar

$$\frac{b}{a} = 1 + \frac{p}{q}$$

i la igualtat  $a^b = b^a$  queda  $a^{a(1+\frac{p}{q})} = (a(1+\frac{p}{q}))^a$  i substituint dóna lloc a

$$a = \left(1 + \frac{p}{q}\right)^{\frac{q}{p}} \quad b = \left(1 + \frac{p}{q}\right)^{\frac{p+q}{p}}$$

Per tal que  $a$  i  $b$  siguin racionals cal que tant  $q$  com  $p + q$  siguin, simultàniament, arrels  $p$ -èsimes exactes. Però això és impossible si  $p \neq 1$ . En efecte, si  $q$  no és arrel exacta, ja hem acabat. Si ho és, serà  $q = r^p$ ,  $r > 1$ . Queda

$$(r+1)^p = r^p + pr^{p-1} + \frac{p(p-1)}{2}r^{p-2} + \dots,$$

i com que  $r^p = q$ ,  $pr^{p-1} > p$  i els altres termes són no negatius, queda  $(r+1)^p > p+q$ , de forma que  $p+q$  queda entre dues potències consecutives d'exponent  $p$  i no pot ser potència entera exacta. En conclusió,  $p = 1$  i finalment

$$a = \left(1 + \frac{1}{q}\right)^q \quad b = \left(1 + \frac{1}{q}\right)^{q+1}.$$

Una simple comprovació demostra que aquests nombres compleixen l'equació.

### Solució del problema AR15

Siguin  $2, 3, \dots, p_{\pi(n)}$  els nombres primers que són més petits o iguals que  $n$ . Qualsevol natural  $m \leq n$  el podem escriure en la forma

$$m = m_1^2 \cdot 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdots p_{\pi(n)}^{a_{\pi(n)}}$$

on els  $a_i$  només poden prendre valors 0,1. Si donem valors 0,1 de totes les maneres possibles als  $a_i$  obtindrem tots els nombres més petits o iguals a  $n$  que són *lliures de quadrats*; el nombre total obtingut serà  $2^{\pi(n)}$ . Com que  $m_1^2 \leq m \leq n$ , serà  $m_1 \leq \sqrt{m} \leq \sqrt{n}$ . Si volem obtenir tots els nombres menors o iguals a  $n$  haurem de multiplicar els  $2^{\pi(n)}$  lliures de quadrats per tots els  $m_1$  que compleixin la condició  $m_1 \leq \sqrt{n}$ . Per tant, el nombre total de nombres més petits o iguals que  $n$ , que és  $n$ , ha de complir  $n \leq \sqrt{n} 2^{\pi(n)}$ . Fent operacions queda  $\sqrt{n} \leq 2^{\pi(n)}$  o bé, prenent logaritmes,  $\log n \leq \pi(n) \log 4$ , i d'aquí el resultat.

*Observació:* Com que el logaritme tendeix a infinit, deduïm que  $\pi(n)$  també ho fa, i demostrem altra vegada la infinitud dels primers. Però la fita inferior de l'enunciat és molt poc fina: per exemple,  $\pi(1000) = 168$  i  $\log 1000 / \log 4 = 4.983$ .

## Solució del problema AR25

Usarem la igualtat  $2^{2^n} = (2^{2^{n-1}})^2$  i la identitat  $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = x^4 + x^2 + 1$ .  
 Procedirem per inducció sobre  $n$ . Per a  $n = 1$  no hi ha res a demostrar. Suposant-ho cert per a  $n$ , tenim

$$2^{2^{n+1}} + 2^{2^n} + 1 = (2^{2^n} + 2^{2^{n-1}} + 1)(2^{2^n} - 2^{2^{n-1}} + 1)$$

i com que el primer factor s'expressa, per hipòtesi d'inducció, com a producte de  $n$  primers com a mínim, i el segon en té un com a mínim, resulta que en total n'hi ha  $n + 1$  com a mínim.



## ANÀLISI COMBINATÒRIA

Josep Pla i Carrera

### Dos principis bàsics de càlcul d'elements de conjunts

#### El principi additiu [PA]

Suposem que dues experiències excloents  $E_1$  i  $E_2$  tenen respectivament  $n_1$  i  $n_2$  resultats possibles. L'experiència  $E_1 \oplus E_2$  que consisteix en el fet que que s'hagi produït una d'ambdues experiències té  $n_1 + n_2$  resultats possibles.

En termes conjuntistes diríem: tenim dos conjunts disjunts finits  $A_1$ ,  $A_2$ , on  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ . Es tracta de calcular la quantitat d'elements —el *cardinal*— del conjunt  $A_1 \cup A_2$ , en el supòsit que coneixem els cardinals dels conjunts  $A_1$  i  $A_2$ . El PA estableix que

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2|, \text{ sempre que } A_1 \cap A_2 = \emptyset.$$

#### El principi multiplicatiu [PM]

Suposem que dues experiències  $E_1$  i  $E_2$  tenen, respectivament,  $n_1$  i  $n_2$  resultats possibles. Considerem l'experiència  $E$  formada per totes les *parelles ordenades* de resultats de les experiències  $E_1, E_2$ . L'experiència  $E$  consta de  $n_1 \times n_2$  resultats possibles.

En termes conjuntistes diríem: tenim dos conjunts finits  $A_1$  i  $A_2$  tals que  $|A_1| = n_1$ ,  $|A_2| = n_2$ . Considerem el *producte cartesià*

$$A_1 \times A_2 = \{(a_1, a_2) : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$$

dels conjunts  $A_1$  i  $A_2$ . El PM estableix que  $|A_1 \times A_2| = n_1 \times n_2$ .

### Un principi bàsic del conjunt $\mathbb{N}$ dels nombres naturals [PI]

Els nombres naturals es caracteritzen per dos fets notables:

- Tenen un primer element 1.
- Cada element  $n \in \mathbb{N}$  té un únic següent  $n + 1$ .

Però, a més, el conjunt  $\mathbb{N}$  compleix el *principi d'inducció* [PI], que estableix el següent:

Sigui  $A \subseteq \mathbb{N}$ , no buit, tal que

- (1)  $1 \in A$ , i
- (2) per a cada  $n \in A$ , podem provar que  $n + 1 \in A$ .

Aleshores  $A = \mathbb{N}$ .

Aquest principi el podem reescriure en els termes següents:

Sigui  $P(n)$  una propietat relativa als nombres naturals tal que

- (1)  $P(1)$  és certa, i
- (2) quan  $P(n)$  és certa, podem provar que  $P(n + 1)$  també ho és.

Aleshores  $P(n)$  és certa per a tot  $n \in \mathbb{N}$ .

La hipòtesi que fem quan suposem que la propietat  $P$  és certa per a un valor  $n$  és la *hipòtesi d'inducció*.

**Nota.** A vegades el primer element de la inducció és zero. Aleshores cal suposar que  $\mathbb{N}$  conté el zero. De vegades, la propietat  $P(n)$  és certa a partir d'un cert valor  $n_0$ . En aquests casos, hem de provar que

- (1)  $P(n_0)$  és certa,
- (2) per a cada  $n > n_0$ , si  $P(n)$  és certa, aleshores  $P(n + 1)$  també.

Aquesta mena de principis permeten establir molts i molts resultats importants, i són unes eines indispensables en l'anàlisi combinatòria. Abans, però de ficar-nos de ple en aquesta mena de qüestions, donarem sis exemples il·lustratius.

**Problema 1.** Per anar de Barcelona a Hostalric podem fer-ho amb tren o bé amb autobús. Suposem que solament hi ha tres maneres d'anar-hi amb tren i dues amb autobús. De quantes maneres diferents és possible anar de Barcelona a Hostalric?

D'acord amb el PA, tenim que

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| = n_1 + n_2 = 3 + 2 = 5,$$

on  $A_1$  és el conjunt d'itineraris de tren i  $A_2$  és el conjunt d'itineraris d'autobús.

**Problema 2.** Hem d'anar d'Hostalric a Barcelona i, per obres, és necessari fer un tros amb tren i un tros amb autobús. Hi ha tres itineraris possibles de tren i dos d'autobús. Quantes maneres diferents tenim per arribar a Barcelona?

D'acord amb el PM:  $|A_1 \times A_2| = 3 \cdot 2 = 6$ .

**Problema 3.** Si  $A_1, A_2, \dots, A_k$  són  $k$  conjunts disjunts dos a dos i  $|A_i| = n_i, i = 1, \dots, k$ , aleshores

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{k-1} \cup A_k| = n_1 + n_2 + \dots + n_{k-1} + n_k.$$

D'acord amb el PI hem d'establir:

- (1) La fórmula és vertadera per a  $k = 2$ , que és el PA.
- (2) Suposem que, si  $A_1, A_2, \dots, A_{k-1}, A_k$  són  $k$  conjunts disjunts dos a dos i  $|A_i| = n_i, i = 1, \dots, k$ , aleshores

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{k-1} \cup A_k| = n_1 + n_2 + \dots + n_{k-1} + n_k.$$

És a dir, suposem que la propietat  $P(n)$  és certa per a  $n = k$ . Ara hem de demostrar que, si  $A_1, A_2, \dots, A_k, A_{k+1}$  són  $k+1$  conjunts disjunts dos a dos i  $|A_i| = n_i, i = 1, \dots, k+1$ , aleshores

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}| = n_1 + n_2 + \dots + n_k + n_{k+1}.$$

Per provar-ho, fem  $B_1 = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$  i  $B_2 = A_{k+1}$ . Els conjunts  $B_1, B_2$  són disjunts:

$$\begin{aligned} B_1 \cap B_2 &= (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cap A_{k+1} = \\ &= (A_1 \cap A_{k+1}) \cup \dots \cup (A_k \cap A_{k+1}) = \emptyset, \end{aligned}$$

atès que els conjunts  $A_i, i = 1, \dots, k, k+1$ , són disjunts dos a dos.

Ara podem aplicar el PA als conjunts  $B_1$  i  $B_2$ :

$$|B_1 \cup B_2| = |B_1| + |B_2| = (n_1 + \dots + n_k) + n_{k+1}.$$

Per a determinar el cardinal  $|B_1|$  hem aplicat la hipòtesi d'inducció.

**Problema 4.** Quantes parelles ordenades  $(x, y)$  de nombres enters hi ha que compleixin la propietat  $x^2 + y^2 \leq 5$ ?

Sigui  $A = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x^2 + y^2 \leq 5\}$ . Fem  $A_i = \{(x, y) : x^2 + y^2 = i\}, i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ . Aleshores  $A_0 = \{(0, 0)\}, A_1 = \{(-1, 0), (1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$ , etc. Un cop ben caracteritzats els conjunts  $A_i, i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ , calculem  $|A_i|$ . Llavors podem aplicar el PA, atès que  $A = A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5$ , i que els conjunts  $A_i, i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ , són disjunts dos a dos. Per tant,

$$|A| = |A_0| + |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| + |A_5| = 1 + 4 + 4 + 0 + 4 + 8 = 21.$$

**Problema 5.** Trobeu tots els divisors positius possibles de 600, incloent-hi l'1 i el 600.

## Anàlisi combinatòria

Sabem que  $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ . Els seus divisors són de la forma

$$d = 2^i \cdot 3^j \cdot 5^k, \text{ on } 0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 1, 0 \leq k \leq 2.$$

Per tant hem de calcular  $|D|$ , on  $D = \{d \in \mathbb{N} : d \mid 600\}$ . Cal, doncs, trobar el nombre de ternes ordenades  $(i, j, k)$  que podem fer amb  $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ ,  $j \in \{0, 1\}$ ,  $k \in \{0, 1, 2\}$ . Pel PM resulta que  $|D| = 4 \cdot 2 \cdot 3 = 24$ .

**Problema 6.** Sabem que el valor  $Q_n$  de la suma  $1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2 + n^2$  dels quadrats dels  $n$  primers nombres naturals val  $\frac{(2n+1)n(n+1)}{6}$ .

Una manera de provar-ho és aplicant el principi d'inducció. D'entrada hem de calcular

$$Q_1 = 1^2 = 1 \text{ i } \frac{(2 \cdot 1 + 1) \cdot 1 \cdot (1 + 1)}{6} = 1.$$

Coincideixen.

Seguidament, suposem que  $Q_n = 1^2 + \dots + n^2 = \frac{(2n+1)n(n+1)}{6}$ . És la hipòtesi d'inducció.

Ara hem de demostrar, basant-nos en la hipòtesi d'inducció, que

$$Q_{n+1} = \frac{(2(n+1)+1)(n+1)((n+1)+1)}{6}.$$

Però,

$$Q_{n+1} = Q_n + (n+1)^2 = \frac{(2n+1)n(n+1)}{6} + (n+1)^2.$$

Només cal fer els càlculs pertinents.

## Figures combinatòries

### Nombre de parts d'un conjunt $A$

Sigui  $A$  un conjunt amb  $m$  elements. El nombre de parts o de subconjunts de  $A$ , és a dir, el nombre d'elements del conjunt  $\mathcal{P}(A)$ , és  $2^m$ . (Indicació: Recordem que  $\emptyset$  i  $A$  són subconjunts del conjunt  $A$ .)

### Permutacions de $m$ elements

Una permutació de  $m$  objectes és el resultat de col·locar els  $m$  objectes en  $m$  llocs (o cel·les o també caselles) de manera que cada lloc contingui solament un objecte.

Tenim, doncs,  $m$  objectes  $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$  en  $m$  cel·les. A la primera cella n'hi podem col·locar  $m$ , a la segona, només  $m - 1$ , atès que ja n'hi ha un a la primera cella i no el podem repetir, etc. Pel PM, resulta que el nombre  $P_m$  de permutacions de  $m$  objectes és

$$P_m = m(m-1) \cdots 2 \cdot 1 = m!$$

*Nota.*  $m!$  es llegeix *factorial* de  $m$ , o bé *m factorial*. Per conveni,  $0! = 1$ .

Fixem-nos que una *permutació* de  $m$  elements és una *filera* o *paraula* feta amb els  $m$  objectes sense repetir-ne cap.

#### *Variacions de m elements presos de k en k*

Suposem ara que tenim  $m$  objectes, però solament disposem de  $k$  cel·les, amb  $k \leq m$ . Cada una de les diferents maneres de col·locar  $k$  dels  $m$  objectes, sense repetir-ne cap, en les  $k$  cel·les és una *variació de m elements presos de k en k*. Dues variacions amb els mateixos objectes però col·locats de maneres diferents, són diferents.

Com abans, és clar que el nombre  $V_m^k$  de variacions de  $m$  elements presos de  $k$  en  $k$  és

$$V_m^k = m(m-1) \cdots (m-k+1) = \frac{m!}{(m-k)!}.$$

És clar que  $V_m^m = P_m$  i  $V_m^0 = 1$ , atès que  $0! = 1$ .

Una *variació de m elements presos de k en k* és una *filera* o *paraula* feta amb  $k$  objectes diferents dels  $m$  de què disposem.

#### *Combinacions de m elements presos de k en k*

Una *combinació de m elements presos de k en k* és una tria de  $k$  elements dels  $m$  donats.

És evident que ha de ser  $k \leq m$ .

Això fa que dues variacions de  $m$  objectes presos de  $k$  en  $k$ , amb els mateixos  $k$  elements, però col·locats de manera diferent, donin la mateixa combinació. I de variacions diferents que donen una mateixa combinació n'hi ha exactament  $k!$ . Per tant,

$$C_m^k = \binom{m}{k} = \frac{1}{k!} V_m^k = \frac{m!}{k!(m-k)!}.$$

## Anàlisi combinatòria

Els nombres  $\binom{m}{k}$  s'anomenen *nombres combinatoris* i tenen propietats molt notables. A tall d'exemple en posem algunes.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n.$$

El desenvolupament del *binomi de Newton* conté nombres combinatoris.

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n-2} a^2 b^{n-2} + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

Podem escriure aquesta fórmula en forma abreujada

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i.$$

### Variacions circulars relatives

Una *variació circular relativa* de  $m$  objectes presos de  $k$  en  $k$  és una col·locació arbitrària al voltant d'una taula rodona de  $k$  objectes triats d'entre  $m$ , tenint en compte que només cal fixar-se en la posició relativa del objectes entre ells, però no en relació a la taula.

Per veure-ho, suposem que  $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$  és un conjunt de  $m = 4$  elements i que  $k = 3$ . Aleshores  $V_4^3 = 24$ . Ara bé, aquestes vint-i-quatre variacions les podem dividir en 8 grups que són indistingibles per *rotació circular*.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
$\alpha\beta\gamma$	$\alpha\beta\delta$	$\alpha\gamma\delta$	$\beta\gamma\delta$	$\alpha\gamma\beta$	$\alpha\delta\beta$	$\alpha\delta\gamma$	$\beta\delta\gamma$
$\gamma\alpha\beta$	$\delta\alpha\beta$	$\delta\alpha\gamma$	$\delta\beta\gamma$	$\beta\alpha\gamma$	$\beta\alpha\delta$	$\gamma\alpha\delta$	$\gamma\beta\delta$
$\beta\gamma\alpha$	$\beta\delta\alpha$	$\gamma\delta\alpha$	$\gamma\delta\beta$	$\gamma\beta\alpha$	$\delta\beta\alpha$	$\delta\gamma\alpha$	$\delta\gamma\beta$

És a dir, cada tres variacions dels elements de  $A$  presos de tres en tres donen una mateixa variació circular. Per tant,  $Q_4^3 = \frac{1}{3} V_4^3 = 8$ .

En general, doncs:  $Q_m^k = \frac{1}{k} V_m^k$ .

*Variacions amb repetició de  $m$  objectes presos de  $k$  en  $k$*

Ara, a diferència de les variacions introduïdes abans en les quals un cop col·locat un objecte en un lloc no era possible col·locar-lo en cap altre lloc, això ho podem fer. Cal, és clar, que disposem de prou còpies de cada objecte. Això fa que, a l'hora de col·locar l'objecte següent, estiguem en les mateixes condicions que abans de col·locar-lo. Hi ha independència de les accions efectuades.

Una *variació amb repetició de  $m$  objectes presos de  $k$  en  $k$*  s'obté quan es col·loquen  $k$  còpies d'alguns dels objectes d'un conjunt de  $m$  objectes diferents, en  $k$  cel·les de manera que cada cel·la només contingui un objecte.

És clar que el nombre  $\mathbf{VR}_m^k$  de variacions amb repetició de  $m$  objectes presos de  $k$  en  $k$  és  $\mathbf{VR}_m^k = m^k$ .

*Permutacions amb repetició de  $m$  objectes*

Disposem de  $m$  objectes dels quals  $k$  són iguals entre si i  $(m - k)$  també són iguals entre si. Si els permutem de totes les maneres possibles, tindrem  $m!$  casos, però no pas tots seran diferents, atès que les permutacions entre si dels  $k$  objectes que són indistingibles dona una mateixa permutació. Això fa que, de fet, només en poguem distingir, com a màxim,  $\frac{m!}{k!}$ . Ara bé, el mateix passa amb les permutacions dels  $(m - k)$  objectes indistingibles. Per tant, en total

$$\mathbf{PR}_m^k = \frac{m!}{k!(m-k)!} = \binom{m}{k} = \mathbf{C}_m^k.$$

En general, si tenim  $m$  objectes, però n'hi ha  $k_1$  d'indistingibles,  $k_2$  d'indistingibles, ...,  $k_r$  d'indistingibles, amb  $k_1 + k_2 + \dots + k_r = m$ , aleshores, quan els permutem, tenim les *permutacions amb repetició de  $m$  objectes amb  $k_1, k_2, \dots, k_r$  de repetits*. El nombre  $\mathbf{PR}_m^{k_1, \dots, k_r}$  de permutacions amb repetició de  $m$  objectes amb  $k_1, k_2, \dots, k_r$  de repetits és:

$$\mathbf{PR}_m^{k_1, \dots, k_r} = \frac{m!}{k_1! \dots k_r!}.$$

*Combinacions amb repetició de  $m$  objectes*

Donats  $m$  objectes dels quals en tenim tantes còpies com faci falta, una *combinació amb repetició de  $m$  objectes presos de  $k$  en  $k$*  és qualsevol tria de  $k$  còpies d'entre els  $m$  tipus d'objectes diferents.

Per tal de calcular el nombre  $\mathbf{CR}_m^k$  analitzarem un cas particular. Tenim una pila d'objectes de 4 tipus. Cada objecte pot ser de tipus 1, 2, 3, 4 i en volem triar 3. En

### Anàlisi combinatòria

aquest cas,  $m = 4, k = 3$ . Per representar cada tria disposem de *quatre cel·les* o *caselles* separades entre elles per una paret i numerades de 1 a 4, i 3 boles iguals. Colloquem a cada cel·la tantes boles com objectes d'aquell tipus hi hagi a la tria feta. És a dir,

tries		cel·les					representació
		1	2	3	4		
111	→	•••				→	•••
112	→	••	•			→	••   •
113	→	••		•		→	••     •
114	→	••			•	→	••       •
122	→	•	••			→	•   ••
123	→	•	•	•		→	•   •   •
124	→	•	•		•	→	•   •     •
133	→	•		••		→	•     ••
134	→	•		•	•	→	•     •   •
144	→	•			••	→	•       ••
222	→		•••			→	•••
223	→		••	•		→	••   •
224	→		••		•	→	••     •
233	→		•	••		→	•   ••
234	→		•	•	•	→	•   •   •
244	→		•		••	→	•     ••
333	→			•••		→	•••
334	→			••	•	→	••   •
344	→			•	••	→	•   ••
444	→				•••	→	•••

Tal com indica la darrera columna de la taula, podem identificar cada tria amb una seqüència de tres boles i tres barres, corresponents a les boles i als separadors, i fet de totes les maneres possibles; i d'aquestes n'hi ha tantes com les permutacions amb repetició de 6 elements amb 3 i 3 repetits. És a dir,

$$CR_4^3 = PR_{(4-1)+3}^3 = C_6^3 = \binom{6}{3}.$$

En general, tindrem un conjunt prou gran d'objectes, cada un de tipus de 1 a  $m$  i n'haurem de triar  $k$ ; seguint amb l'exemple anterior, necessitariem  $m$  cel·les (per tant, amb  $m - 1$  separadors) per a col·locar-hi  $k$  boles, posant a cada cel·la tantes boles com objectes d'aquell



tipus hi hagi a la tria. D'aquesta manera podem identificar cada tria amb una successió de  $k$  boles i  $m - 1$  separadors. Per tant,

$$CR_m^k = PR_{m+k-1}^k = C_{m-1+k}^k = \binom{m+k-1}{k}.$$

*Distribucions de  $k$  objectes diferents en  $n$  capsos diferents*

(1) Cada capsa pot contenir, *com a màxim*, un objecte. Aleshores ha de ser  $k \leq n$ . Com que tots els objectes s'han de col·locar, el nombre de maneres de distribuir-los és el de variacions de  $n$  caixes preses de  $k$  en  $k$ , és a dir,  $V_n^k$ .

(2) Cada capsa pot contenir *qualsevol nombre* d'objectes. Aleshores el nombre de maneres de distribuir-los és el de variacions amb repetició de  $n$  capsos preses de  $k$  en  $k$ , és a dir,  $VR_n^k$ .

(3) Cada capsa pot contenir qualsevol nombre d'objectes, però l'ordre dins de cada capsa és rellevant. Aleshores el nombre de casos és  $\frac{(n-1+k)!}{(n-1)!}$ .

*Distribucions de  $k$  objectes idèntics en  $n$  capsos diferents*

(1) Si cada capsa pot contenir, *com a màxim*, un objecte, aleshores ha de ser  $k \leq n$  i el nombre de maneres de distribuir-los és el de combinacions de  $n$  capsos preses de  $k$  en  $k$ , és a dir,  $\binom{n}{k}$ .

(2) Si cada capsa pot contenir qualsevol nombre d'objectes, aleshores el nombre de maneres de distribuir-los és el de combinacions amb repetició de  $n$  capsos preses de  $k$  en  $k$ , és a dir  $CR_n^k$ .

**Problemes**

**AC1.** Sigui  $N = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$ , on  $p_1, p_2, \dots, p_r$  són nombres primers, i  $D$  el conjunt dels divisors positius de  $N$ . Llavors  $|D| = (k_1 + 1)(k_2 + 1) \dots (k_r + 1)$ .

(És un simple exercici d'aplicació del principi multiplicatiu).

**AC2.** Proveu, per inducció, que el nombre de subconjunts d'un conjunt  $A$ , de cardinal  $m$ , inclosos el conjunt buit i  $A$ , té cardinal  $2^m$ .

## Anàlisi combinatòria

**AC3.** Proveu, per inducció, que si un conjunt  $A$  té  $m$  elements, el conjunt d'aplicacions de  $A$  en el conjunt  $\mathbf{2} = \{0, 1\}$ , en té  $2^m$ .

Sabríeu provar-ho d'una altra manera?

**AC4.** Useu el PM per provar que el nombre de tirallongues de  $n$  nombres naturals agafats del conjunt  $A = \{1, 2, \dots, k\}$  és igual a  $k^n$ .

**AC5.** El menú turístic d'un restaurant és:

Elegiu un dels entrants:

Sopa, Suc de fruita, Cocktail de marisc.

Elegiu un dels següents plats de vianda:

Bistec

Roast Beaf

Pollastre rostit

Mandonguilles amb espaguetti

Elegiu un dels següents acompanyaments:

Patates fregides

Tomàquet a la grega

Pèsols saltejats

Elegiu una d'aquestes postres:

Fruita, Gelat, Formatge.

Elegiu:

Café o Té.

Quants menjars diferents hi pot fer un turista? Quin dia podrà tornar a casa seva si el primer dinar el fa el 28 de febrer de 1993, suposant que els vol tastar tots i només hi dina?

**AC6.** Llançem 6 daus indistingibles. Quants resultats diferents podem observar? I si els daus són distingibles?

**AC7.** Considerem totes les  $VR_4^2$  del conjunt  $\{1, 2, 3, 4\}$  i totes les  $V_4^2$ . Quants elements cal eliminar de les primeres per tal d'aconseguir  $CR_4^2$ ? I quines hem d'eliminar de les segones per obtenir  $C_4^2$ ?

**AC8.** (i) Quatre persones volen jugar simultàniament partits individuals de tennis i disposen de dues pistes. De quantes maneres podem distribuir-los, si no tenim en compte l'elecció de pista? De quantes maneres, si es té en compte la pista on juga cada parella?

(ii) De quantes maneres podem situar  $m$  persones en  $r$  llocs diferents si volem que  $m_1, m_2, \dots, m_r$  es colloquin respectivament al lloc  $1, 2, \dots, r$ ? ( $m_1 + m_2 + \dots + m_r = m$ ).

**AC9.** Sis muntanyencs s'han de dividir en 3 grups de dos cada un per tal de fer l'assalt final. De quantes maneres poden fer-ho? I si els grups consten d'1, 2 i 3 persones?

Si ara cal ordenar-los en primer, segon i tercer grup d'assalt, de quantes maneres ho podrem fer?

**AC10.** Proveu que

$$\binom{m}{n} = \binom{m-1}{n-1} + \binom{m-1}{n};$$

$$\binom{m}{n} = \binom{m-1}{n-1} + \binom{m-2}{n-1} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n-1}{n-1}.$$

**AC11.** Proveu que

$$\binom{m}{n} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \cdot \binom{m-k}{n-j}$$

i calculeu  $\binom{7}{3}$  i  $\binom{7}{5}$  fent servir el triangle aritmètic fins a la fila 5.

**AC12.** De quantes maneres podem posar  $n$  boles en  $n$  capses numerades de forma que quedi buida exactament una capsa? (Indicació: Separeu el cas distingible del cas indistingible.)

**AC13.** Una noia vol regalar al seu xicot una camisa o una corbata pel seu aniversari. Però solament pot triar entre 3 camises i 2 corbates. Quantes tries diferents pot fer? I si vol comprar alhora una camisa i una corbata?

**AC14.** En una botiga hi ha tres menes de camises per vendre

(a) Si dos homes compren una camisa cada un, de quantes maneres diferents poden fer-ho?

(b) Si un home compra dues camises, de quantes maneres pot triar-les?

## Anàlisi combinatòria

- AC15.** Quantes inicials diferents podem fer amb dues o tres lletres de l'alfabet?  
Quantes lletres hauria de tenir un alfabet per tal que un milió de persones diferents es pogués identificar amb inicials de dues o tres lletres?
- AC16.** De quantes maneres es poden aparellar 4 nois i 4 noies? De quantes maneres es poden col·locar en una fila de manera que s'alternin persones de sexe diferent?
- AC17.** De quantes maneres podem triar un comitè de tres persones d'un grup de 20? I de quantes si cal que una sigui el president, l'altre el vicepresident i la tercera secretari?
- AC18.** Si tenim dues monedes de 50 pta, dues de 25 pta i tres duros, quantes sumes diferents podem aconseguir? Si canviem una de les monedes de 25 pta en duros, quantes sumes diferents podrem aconseguir?
- AC19.** Deu llibres es col·loquen en dues piles. De quantes maneres podem fer-ho si els llibres són indistingibles? I si són distingibles? I si les piles són distingibles o indistingibles? Analitzeu els 4 casos.
- AC20.** Repartim deu llibres diferents entre en Daniel, en Felip, en Pau i en Joan de manera que s'enduen respectivament lots de 3, 3, 2 i 2 llibres. De quantes maneres podem fer-ho?  
En Pau i en Joan no estan d'acord amb aquest repartiment i es decideix repartir els lots entre ells de manera que cada un tingui un lot. De quantes maneres podem fer ara el repartiment? Ara la Maria i la Cori volen també tenir dret a aconseguir llibres. Es decideix repartir els lots entre tots sis de forma que hi haurà dues persones que no obtindran cap lot. De quantes maneres podem fer això?
- AC21.** Considereu el conjunt  $A = \{1, 2, \dots, 100\}$  i sigui
- $$S = \{(a, b, c) : a, b, c \in A, a < b \text{ i } a < c\}.$$
- Trobeu  $|S|$ .
- AC22.** Proveu, per inducció, que  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ . Sabríeu demostrar-ho d'alguna altra manera?

**AC23.** Trobeu les identitats que expressen, en funció de  $n$ , els valors de  
 (a)  $1 + 2 + \dots + n$ , (b)  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ , i (c)  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3$ .

Fixeu-vos en la diferència que hi ha entre trobar una expressió i provar-ne la validesa, un cop trobada.

**AC24.** De quantes maneres podem fer la tria d'una parella  $\{a, b\}$  de nombres diferents del conjunt  $A = \{1, 2, \dots, 50\}$ , si volem que

(a)  $|a - b| = 5$ ,

(b)  $|a - b| \leq 5$ .

**AC25.** *Principi additiu general* [PAG]: Si  $A, B$  són dos conjunts finits, aleshores  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ . Proveu-ho.

**AC26.** Proveu que el nombre de *bijeccions* que podem fer entre el conjunt  $m = \{1, 2, \dots, m\}$  i un conjunt  $A$  amb  $m$  elements coincideix amb el nombre de permutacions de  $m$  elements.

**AC27.** Suposem que volem col·locar  $m$  objectes en  $m$  cadires que es troben al voltant d'una taula rodona i que les cadires estan numerades amb els números  $1, 2, \dots, m - 1, m$ .

Proveu que les maneres de fer-ho és  $m!$ . *Nota:* Les cadires són distingibles.

Què passaria, si les cadires no fossin distingibles?

**AC28.** Siguin  $A, B$  dos conjunts i suposem que  $|A| = k, |B| = m, k \leq m$ . Quantes *injeccions* podem fer de  $A$  en  $B$ ?

**AC29.** (a) Tenim 4 fitxes marcades amb les lletres  $a, b, c, d$ . Quantes paraules de tres lletres podem fer?

(b) Quantes paraules de tres lletres podem fer amb les lletres  $a, b, c, d$ ?

(c) Tenim 9 fitxes numerades de l'1 al 9. Quants nombres de 4 xifres podem fer?

(d) Quants nombres de 4 xifres podem fer usant només els nombres  $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ ?

**AC30.** Sigui  $A = \{a, b, c, \dots, x, y, z\}$  el conjunt de les 26 lletres de l'alfabet català. Quin és el nombre de paraules de 5 lletres que podem fer amb les lletres de  $A$ , si volem que la primera i la darrera siguin vocals i les altres tres consonants?

### Anàlisi combinatòria

**AC31.** En una festa hi ha 7 nois i 3 noies. De quantes maneres podem posar-los en fila, si volem que

(a) les noies formin un bloc, (b) les dues posicions finals estiguin ocupades per nois i que cap noia no estigui al costat d'una altra noia?

**AC32.** Entre 20.000 i 70.000, quants nombres parells hi ha que no tinguin cap dígit repetit?

**AC33.** Sigui  $A$  el conjunt dels nombres naturals els díigits dels quals són  $\{1, 3, 5, 7\}$  sense que n'hi hagi cap de repetit. Calculeu:

(a) el cardinal del conjunt  $A$ ;

(b) el nombre  $S = \sum_{m \in A} m$ .

**AC34.** (a) Proveu que tot nombre combinatori és un nombre natural. Sabríeu demostrar-ho per inducció?

(b) Proveu que, si  $p$  és un nombre primer i  $1 \leq k < p$ , aleshores  $\binom{p}{k}$  és un múltiple de  $p$ .

(c) Què passa quan  $p$  no és un nombre primer? [Indicació: Feu unes quantes fileres del triangle aritmètic.]

**AC35.** Proveu que  $\binom{m}{k}$  és el nombre de subconjunts de  $k$  elements d'un conjunt  $A$  de  $m$  elements. Deduïu-ne que

$$\binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \binom{m}{2} + \cdots + \binom{m}{m-1} + \binom{m}{m} = 2^m.$$

**AC36.** Fem tirallongues de 0 i 1 de llargada 7. Quantes n'hi ha que tinguin 3 zeros i 4 uns? Deduïu-ne que  $\binom{m}{k} = \binom{m}{m-k}$ .

**AC37.** De quantes maneres podem fer un comitè de 5 persones d'un col·lectiu de 11 de les quals 4 són noies i 7 són nois, si volem que

(a) el comitè tingui exactament dues noies?

(b) el comitè tingui almenys 3 noies?

(c) el comitè contingui una noia i un noi concrets?

AC38. (a) De quantes maneres diferents podem formar tres equips de futbol amb 33 nois?

(b) Si  $|A| = 2n, n \geq 1$ , quantes parelles d'elements de  $A$  podem fer?

(c) Generalitzeu aquest problema. Proveu que el nombre de  $k$ -agrupacions diferents d'elements de  $A$ , amb  $|A| = nk$  és precisament  $\frac{(nk)!}{n!(k!)^n}$ .

### Mostra de solucions

#### Solució del problema AC14

Suposem que dos homes compren una camisa cada un. El primer home pot comprar una camisa d'un dels tres tipus que hi ha. El segon home també. Per tant hi ha  $3 \times 3 = 9$  maneres de fer-ho. També es pot interpretar que es tracta de  $VR_3^2$ .

Si un home compra dues camises, l'ordre com les tria no és rellevant per al resultat final de la compra. Com que els tipus de camises es poden repetir, tindrem  $CR_3^2 = \binom{3+2-1}{2} = 6$  maneres de fer-ho.

#### Solució del problema AC18

És un problema de comptes de la vella, és a dir, cal comptar sense equivocar-se ni deixar-se cap cas, ni repetir-ne cap.

$D$ (duros)	$D+25$	$D+2 \cdot 25$ $(D+50)$	$D+25+50$	$D+2 \cdot 25+50$ $(D+2 \cdot 50)$	$D+2 \cdot 50$ +25	$D+2 \cdot 50$ +2 \cdot 25
	25	50	75	100	125	150
5	30	55	80	105	130	155
10	35	60	85	110	135	160
15	40	65	90	115	140	165.

L'altre cas es deixa per al lector.

#### Solució del problema AC19

a) Llibres indistingibles i piles distingibles. Els deu llibres es poden col·locar a les piles en les formes  $(0, 10), (1, 9), \dots, (9, 1)$  i  $(10, 0)$ . En total hi ha 11 maneres de fer-ho.

b) Llibres indistingibles i piles indistingibles. Les piles dels cas anterior  $(0, 10)$  i  $(10, 0)$  són indistingibles. També ho són les  $(1, 9)$  i  $(9, 1)$ , etc. fins a les  $(4, 6)$  i  $(6, 4)$ . L'apilament  $(5, 5)$  no té parella. En total els apilaments es poden fer de 6 maneres.

### Anàlisi combinatòria

c) Llibres distingibles i piles distingibles. Primer permutem els llibres de totes les maneres possibles, que seran  $10!$ . Fixada una permutació concreta dels llibres, apilem-los tal com hem fet al cas a). Tindrem en total  $11 \times 10!$  maneres en total.

d) Llibres distingibles i piles indistingibles. Es raona com al cas anterior formant les  $10!$  permutacions de llibres, i apilant-los després segons b). En total hi haurà  $6 \times 10!$  casos.

#### Solució del problema AC30

A l'alfabet de 26 lletres hi ha 5 vocals i 21 consonants. Podem fixar les vocals de  $VR_5^2 = 5^2$  maneres diferents, i les consonants de  $VR_{21}^3 = 21^3$  maneres diferents. En total tindrem  $5^2 21^3$  paraules.

#### Solució del problema AC31

a) Considerem les tres noies com un bloc. Les noies, en aquest bloc, poden col·locar-se de  $3!$  maneres diferents. Si marquem amb números les posicions dels nois, i amb  $\bullet$  els llocs inicial, final i intermedis, tindrem

$$\bullet 1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 \bullet$$

i el bloc de noies ha d'ocupar una de les posicions marcades per  $\bullet$ . En total tindrem, doncs,  $8 \times 3! 7!$  col·locacions possibles.

b) Si marquem, com abans, les posicions dels nois amb números, cada una de les noies pot ocupar una posició  $\bullet$  a

$$1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7$$

i haurem de triar 3  $\bullet$  d'entre els 6 que hi ha. Com que les noies es poden permutar i els nois també, tindrem  $C_6^3 P_3 P_7 = V_6^3 P_7$  possibilitats.



## EL PRINCIPI DE LES CASELLES

Josep Pla i Carrera

### El principi de Dirichlet

La idea del principi és molt senzilla: si hem de col·locar tres coloms en dues caselles, necessàriament dos coloms han de compartir una mateixa casella.

*El principi de les caselles (o del colomar) [PC]*

*Enunciat 1:*

Siguin  $k$  i  $n$  dos enters positius. Si almenys  $kn + 1$  objectes es distribueixen entre  $n$  compartiments, aleshores almenys un dels compartiments contindrà  $k + 1$  objectes.

*Enunciat 2:*

Si  $N$  objectes s'han de distribuir entre  $k$  cel·les o caselles, aleshores una almenys de les cel·les conté un nombre d'objectes que és més gran o igual que  $\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil + 1$ , en el cas que  $k$  no divideixi  $N$ . Si  $k$  divideix  $N$ , el nombre d'objectes és més gran o igual que  $\frac{N}{k}$ .

En particular, si  $n + 1$  objectes es reparteixen entre  $n$  cel·les o caselles, aleshores una almenys conté dos objectes.

Aquest principi es coneix també amb el nom de *principi de Dirichlet* [DIRICHLET, P. G. LEJEUNE [1805–1859]]. En anglès es parla habitualment del *drawer principle* o, molt més sovint, del *pigeon-hole principle*, on el mot “pigeon-hole” equival a una casella d'un moble subdividit en cel·les per tal de col·locar-hi cartes, documents o altres objectes, i classificar-los (en castellà, “casillero”). Però l'ús reiterat porta a parlar de “pigeons i de “holes” separadament, fent-los servir com a primer exemple del principi. Tot això condueix a la denominació pintoresca de “colomar”.

## El principi de les caselles

**Problema 1.** *Quantes persones cal reunir per tal d'assegurar que n'hi ha dues que tenen nom amb la mateixa inicial?*

El conjunt de "caselles" és el conjunt de lletres de l'alfabet, suposem que són 26. Si tenim 27 persones i les "colloquem" a les caselles, n'hi ha dues a la mateixa, i per tant tenen el nom amb la mateixa inicial. Si només hi hagués 26 persones, podria donar-se el cas que totes tinguessin inicials diferents.

**Problema 2.** *Quantes persones cal reunir per tal d'assegurar que n'hi ha sis que tenen nom amb la mateixa inicial?*

El conjunt de "caselles" és com abans el conjunt de les 26 lletres de l'alfabet. Si tenim  $26 \times 5 + 1 = 131$  persones podem assegurar que al menys 6 d'elles tenen la mateixa inicial. Amb només 130 persones això no es podria assegurar, ja que podria haver-n'hi 5 de cada lletra.

**Problema 3.** *En una classe hi ha estudiants dels dos sexes, de tres pobles i que practiquen cinc esports. Quants n'hem de reunir per tal d'assegurar que n'hi ha dos del mateix sexe, del mateix poble i que practiquen el mateix esport?*

Assignem a cada estudiant una terna  $xyz$  on  $x$  pot ser  $H$  home o  $D$  dona,  $y$  pot ser  $P_1, P_2, P_3$ , segons el poble d'origen, i  $z$  pot ser  $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5$ , segons l'esport practicat. El conjunt de *totes les ternes possibles* té  $2 \times 3 \times 5 = 30$  elements. Si tenim 31 estudiants, és segur que n'hi ha 2 als quals els correspon la mateixa terna, és a dir, són del mateix sexe, del mateix poble i practiquen el mateix esport. Si només tinguéssim 30 estudiants, *podria donar-se el cas* que tots tinguessin ternes diferents, i dos a dos tindrien sempre algun atribut diferent.

*Observació:* Malgrat la seva aparença trivial, el principi de les caselles és un instrument molt potent per a demostrar, sota condicions que només afecten el nombre d'elements, l'existència de certs elements d'un conjunt que comparteixen les mateixes propietats.

## Problemes

**PC1.** Proveu el principi del colomar.

**PC2.** Demostreu que entre els individus d'un grup de set persones, almenys n'hi ha quatre del mateix sexe.

PC3. Entre els individus d'un grup de 3000 persones, sempre n'hi ha 9 que tenen el mateix dia d'aniversari.

PC4. Entre els individus d'un grup de 2 o més persones, sempre n'hi ha dues amb el mateix nombre d'amics dins del grup. (Suposem que tot individu és sempre amic d'ell mateix i que l'amistat és una relació simètrica.)

PC5. Proveu que en tota elecció de 10 punts elegits en un quadrat de 3 unitats de costat, sempre hi ha 2 punts que disten com a màxim  $\sqrt{2}$ .

Nota. En aquest problema hom pot veure la importància en l'elecció de les cel·les. Si, per exemple, haguéssim elegit rectangles  $\frac{1}{3} \times 3$ , no hauríem pogut concloure allò que se'ns demanava.

PC6. Deu jugadors formen part d'un campionat d'escacs de tots contra tots; és a dir, cada jugador ha de jugar un joc amb cada un dels altres. Un jugador s'anota +1, quan guanya, 0, quan fa taules, i -1, quan perd. Quan el torneig s'acaba resulta que el 70 % dels jocs han estat taules. Proveu que hi ha dos jugadors amb el mateix nombre de punts.

PC7. *Olimpíada d'Israel, 1988*. Un grup de persones visita una exposició de 100 quadres. Cap no arriba a veure tots els quadres, però tots els quadres han estat vistos per algun dels visitants. Proveu que hi ha una parella de visitants  $(v_1, v_2)$  i una parella de quadres  $(\alpha, \beta)$  tals que  $v_1$  ha vist  $\alpha$  però no ha vist  $\beta$  i  $v_2$  ha vist  $\beta$  però no ha vist  $\alpha$ .

PC8. *Putnam Competitions, 1953*. Distribuïm sis punts a l'espai sense que n'hi hagi tres d'alineats ni tampoc quatre de coplanaris. Ara tracem segments, en total quinze, que els uneixin dos a dos. Alguns els pintem de color blau i els altres de color vermell. Proveu que hi ha almenys un triangle que té tots els costats del mateix color.

Nota. Amb cinc vèrtexs no és possible de garantir un triangle del mateix color. Busqueu un contraexemple.

PC9. [*American Mathematical Monthly*, 65 (1958), 446, i resolt a 66 (1959), 141-142.] En una reunió de sis persones sempre n'hi ha tres que es coneixen mútuament o que es desconeixen totalment. Demostreu-ho.

### El principi de les caselles

**PC10.** *Olimpiada Matemàtica Internacional, 1964/4.* Disset persones s'escriuen entre elles, cada una amb totes les altres. En les cartes només tracten tres temes. Cada parella de corresponsals, però, només tracta un dels temes. Proveu que almenys n'hi ha tres que escriuen sobre el mateix tema.

**PC11.** Donat un conjunt de 10 enters positius diferents i menors que 107, demostreu que hi ha dos subconjunts disjunts que tenen la mateixa suma.

**PC12.** Les persones d'una reunió han fet encaixades de mans en arribar. Suposem que ningú es dóna la mà a ell mateix i cap parella de persones s'ha donat la mà més d'una vegada. Demostreu que hi ha dues persones a la reunió que han encaixat el mateix nombre de mans.

**PC13.** En un disc de radi 1 hi posem 8 punts (a l'interior o sobre la circumferència). Demostreu que n'hi ha dos que estan a distància estrictament inferior a la unitat.

**PC14.** Donat un conjunt de  $n$  enters positius qualssevol, hi ha un subconjunt tal que la suma dels seus elements és divisible per  $n$ . Demostreu-ho.

**PC15.** *P. Erdős.* Demostreu que donada una successió de més de  $(r-1)(s-1)$  nombres diferents, hi ha una subsuccessió creixent de  $r$  termes, o hi ha una subsuccessió decreixent de  $s$  termes.

**PC16.** Suposem que el nombre màxim de llibres que pot tenir una persona és 50000. Demostreu que a Barcelona hi ha dues persones que tenen el mateix nombre de llibres. El nombre màxim de cabells per  $\text{mm}^2$  és 5. Demostreu que a Espanya hi ha dues persones amb el mateix nombre de cabells.

**PC17.** Cada dia posem a una guardiola una moneda de 1 pta o una moneda de 2 pta i el total que tenim al cap de  $n$  dies és de  $m$  pta. Demostreu que per cada enter  $0 \leq k \leq 2n - m$  hi ha un conjunt de dies consecutius durant els quals el contingut de la guardiola s'ha incrementat en  $k$  pta.

PC18. Proveu que d'entre 5 punts d'un triangle equilàter de costat unitat, n'hi ha sempre dos que disten com a màxim  $1/2$ .

PC19. Donat un conjunt  $C$  de  $n + 1$  punts diferents ( $n \in \mathbb{N}$ ) sobre la circumferència d'un cercle de radi unitat, proveu que hi ha dos punts  $a, b \in C, a \neq b$ , tals que la distància entre ells no excedeix mai  $2 \sin \frac{\pi}{n}$ .

PC20. *Competició matemàtica de Beijing, 1963*. Donat un conjunt  $S$  de 9 punts d'un quadrat de costat 1, proveu que sempre hi ha tres punts de  $S$  tals que l'àrea del triangle format per ells és més petita o igual que  $1/8$ .

PC21. Donats  $n$  nombres enters, aleshores o bé un d'ells és múltiple de  $n$ , o bé se'n poden sumar diversos per tal d'obtenir un múltiple de  $n$ . Proveu-ho.

PC22. *Paul Erdős. A.M.M., 1937*. Donats  $n + 1$  enters  $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ , cada un d'ells més petit o igual que  $2n$ , demostreu que almenys un d'ells és divisible per algun altre del conjunt.

PC23. Proveu que en tot conjunt de 5 nombres, hi ha sempre tres nombres la suma dels quals és divisible per 3.

PC24. Sigui  $A$  un conjunt de  $n + 1$  elements, on  $n \in \mathbb{N}$ . Proveu que existeixen  $a, b \in A$  tals que  $n \mid (b - a)$ .

PC25. Sigui  $A \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 2n - 1, 2n\}$  tal que  $|A| = n + 1$ . Demostreu que aleshores conté dos nombres que són primers entre ells.

PC26. Sigui  $C = \{r_1, \dots, r_{n+1}\}$  un conjunt format per  $n + 1$  nombres reals tal que  $0 \leq r_i < 1$ . Proveu que hi ha almenys dos elements  $r_i, r_j \in C$  tals que  $|r_i - r_j| < \frac{1}{n}$ .

PC27. Sigui  $n \geq 3$  un nombre senar. Proveu que hi ha un nombre divisible per  $n$  en el conjunt

$$\{2^1 - 1, 2^2 - 1, \dots, 2^{n-1} - 1\}.$$

**PC28.** Sigui  $A$  un conjunt de 20 nombres enters diferents de la progressió aritmètica  $1, 4, 7, \dots, 100$ . Demostreu que el conjunt  $A$  conté dos enters diferents la suma dels quals és 104.

### Mostra de solucions

#### Solució del problema PC4

El nombre d'amics  $t_k$  de l'individu  $k$  del grup pot prendre valors en un dels dos conjunts  $\{1, 2, \dots, n-1\}$  o  $\{2, \dots, n\}$ , ja que 1 i  $n$  no hi poden ser simultàniament (si un individu només és amic d'ell mateix, per la simetria, no pot haver-hi una altre individu que sigui amic de tots). En qualsevol dels dos casos prenem com a caselles els elements d'un dels conjunts anteriors i hi ha com a màxim  $n-1$  caselles. Per tant almenys dues persones,  $i, j$  han de tenir el  $t_i$  i el  $t_j$  a la mateixa casella, d'on  $t_i = t_j$ , i tenen el mateix nombre d'amics.

#### Solució del problema PC11

Els possibles valors de les sumes dels conjunts de 0 a 10 elements van de 0 fins a  $97 + 98 + \dots + 106 = 1015$ . Sigui ara  $A$  un conjunt de 10 elements enters positius i menors que 107. El conjunt  $A$  té  $2^{10} = 1024$  parts. Posant les sumes de totes les possibles parts a les caselles dels possibles valors, que són 1016, resulta que per força hi ha dues parts que tenen la mateixa suma, diguem  $A_1$  i  $A_2$ . Si aquests dos subconjunts són disjunts, ja hem acabat. Si no ho són, podem treure de tots dos  $A_1 \cap A_2$  i obtindrem dues altres parts de  $A$  disjunts i de la mateixa suma.

#### Solució del problema PC16

Transcripció literal del llibre de P. PUIG ADAM, *Curso de GEOMETRIA METRICA*, Tomo I - Fundamentos, Introducción (Experiencia, intuición y lógica en la génesis de la Ciencia):

“Numerosísimos son los ejemplos y curiosidades que muestran la insuficiencia o los engaños de la intuición. Por su brevedad y elementalidad nos contentaremos con los dos siguientes:

1.- Supongamos que un interlocutor de mediana cultura, que sepa que España tiene más de 20 millones de habitantes y que nuestro cuero cabelludo tiene bastantes menos de 5 cabellos por  $\text{mm}^2$ ; y preguntémosle si es seguro que existen dos españoles con el mismo número de cabellos.

La imposibilidad de imaginar la experiencia comparativa le hará sin duda declarar al pronto


que la pregunta no tiene contestación posible.

Sin embargo, un sencillísimo razonamiento permite llegar donde la intuición no llega, y contestar afirmativamente; pues si todos los españoles tuviesen distinto número de cabellos, habría alguno con más de 20 millones de cabellos, para lo cual necesitaría una superficie de cabeza mayor de 4 metros cuadrados.”

2.- ... ”

### Solució del problema PC20

Dividim el quadrat en quatre parts, tal com indica la figura. Cada part té àrea  $1/4$ . Si tenim 9 punts al quadrat, com que hi ha 4 caselles, pel principi de Dirichlet, segur que hi ha 3 punts en una casella, és a dir, en un mateix quadrat petit. Aquests 3 punts formen un triangle dins d'un quadrat d'àrea  $1/4$ , i per tant l'àrea d'aquest triangle ha de ser menor o igual que  $1/8$ , ja que el triangle d'àrea màxima dins d'un quadrat és el format per dos costats i la diagonal i té àrea la meitat de la del quadrat.



El conjunt de valors  $p_i$  és una relació probabilística de l'espai mostral.

(ii) Accés a esta fórmula per un cert nombre  $r$  de resultats possibles de l'espai mostral  $S$ :

$$A = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_r\}$$

Busquem que la probabilitat  $P(A)$  del suïssa  $A$  és el valor

$$P(A) = p_1 + \dots + p_r$$

(iii) Busquem és comparable quan  $p_i = \frac{1}{n}$  ( $i = 1, \dots, n$ ). Alcançem

$$P(A) = \frac{r}{n} = \frac{\text{casos favorables a A}}{\text{casos possibles}}$$

PA1.- Trobem que

(a)  $0 \leq P(A) \leq 1$ , per a tot suïssa  $A$ .

(b)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ , si  $A \cap B = \emptyset$ .





## PROBABILITAT

Josep Pla i Carrera

### Primera aproximació a la probabilitat

Considerem un fenomen que té un nombre finit de resultats possibles  $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ . El conjunt  $S$  s'anomena *espai mostral*.

Suposem que cada resultat possible  $a_i$  té associat un nombre real  $p_i$  tal que

$$\begin{aligned}0 &\leq p_i \leq 1 \\ p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1} + p_n &= 1\end{aligned}$$

El conjunt de valors  $p_i$  és una *valoració probabilística* de l'espai mostral.

Un *succés*  $A$  està format per un cert nombre  $r$  de resultats possibles de l'espai mostral  $S$ :

$$A = \{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_r}\}.$$

Direm que la *probabilitat*  $P(A)$  del succés  $A$  és el valor

$$P(A) = p_{i_1} + \dots + p_{i_r}.$$

Un fenomen és *equiprobable* quan  $p_i = \frac{1}{n}$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Aleshores

$$P(A) = \frac{r}{n} = \frac{\text{casos favorables a } A}{\text{casos possibles}}.$$

**PR1.** Proveu que

(a)  $0 \leq P(A) \leq 1$ , per a tot succés  $A$ .

(b)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ , si  $A \cap B = \emptyset$ .

## Probabilitat

(c)  $P(S) = 1$ .

(b') En general,  $P(A_1 \cup \dots \cup A_m) = P(A_1) + \dots + P(A_m)$ , si  $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ .

(d)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ .

(d') Generalitzeu (d) a tres, quatre, etc  $m$  successos.

(e)  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ , on  $\bar{A}$  indica l'esdeveniment contrari de  $A$ .

(f) Si  $A \subseteq B$ , aleshores  $P(A) \leq P(B)$  i  $P(A - B) = P(A) - P(B)$ .

**PR2.** Aquest problema suggereix la definició general de probabilitat  $P$  en un espai mostral  $S$ . És una aplicació dels subconjunts de  $S$  en  $\mathbb{R}$  que compleixi les tres propietats:

(a) Per a cada  $A \subseteq S$ ,  $0 \leq P(A) \leq 1$ , per a tot succés  $A$ .

(b)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ , si  $A \cap B = \emptyset$ .

(c)  $P(S) = 1$ .

Podeu veure que aleshores es compleixen les propietats (b'), (d), (d'), (e) i (f) del problema anterior.

Aquesta definició permet de generalitzar el cas *discret* al cas general en el qual  $S$  pot ser un conjunt infinit numerable o no numerable. L'únic que cal tenir en compte és que la probabilitat  $P$  ha d'estar definida en una família  $\mathcal{A}$  de subconjunts d' $S$  tancada per unió i per pas al complementari. Cal, a més, que  $S \in \mathcal{A}$ .

Un exemple concret ens el proporcionen els subconjunts d'un conjunt geomètric  $S$  que sigui una superfície o un sòlid. Aleshores, si  $A \subseteq S$ ,

$$P(A) = \frac{\text{àrea d}'(A)}{\text{àrea d}'(S)} \quad \text{o} \quad P(A) = \frac{\text{volum d}'(A)}{\text{volum d}'(S)}.$$

## Probabilitat condicionada i independència

Considerem el següent exemple: d'un lot de 100 productes amb 80 sense defectes i 20 amb defectes n'agafem dos i ho fem (a) amb substitució, (b) sense substitució.

Considerem ara els següents successos

$$A = \{\text{el primer article és defectuós}\}$$

$$B = \{\text{el segon article és defectuós}\}$$

En el primer cas  $P(A) = P(B) = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$ . En el segon cas,  $P(A) = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$ . Però quin és ara el valor de  $P(B)$ ? És clar que ara, en el cas (b), el valor que pren  $P(B)$  depèn del que hagi passat amb el succés  $A$ , ja que el comportament de la mostra varia segons que

s'hagi esdevingut  $A$  o no. Aleshores indicarem  $P(B|A)$  la probabilitat del succés  $B$  en el ben entès que el succés  $A$  ha succeït prèviament.

En l'exemple que estem comentant és clar que  $P(B|A) = \frac{19}{99}$ . (En realitat l'espai mostral ha canviat i els successos estan condicionats a  $A$ .)

Formalment definim la *probabilitat condicional* per l'expressió

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

*Exemple.* Llancem dos daus i anotem els resultats  $\langle x_1, x_2 \rangle$ , on  $x_i$  designa el resultat de l' $i$ -èsim dau ( $i = 1, 2$ ). Considerem els successos

$$A = \{\langle x_1, x_2 \rangle : x_1 + x_2 = 10\} \quad \text{i} \quad B = \{\langle x_1, x_2 \rangle : x_1 < x_2\}.$$

Ara podem considerar el succés

$$A \cap B = \{\langle x_1, x_2 \rangle : x_1 + x_2 = 10, x_1 < x_2\} = \{\langle 4, 6 \rangle\}.$$

D'on

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}.$$

De forma anàloga podíem haver calculat primer la probabilitat de  $P(B|A)$  i d'ella haver-ne deduït la probabilitat de  $P(A \cap B)$ .

En definitiva, doncs,

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

$$P(B \cap A) = P(A|B) \cdot P(B)$$

*Llei de les probabilitats totals*

Sigui  $A$  un succés i  $B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, B_k$  una partició de l'espai mostral  $S$ , és a dir, una família finita de successos tal que

$$B_i \cap B_j = \emptyset, \text{ si } i \neq j, \quad \text{i} \quad S = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_{k-1} \cup B_k.$$

Aleshores

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_{k-1}) + P(A \cap B_k) = \\ &= P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_k) \cdot P(B_k) \end{aligned}$$

*Fórmula de Bayes*

Si, com abans,  $A$  és un succés i  $B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, B_k$  una partició de l'espai mostral  $S$ , aleshores

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{P(A|B_1) \cdot P(B_1) + \dots + P(A|B_k) \cdot P(B_k)}, \quad i = 1, 2, \dots, k-1, k.$$

Aquesta fórmula rep el nom de fórmula per a calcular la probabilitat de les causes, ja que com que s'ha de donar una i només una de les causes  $B_i$ , ens permet de conèixer la probabilitat d'aquesta causa en el supòsit que s'hagi donat el succés  $A$ .

*Successos independents*

Dos successos  $A$  i  $B$  són *independents* si, i només si, cap d'ells no condiciona la probabilitat de l'altre; és a dir, si, i només si,

$$P(A|B) = P(A).$$

Dit d'una forma alternativa, si, i només si,

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

En general,  $n$  successos  $A_1, \dots, A_n$  són *mútuament independents* si, i només si, per a tot  $k = 2, \dots, n$ , tenim que

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k}).$$

*Variables aleatòries*

Quan fem un experiment, moltes vegades estem més interessats en algun valor (que serà un nombre real) associat al resultat de l'experiment, que en el resultat mateix. Per exemple, si juguem a cara i creu amb un altre jugador, de manera que si tirem i surt cara rebem 5 pta i si surt creu li donem al contrari 3 pta, els dos nombres 5 i 3 ens interessen molt més a cada jugada que el fet mateix de sortir cara o creu. Això ens porta a la definició de les funcions que prenen valors sobre el conjunt d'esdeveniments elementals d'un experiment. Per dir-ho d'alguna manera, parlem de les apostes del joc.

Suposem que tenim un espai mostral  $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  i unes probabilitats associades  $p_i$  tal com s'ha explicat abans. Una *variable aleatòria* és una funció de l'espai mostral  $S$  en  $\mathbb{R}$  que associa a cada esdeveniment elemental un nombre real.

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}.$$

Per exemple, sigui  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  i definim  $X$  així

$$X(1) = X(2) = X(3) = 1, \quad X(4) = X(5) = X(6) = -1.$$

Podem interpretar la variable  $X$  com el *guany* d'un jugador que rep 1 pta si surt 1, 2 o 3 al dau o en lliura 1 al contrari si surt 4, 5 o 6 al dau.

Un altre exemple. Tirem una moneda dues vegades i l'espai mostral és

$$S = \{CC, C+, +C, ++\}$$

on  $C$  indica cara i  $+$  indica creu. Una variable aleatòria sobre aquest espai mostral podria ser el *nombre de cares* obtingudes. Tindríem  $X(CC) = 2$ ,  $X(C+) = 1$ ,  $X(+C) = 1$ ,  $X(++ ) = 0$ . Sobre el mateix espai mostral podríem definir altres variables aleatòries, com per exemple, el *nombre de cares menys el nombre de creus* i tindríem  $Y(CC) = 2$ ,  $Y(C+) = 0$ ,  $Y(+C) = 0$ ,  $Y(++ ) = -2$ .

### Esperança matemàtica

Si tenim una variable aleatòria que pren valors reals  $x_1, x_2, \dots, x_n$  sobre l'espai mostral  $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  i unes probabilitats associades  $p_1, p_2, \dots, p_n$ , es defineix com a *esperança matemàtica* o també *mitjana* al valor

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n.$$

Per exemple, si ens demanen l'esperança matemàtica de la variable aleatòria *valor obtingut en tirar un dau no trucat*, hem d'entendre: (a) que l'espai mostral és el de possibles jugades del dau, és a dir  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ; (b) que totes les ocurrencies tenen la mateixa probabilitat (el dau és no trucat), i per tant  $p_1 = \dots = p_6 = 1/6$ ; (c) la variable aleatòria  $X$  pren els valors reals 1, 2, 3, 4, 5, 6 segon els punts que surten al dau. L'esperança és

$$1 \frac{1}{6} + 2 \frac{1}{6} + 3 \frac{1}{6} + 4 \frac{1}{6} + 5 \frac{1}{6} + 6 \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \frac{6 \times 7}{2} = \frac{7}{2}.$$

Observeu a l'exemple que l'esperança matemàtica o mitjana o *valor esperat* de la variable aleatòria  $X$  pot ser un valor real que  $X$  pot no prendre mai. La *lei dels grans nombres* ens diu que l'esperança matemàtica d'una variable aleatòria és el valor al qual s'aproxima la mitjana dels valors observats si repetim l'experiment moltes vegades i amb independència.

Problemes

**PR3.** *El problema de Fermat-Pascal.* Dos jugadors  $A$  i  $B$  juguen una partida cada una de les quals té una probabilitat de  $\frac{1}{2}$  de ser guanyada i de  $\frac{1}{2}$  de ser perduda. Suposem que el resultat d'una partida no depèn pas dels resultats de les partides anteriors. [Pensem, per exemple, en una sèrie de "cares i creus".] Cada jugador guanya un punt quan guanya i no-res quan perd. Convenen en jugar-se 100 pta. cada un i que el pot de 200 pta. se l'endurà el primer que guanyi 4 partides.

Per la raó que sigui han de plegar quan  $A$  necessita dues partides per tal d'haver-ne guanyat 4 i  $B$  en necessita 3. Com cal repartir el pot?

Feu el càlcul

(a) suposant que els successos són les situacions reals a partir d'aquell moment, si el joc hagués continuat (solució de Pascal);

(b) si volem que tots el casos que es considerin siguin equiprobables (solució de Fermat).

**PR4.** *La paradoxa de Bertrand.* Tirem una corda a l'atzar en un cercle. Quina és la probabilitat que sigui més gran que no pas el costat del triangle equilàter inscrit? Distingiu tres mètodes de càlcul:

(a) la distància al centre;

(b) la situació del punt mig de la corda;

(c) l'angle central que determina la corda.

Quina és la paradoxa?

**PR5.** *El problema de l'aniversari.* Quina és la probabilitat que en un grup d' $n$  persones n'hi hagi dues almenys que hagin nascut el mateix dia?

**PR6.** *El problema dels llumins de Banach.* Tenim dues capsas de llumins i en posem una a cada butxaca dels pantalons. Cada capsa té  $n$  llumins. Quan en necessitem un, triem a l'atzar una butxaca, traiem la capsa de llumins, n'agafem un, i tornem la capsa a la butxaca. Una de les vegades que traiem una capsa, observem que és buida. Quina és la probabilitat que quedin  $k$  llumins a l'altra capsa?

**PR7.** *La ruïna del jugador.* Dos jugadors  $M$  i  $N$  disposen de  $m$  i  $n$  pta cada un

respectivament. Juguen amb una moneda no trucada. Si surt cara,  $M$  dona una pesseta a  $N$  i si surt creu ho fan al revés. El joc continua fins que un dels dos jugadors s'arruïna. Calculeu les probabilitats de guany de cada jugador i la durada mitjana de la partida.

PR8. *El problema de les torres.* Colloquem 8 torres en un tauler d'escacs. Quina és la probabilitat que cap d'elles pugui matar-ne una altra?

PR9. *El problema dels nombres primers entre si.* Quina és la probabilitat que, en agafar dos nombres naturals a l'atzar, siguin primers entre ells?

PR10. *El problema dels daus trucats.* Demostreu que és impossible de trucar una parella de daus de manera que les sumes de les puntuacions (tirant-los a la vegada) tinguin totes la mateixa probabilitat.

PR11. Triem un enter a l'atzar entre 1.000.000 i 10.000.000 (inclosos). Quina és la probabilitat que no tingui dues xifres iguals? I que no tingui dues xifres iguals en posicions consecutives?

PR12. Tirem una moneda, després tirem un dau, i finalment traiem una carta d'un joc de 52 cartes i considerem els successos

$A$  = surt cara;

$B$  = surt un 5 o un 6;

$C$  = surt una carta de piques.

Quin és l'espai mostral  $S$  associat a aquesta experiència? Quines són, en relació amb aquest espai mostral, els successos  $A, B, C, A \cap B, B \cap C, C \cap A, A \cap B \cap C$ ? Quines són les probabilitats que els corresponen? Són independents dos a dos? i tots tres?

PR13. Tirem cinc monedes independents. Quina és la probabilitat d'obtenir  $cc+c+?$  Quina és la probabilitat que surtin tres cares exactament? Quina és la probabilitat que no surtin tres cares?

*Nota:* La qüestió és força més complicada si els llançaments no són independents. Intenteu de donar-hi una resposta.

## Probabilitat

**PR14.** Barregem les cartes d'una baralla de 52 cartes. Quina és la probabilitat que els 4 asos quedin junts?

**PR15.** Llançem 6 daus indistingibles. Quants resultats diferents podem observar? I si els daus són distingibles?

**PR16.** Tenim 4 cartes conegudes i les posem de cap per avall damunt la taula i a l'atzar els hi atribuïm un valor. Quina és la probabilitat d'endevinar-ne una, dues, tres o quatre?

**PR17.** En una porta hi ha dos panys i les claus són en una capsa en la qual hi ha sis claus. Si en traiem dues a l'atzar, i en col·loquem una a cada pany, quina és la probabilitat que obrin la porta? Quina és la probabilitat que el parell de claus serveixi per a obrir la porta?

**PR18.** En una festa hi ha 6 dones i 4 homes i sabem que hi ha dos matrimonis. Triem dues parelles home-dona a l'atzar. Quina és la probabilitat d'endevinar els dos matrimonis? I si sabem que hi ha tres matrimonis, quina és la probabilitat d'endevinar-los?

**PR19.** Un autobús fa 4 parades dins l'aeroport per tal de distribuir 15 passatgers. Quina és la probabilitat que tots baixin a la mateixa parada? Quina és la probabilitat que almenys una persona baixi a cada una de les parades?

**PR20.** En un bombo hi ha 366 boles etiquetades amb els dies d'un any de traspàs. Si n'extraïem 180, quina és la probabilitat que corresponguin a dies distribuïts uniformement sobre els 12 mesos? Quina és la probabilitat que entre les 30 primeres boles extretes no n'hi hagi cap del mes d'Agost o del mes de Setembre?

**PR21.** Un dau perfecte es llença dues vegades. El total de punts obtinguts 7. Quina és la probabilitat que el primer punt hagi estat  $k$ , amb  $0 \leq k \leq 6$ ?

**PR22.** Un pare, una mare i un fill decideixen fer un joc familiar. En cada partida només juguen dues persones. Les partides es poden guanyar o perdre amb la mateixa probabilitat. No es poden empatar. El jugador que guanya una partida juga la següent amb el jugador



que està descansant. El joc segueix fins que un dels jugadors guanya exactament dues partides (no necessàriament consecutives). S'acorda, per qüestions d'edat, que el pare pot decidir si intervé o no en la primera partida del joc, o bé si s'espera a que la mare i el fill hagin jugat la primera partida. Quina de les dues decisions li és més avantatjosa?

**PR23.** Hem de pintar els pisos d'una casa de vuit pisos amb dos colors: el blau i el vermell. Quina és la probabilitat que no hi hagi dos pisos consecutius de color vermell, si la tria dels colors es fa a l'atzar?

**PR24.** Hem de col·locar tres persones  $A, B, C$  en ordre de manera aleatòria. Se'ns acudeixen tres maneres de fer-ho.

(a) En tres papers escrivim els números 1, 2, i 3. Aleshores fem que, per ordre alfabètic, triïn un dels papers. L'ordre el dona l'ordre del nombre triat.

(b) Escrivim en paperetes totes les permutacions possibles de les lletres  $A, B, C$ . Les posem en una capsa i en traiem una a l'atzar. L'ordre ve donat per la l'ordre de la permutació triada.

(c) Procedim com en el cas (a), però ara la tria del paper que porta escrit el nombre es fa, després d'haver triat a l'atzar una permutació de les lletres  $A, B, C$ , com en (b). L'ordre final és el dels nombres triats per cada una de les persones.

Quin d'aquests tres mètodes és més equitatiu?

**PR25.** En Joan tira 6 monedes perfectes i la Maria en tira 5. Quina és la probabilitat que en Joan tregui més cares que no pas la Maria?

**PR26.** El màgic de cartes Sherwin Betlotz es juga una important quantitat de diners afirmant que no ets capaç de treure 3 cartes d'un joc de 52 cartes sense treure almenys una de les dotze figures. Voldries jugar amb ell una partida apostant la mateixa quantitat de diners?

**PR27.** Triem tres punts a l'atzar damunt d'una circumferència. Determineu la probabilitat que el triangle format pels tres punts contingui el centre de la circumferència.

**PR28.** Un club de tennis convida 32 jugadors d'igual habilitat i qualitat. Han de jugar

## Probabilitat

per parelles i el que perd ja no torna a jugar. Quina és la probabilitat que una parella determinada competeixi?

**PR29.** Vols jugar aquest joc amb mi? Per poder-lo jugar has de pagar 1 €. El joc consisteix en el següent: Remenem ben remenat un joc de cartes. En treus dues. Si són negres, te les quedes. Si són vermelles, me les quedo jo. Si són de colors diferents, les deixem de banda. El joc s'acaba quan s'exhaureixen les cartes. Jo et pagaré 3 € per cada carta que tu tinguis de més que jo.

**PR30.** Llanço un dau perfecte  $n$  vegades. Quina és la probabilitat de treure un nombre senar de sisos?

**PR31.** Si  $n^2$  monedes es colloquen a l'atzar en  $n$  files de  $n$  monedes cada una. D'aquestes monedes n'hi ha  $n$  de plata. Quina és la probabilitat que, en almenys una fila, no hi hagi cap moneda de plata?

**PR32.** Una capsa conté  $p$  boles blanques i  $q$  boles negres. Al costat de la capsa hi ha una pila suficientment gran de boles negres. S'agafen dues boles a l'atzar de la capsa. Si són del mateix color, a la capsa hi posem una bola negra de la pila. Altrament, hi posem la bola blanca que hem tret. Repetim el procés fins que traiem les dues darreres boles de la capsa i hi colloquem la darrera bola. Quina és la probabilitat que aquesta darrera bola que queda dins la capsa sigui blanca?

**PR33.** Llancem una moneda perfecta repetidament fins aconseguir un nombre senar de cares seguides d'una creu. Doneu el nombre esperat de llançaments que cal fer.

**PR34.** Al voltant d'un llac hi ha  $n$  cases. Les pintem usant  $k$  colors que anem triant a l'atzar. Quina és la probabilitat que, un cop totes estiguin pintades, no hi hagi dues cases pintades del mateix color?

**PR35.** Un vell de 75 anys té el 43% de probabilitat de viure 10 anys més. Un de 80, només té el 27% de viure 10 anys més. Un vell de 75 anys té un 20% de probabilitat de viure fins els 90 anys. Quina és la probabilitat que un vell de 80 anys mori en el decurs

dels cinc anys següents?

**PR36.** En una urna hi colloquem 4 fitxes negres i 5 de blanques. En traiem tres a l'atzar, però una després de l'altre. La segona és negra. Quina és la probabilitat que la tercera també ho sigui?

**PR37.** Tenim dues baralles de cartes espanyoles. A una d'elles li falta una carta i no sabem quina és. Elegim una baralla a l'atzar i traiem una carta. Quina és la probabilitat que la carta sigui d'oros?

**PR38.** Tenim dues urnes  $U_1$  i  $U_2$ . La primera conté 2 boles blanques i 3 boles negres. La segona conté 2 boles blanques i 3 de vermelles. Traiem una bola de la urna  $U_1$  i la posem en la urna  $U_2$ . Després traiem una bola de la urna  $U_2$  i la posem en la urna  $U_1$ . Finalment traiem dues boles de la urna  $U_1$  i resulta que una és blanca i l'altra és negra. Quina és la probabilitat que després de fer aquesta darrera extracció la urna  $U_1$  no tingui cap bola vermella?

**PR39.** En una cella d'una presó hi ha tres presoners  $A, B$  i  $C$ . Un d'ells ha de ser condemnat. La probabilitat de ser condemnat és la mateixa per a cada un d'ells:  $1/3$ . El presoner  $A$  sap que un dels presos  $B, C$  no serà condemnat. Tanmateix ho pregunta al guardià. Calculeu la probabilitat que  $A$  sigui el condemnat si el guardià li respon: " $B$  no serà condemnat", en el casos següents:

- (a) Que  $A$  hagi preguntat: " $B$  serà condemnat?"
- (b) Que  $A$  hagi preguntat: "Quin dels dos  $B$  o  $C$  no serà condemnat?"

Suposem que el guardià ho sap i que diu la veritat.

Es complica molt el problema si suposem que el guardià ho sap però diu la veritat o menteix després de tirar una moneda a l'aire, segons li surti cara o creu?

**PR40.** Quan surt cara obtinc 1 €, i quan surt creu n'obtinc 2. La moneda que llanço és perfecta. Guanyo el joc quan obtinc exactament 100 €. La probabilitat de guanyar és més gran, més petita, o igual a  $2/3$ ?

**PR41.** Un jurat està format per 9 persones que han de donar un veredict. Cada una

## Probabilitat

d'elles l'emet independentment de les altres amb probabilitat  $1/2$  per innocent i  $1/2$  per culpable. Quina és la probabilitat que, en acabar la votació, un membre concret del jurat estigui en la majoria. (Quan  $n$  és parell,  $n = 2k$ , està en la majoria si està en el grup format per almenys  $k + 1$  vots.)

**PR42.** Quina és la probabilitat que en tirar tres vegades un dau, el producte de les puntuacions obtingudes sigui un múltiple de 6?

**PR43.** Amb les xifres 1, 1, 2, 2, 4, 5 formem tots els nombres possibles de sis xifres. Trobeu la probabilitat que, en elegir-ne un a l'atzar, sigui múltiple de 12.

**PR44.** En una capsa hi ha cartonets, cada un dels quals conté una lletra. En total hi ha 8 cartonets amb la lletra  $A$ , 5 amb la lletra  $C$  i 4 amb la lletra  $S$ . Un cec treu 4 cartonets i, posant-los en fila, vol construir la paraula  $CASA$ . Calculeu la probabilitat que té d'aconseguir-ho.

*Nota:* El problema està resolt, si cada lletra està al seu lloc, encara que no estigui col·locada de forma correcta: pot estar de cap per avall, o girada a la dreta o a l'esquerra, o ben posada.

**PR45.** En el joc de les travesses, quantes n'hi ha amb 10 encerts? Quina és la travessa més probable? Quantes n'hi ha sense cap resultat encertat? (Suposem que la travessa conté 14 partits i que cada partit accepta tres valors 1, 2,  $X$ , segons que hagi guanyat el que juga a casa, el que juga fora de casa, o hi hagi hagut empat.)

**PR46.** Els carrers d'una ciutat formen una quadrícula de carrers verticals i horitzontals. Els carrers horitzontals estan enumerats amb els números 1, 2, 3. Els carrers verticals, en canvi, amb les lletres  $a, b, c, d, e$  i  $f$ , amb aquest ordre d'esquerra a dreta. Un vianant surt del punt  $(1, a)$ . Tira un dau perfecte. Si li surt un múltiple de tres fa una travessia horitzontal cap a la dreta. Si no, fa una travessia vertical cap amunt. Això ho fa en cada una de les cruïlles que va trobant en el seu passeig. Quina és la probabilitat que passi per la cruïlla  $(3, d)$ ?

**PR47.** En un sorteig els tiquets estan numerats 00000, 00001, 00002, ..., 99998, 99999.

Quina és la probabilitat que el número que surti només tingui tres xifres diferents?

**PR48.** Un matrimoni té 5 fills. Calculeu la probabilitat que, entre ells, hi ha almenys dos nois i almenys una noia. La probabilitat de néixer noi o noia és igual a una meitat.

**PR49.** En Joan va a buscar en Pere que ve en el tren de les 11. Si troba un taxi, arribarà a l'estació a les 11. Si no el troba, hi arribarà a les 11h 15m. La probabilitat de trobar un taxi és de  $3/5$ , i la probabilitat que el tren es retardi un quart d'hora o més és de  $2/9$ . Quina és la probabilitat que arribi a l'estació a temps?

**PR50.** Una capsa conté 9 cartonets marcats de l'1 al 9, ambdós inclosos. Traiem, un a un, tres cartonets. Trobeu la probabilitat que siguin alternativament parell, senar, parell, o bé senar, parell, senar.

**PR51.** En una urna hi ha  $b$  boles blanques i  $b + n$  boles negres. Calculeu els valors possibles de  $b$  i  $n$  per tal que la probabilitat d'obtenir una bola blanca sigui  $1/n$ .

**PR52.** D'un joc de 40 cartes n'agafem 5 a l'atzar. Calculeu la probabilitat que tres siguin asos i les altres dues siguin iguals (dos reis, dos quatres, etc.).

**PR53.** El 50% de cotxes que hi ha en una ciutat són de la marca Seat. Calculeu la probabilitat que, d'entre 10 cotxes aparcats en una plaça, quatre, almenys, siguin d'aquesta marca.

**PR54.** En el pis cinquè d'una cas de set pisos, em trobo esperant l'ascensor, que inicia l'ascens amb dues persones. Sabent que, en cada pis, hi viuen 10 persones i que jo no sóc pas de la casa, quina és la probabilitat que l'ascensor es pari al cinquè pis?

**PR55.** Tres ruletes perfectament horitzontals, centrades i equilibrades, contenen sectors circulars, pintats de negre i vermell de la forma següent. La ruleta 1,  $180^\circ$  vermell i  $180^\circ$  negre. La ruleta 2,  $225^\circ$  vermell i  $135^\circ$  negre, i la ruleta 3,  $270^\circ$  vermell i  $90^\circ$  negre. Calculeu la probabilitat que, en jugar simultàniament en les tres ruletes, en dues la bola caigui en el negre i en una en el vermell.

## Probabilitat

**PR56.** Elegim a l'atzar dos nombres reals entre 0 i 1. Quina és la probabilitat que un d'ells sigui més petit que el quadrat de l'altre?

**PR57.** Es consideren tots els nombres naturals d'1 a  $10^n$ , ambdós inclosos. N'agafem un a l'atzar. Quina és la probabilitat, en funció de  $n$ , que sigui múltiple de 2 o de 3?

**PR58.** Tenim tres bosses que contenen  $n$  boles numerades  $1, 2, 3, \dots, n$ . En traiem una a l'atzar de cada bossa. Suposem que els números de les boles tretes són  $x, y, z$ . Quina és la probabilitat que  $z = x + y$ . (Les bosses són indistingibles.)

**PR59.** *El joc de la ruleta.* Una ruleta conté els números del 0 al 36, ambdós inclosos. El 0 té el fons gris, la meitat dels 36 nombres tenen el fons vermell i l'altre meitat tenen el fons negre. Les juguesques més corrents són:

- (a) Apostar 1 € a un color (vermell o negre). El guany és de 2 €.
- (b) Apostar 1 € a un únic número, exclòs el 0. El guany és de 36 €.
- (c) Apostar 1 € a una dotzena arbitrària de nombres, exclòs el 0. El guany és de 12 €.

Si surt el 0 la casa guanya i tots els altres jugadors perden.

Signi  $X$  la variable aleatòria que mesura el guany quan juguem amb el mètode (a). Quina és l'esperança de  $X$ ?

Signin  $Y, Z$ , respectivament, les variables aleatòries que mesuren el guany quan juguem amb el mètode (b) o (c). Quina és l'esperança de  $Y$ , i la de  $Z$ ?

**PR60.** *Un joc de cara i creu.* En un joc de cara i creu hi ha una probabilitat  $p$  que surti cara ( $C$ ) i una probabilitat  $q$  que surti creu ( $+$ ), on  $0 \leq p \leq 1$  i  $q = 1 - p$ . Tirem una moneda fins aconseguir que surti el mateix resultat que en la primera tirada. Aleshores el joc s'acaba. Si el primer resultat és  $C$  el jugador guanya un € per cada  $+$  que surt fins a la propera cara. Si el primer resultat és  $+$  s'intercanvien el papers de  $C$  i  $+$ . Quan hauria d'apostar el jugador per poder jugar a aquest joc de forma que fos equitatiu?

**PR61.** Un jugador juga a la ruleta d'acord amb el sistema següent. Juga una sèrie de tres tirades. En la primera i la segona aposta un euro al vermell. En la tercera jugada procedeix de la forma següent:

- (a) Si va guanyar en la primera i en la segona, no fa cap juguesca.

(b) Si va guanyar en la primera o en la segona i va perdre en l'altra, es juga un euro al color contrari al que ha sortit la segona vegada.

(c) Si va perdre ambdues vegades, es juga tres euros al vermell.

Siguin  $X, Y, Z$  els resultats en euros de la primera, la segona, la tercera tirades respectivament. Calculeu les seves esperances, així com l'esperança de la variable aleatòria  $X + Y + Z$ .

**PR62.** *El problema de Sant Petersburg.* Un jugador llança una moneda i guanya un € a la primera tirada si surt cara, un altre si surt cara una altra vegada. Si torna a sortir cara en guanya dos més. Si obté una successió de  $n$  cares guanya  $2^{n-1}$  €. Quant ha de pagar per poder jugar aquest joc de forma equitativa?

**PR63.** Les temperatures de Barcelona i Madrid són de  $x^\circ$  i  $y^\circ$ , respectivament. No les suposem pas independents aquestes dues temperatures. Sabem

(a)  $P(x^\circ = 30^\circ)$ , la probabilitat que la temperatura de Barcelona sigui de  $30^\circ$ ,

(b)  $P(y^\circ = 30^\circ)$ , la probabilitat que la temperatura de Madrid sigui de  $30^\circ$ , i

(c)  $P(\max(x^\circ, y^\circ) = 30^\circ)$ .

Determineu la probabilitat  $P(\min(x^\circ, y^\circ) = 30^\circ)$ .

**PR64.** Un jurat format per tres membres en té dos que independentment tenen la probabilitat  $p$  de donar un veredicta correcte i un de indecís que per decidir el veredicta tira una moneda a l'aire en cada decisió. Un jurat amb un únic membre té una probabilitat  $p$  de fer un veredicta correcte. Quin d'aquests dos jurats és més just?

**PR65.** Un calaix conté mitjons vermells i mitjons negres. La probabilitat que, en treure a l'atzar dos mitjons, siguin vermells és  $1/2$ . (a) Quin és el valor mínim de mitjons que hi ha d'haver al calaix? (b) Quin és el valor mínim si sabem que de mitjons negres n'hi ha un nombre parell?

**PR66.** Si tirem quatre daus enlaire, quina és la probabilitat que després de tirar poguem triar dos daus de manera que la suma dels punts que marquen aquests dos daus sigui 7? I si en tirem  $n$  en comptes de 4?

**PR67.** Calculeu la probabilitat que en agafar un nombre natural a l'atzar, aquest no sigui divisible ni per 3, ni per 4, ni per 6, però en canvi ho sigui per 2 o per 5.

### Mostra de solucions

#### Solució del problema PR3

(a) Suposem que seguim jugant realment. Tenim els següents casos i probabilitats

Favorables a A:		Favorables a B:	
AA	1/4	ABBB	1/16
ABA	1/8	BABB	1/16
ABBA	1/16	BBAB	1/16
BAA	1/8	BBB	1/8
BABA	1/16		
BBAA	1/16		

El problema no és equirepartit.

(b) Si el problema és equirepartit i considerem tots els casos possibles, és a dir, totes les quaternes possibles –si el joc seguís, en quatre partides segur que hi ha un guanyador– podem comptar fàcilment els casos favorables a A i els casos favorables a B que són, respectivament, 11 i 5. S'obté el mateix resultat que a (a).

#### Solució del problema PR15

Si els daus són distingibles, aleshores tenim  $6^6$  resultats diferents.

Si són indistingibles hi ha  $CR_6^6 = 462$  casos, que es poden desglosar:

- tots iguals:  $C_6^1 = 6$
- 5 d'iguals:  $C_6^1 \cdot C_5^1 = 30$
- 4 d'iguals i  $\begin{cases} 2 \text{ de diferents: } C_6^1 \cdot C_5^2 = 60 \\ 2 \text{ d'iguals: } C_6^1 \cdot C_5^1 = 30 \end{cases}$



$$\begin{aligned}
 & \bullet \text{ 3 d'iguals i } \begin{cases} 3 \text{ de diferents: } C_6^1 \cdot C_5^3 = 60 \\ 2 \text{ d'iguals i un de diferent: } C_6^1 \cdot C_5^1 \cdot C_4^1 = 120 \\ 3 \text{ d'iguals: } C_6^2 = 15 \end{cases} \\
 & \bullet \text{ 2 d'iguals i } \begin{cases} 4 \text{ de diferents: } C_6^1 \cdot C_5^4 = 30 \\ 2 \text{ d'iguals i 2 de diferents: } C_6^2 \cdot C_4^2 = 90 \\ 2 \text{ d'iguals i 2 iguals: } C_6^3 = 20 \end{cases} \\
 & \bullet \text{ tots diferents: } C_6^6 = 1
 \end{aligned}$$

### Solució del problema PR16

Tenim  $4!$  maneres diferents d'assignar valors. Volem calcular la probabilitat d'encertar exactament una carta que pot se la primera, o la segona, o la tercera o la quarta. Si les cartes *reals* són  $a, b, c$  i  $d$  i suposem que hem d'encertar la quarta, els valors que podem assignar a les tres primeres són

$$abc, acb, bac, bca, cab, cba.$$

D'aquests casos, els únics que són favorables a encertar només la quarta són els dos darrers. Els mateix valor ens sortiria si calculéssim els casos favorables a encertar exactament la primera, la segona o la tercera. Els casos favorables en total són 8 i la probabilitat serà  $8/24 = 1/3$ .

Si hem d'encertar exactament dues cartes, el parell de cartes encertades es pot triar de  $C_4^2 = 6$  maneres diferents, i si per exemple hem d'encertar la tercera i la quarta, els valors que podem assignar a la primera i la segona són

$$ab, ba$$

i només aquest últim fa que no s'encerti ni a primera ni la segona. Els casos favorables són 6 i la probabilitat és  $6/24 = 1/4$ .

Encertar exactament tres cartes és impossible.

Calculeu la probabilitat d'encertar totes les cartes, i la de no encertar-ne cap.

### Solució del problema PR67

Posem  $I_n = n\mathbb{Z} = \{nz : z \in \mathbb{Z}\}$ . Aleshores es demana la probabilitat del succés

$$A = (I_2 \cup I_5) \cap \overline{I_3} \cap \overline{I_4} \cap \overline{I_6},$$

## Probabilitat

on  $\overline{I_n} = \mathbb{Z} - I_n$ . Cal recordar que  $I_n \cap I_m = \{z \in \mathbb{Z} : z = n i \text{ i } z = m\} = I_r$ , on  $r = \text{mcm}(m, n)$ . Cal recordar també que si  $M$  i  $N$  són successos, llavors

$$P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N)$$

i, com que  $M \cap \overline{N} = M - (M \cap N)$ ,

$$P(M \cap \overline{N}) = P(M) - P(M \cap N).$$

Ara cal aplicar aquestes fórmules a l'esdeveniment  $A$ .

## PROBLEMES DE PROBABILITAT\*

Jordi Dou Mas de Xexàs

**Problema 1.** (Núm 527. Proposat al CM, Vol 6 Núm 3 Març 80. Resolt al Vol 7 Núm 3 Març 81.)

Sou a la cantonada d'una gran ciutat formada per illes quadrades totes iguals, i volem passejar. Tireu una moneda enlaire: si surt cara, gireu cap a la dreta, si surt creu, gireu cap a l'esquerra; repetiu aquest procediment a cada cantonada. Quina és la probabilitat que torneu a ser al punt de partida després de caminar  $n$  trams?

*Solució literal de Jordi Dou.* Els trams de lloc senar són tots paral·lels i han de ser-ne la meitat de cada sentit. Anàlogament, els de lloc parell. Per tant  $n$  ha de ser múltiple de 4. Tot això per tal de poder tornar al punt d'origen. Està clar que si  $n = 4k$ , el nombre de camins diferents per a tornar al lloc d'origen sera

$$\binom{2k}{k}^2$$

i el nombre total de camins possibles és  $2^{2k} \cdot 2^{2k} = 2^n$ . La probabilitat  $P(n)$  serà nul·la per a  $n \neq 4k$  i, per a  $n = 4k$ , serà

$$P(n) = \frac{\binom{2k}{k}^2}{2^n}.$$

Barcelona, maig de 1980

\* La Societat Catalana de Matemàtiques té la intenció de publicar una selecció de problemes proposats o resolts per Jordi Dou a diverses revistes del món. La col·lecció de problemes de Jordi Dou és de tal magnitud, que la tasca s'haurà de fer de mica en mica. En aquesta edició del llibre comencem a presentar problemes de probabilitat que Jordi Dou va trametre a CRUX MATHEMATICORUM, amb alguns comentaris de l'autor o de l'editor de la revista.

**Problema 2.** (Núm 807. Proposat al CM, Vol 9 Núm 1 Març 83. Resolt al Vol 10 Núm 4 Abril 84.)

Traiem a l'atzar tres boles d'una urna que conté  $b$  boles blanques i  $r$  boles vermelles. La probabilitat que les tres boles siguin blanques és  $p$ . Si l'urna hagués contingut una bola blanca més, la probabilitat de treure'n tres de blanques hagués estat  $4p/3$ . Trobeu tots els possibles valors de  $b$  i  $r$ .

*Solució literal de Jordi Dou.* Tenim

$$p = \frac{b(b-1)(b-2)}{(b+r)(b+r-1)(b+r-2)}, \quad \frac{4p}{3} = \frac{(b+1)b(b-1)}{(b+r+1)(b+r)(b+r-1)}.$$

Posem  $b-2 = x$ ,  $b+r-2 = y$  i tindrem

$$\frac{3}{4} = \frac{x(y+3)}{y(x+2)} \quad \text{o bé} \quad y = \frac{12x}{9-x} = \frac{108}{9-x} - 12.$$

Els possibles valors de  $x$  són 0, 3, 5, 6, 7, 8. Els parells  $(b, r)$  possibles són (5, 3), (7, 10), (8, 18), (9, 35) i (10, 88).

**Problema 3.** (Núm 499. Proposat per Jordi Dou al CM Vol 5 Núm 10 Desembre 79. Resolt al Vol 6 Núm 10 Desembre 80.)

Un cert poliedre té totes les arestes de longitud unitat. Una formiga es mou al llarg de les arestes de manera que quan arriba a un vèrtex eligeix sortir-ne, amb igual probabilitat, per una aresta diferent de la d'arribada. El valor mitjà del camí seguit des un vèrtex fins ell mateix és de 6 per uns vèrtexs i de 7.5 per als altres. Trobeu el volum del poliedre.

*Solució literal de Jordi Dou.* Siguin  $V_i$ , ( $1 \leq i \leq n$ ) els vèrtexs,  $a_i$  el nombre d'arestes de cada  $V_i$ ,  $\sum a_i = 2a$ ,  $V_s$  el vèrtex de sortida,  $E_s^*$  el valor mitjà de  $V_s$  a  $V_s$ ,  $E_r^h$  el valor mitjà de  $V_r$  arribant del vèrtex contigu  $V_h$  fins a  $V_s$ .  $E_s^s = 0$ . Tindrem  $a_s E_s^* = a_s + \sum E_i^s$  (per a tot  $i$  tal que  $V_i$  sigui contigu a  $V_s$ ).

$$E_r^h = 1 + \frac{1}{a_r - 1} \sum E_i^r \quad \text{per a tot } i \text{ tal que } V_i \text{ és contigu a } V_r, i \neq h.$$

Sumant totes les  $2a - a_s + 1$  igualtats tenim  $a_s E_s^* = 2a$  ja que qualsevol  $E_r^h$ , ( $h, r \neq s$ ) figura al segon membre de les  $a_h - 1$  igualtats

$$E_h^j = 1 + \frac{1}{a_h - 1} \sum E_i^h \quad j \text{ tal que } V_j \text{ és contigu de } V_h, j \neq r.$$


O sigui que, per a tot vèrtex  $V_k$  és

$$E_k^* = \frac{2a}{a_k}$$

Aquest resultat ens diu que només hi ha dos valors diferents entre els  $a_i$ , essent el seu quocient  $6/7.5$ . Aquest valors només poden ser 4 i 5. Tindrem  $2a = 47.5 = 5 \cdot 6 = 30$  d'on  $a = 15$ . Els nombres  $n_4$  i  $n_5$  de vèrtexs de 4 i 5 arestes, respectivament, han de complir  $4n_4 + 5n_5 = 30$  d'on surt  $n_4 = 5$  i  $n_5 = 2$ . Com que el nombre de cares és  $10 = 17 + 2 - 7$ , seran totes traingles (equilàters) i el políedre estarà format per dues piràmides pentagonals unides per les bases.

El volum es calcularà: costat pentàgon = 1, radi  $R = 1/10\sqrt{50 + 10\sqrt{5}}$ , apotema  $\alpha = \sqrt{25 + 10\sqrt{5}}$ , altura piràmide  $h = 1/10\sqrt{50 - 10\sqrt{5}}$ ,

$$\text{VOLUM: } V = 2 \cdot \frac{1}{3} h \cdot \frac{5}{2} \alpha = \frac{5}{3} h \alpha = \frac{1}{12} \sqrt{30 + 10\sqrt{5}} \sim 0.603.$$



$$\begin{aligned} \overline{VA} &= \overline{AB} = 1 \\ \overline{OA} &= R = 0.85065 \\ \overline{OM} &= \alpha = 0.68819 \\ \overline{OV} &= h = 0.52573 \end{aligned}$$

Barcelona enero 1980

JORDI DOU

ARQUITECTE

*Nota de l'editor de CRUX MATHEMATICORUM:* "Clearly, the point of this problem was simply to identify the polyhedron in question, and asking point-blank for its volume was nothing but a piece of bravura on the part of the Spanish proposer. *Olé!*"

**Problema 4.** (Núm 833. Proposat al CM Vol 9 Núm 4 Abril 83. Resolt al Vol 10 Núm 7 Agost-Setembre 80.)

- Quin és l'enter més gran, format per una permutació dels nou dígitos no nuls, que és divisible per 99?
- Quin és el més petit d'aquest nombres divisible per 99?
- Si els 9 dígitos no nuls es posen a l'atzar, quina és la probabilitat que el número que resulti sigui divisible per 99?
- Responen les qüestions a), b) i c) si es consideren números formats per tots els deu dígitos, excloent els que comencen en 0.

*Solució literal de Jordi Dou.* Per tal que la permutació sigui divisible per 11 ( i per 99), la suma dels 4 dígitos que ocupen lloc parell ha de ser 17 (A) o 28 (B). Els nou (A) casos possibles són 1259, 1268, 1349, 1358, 1367, 1457, 2348, 2357 i 2456. Els dos casos (B) possibles són 4789 i 5689.

a) El més gran serà 987652413.

b) El més petit serà 123475869.

El nombre total de 99 serà  $(9 + 2)4!5! = 31680$ .

c) La probabilitat buscada serà

$$\frac{31680}{9!} = \frac{11}{2 \cdot 3^2 \cdot 7} \sim 0.0873 \sim \frac{1}{11.45} \left( < \frac{1}{11} \right).$$

Si hi intervenen els deu dígitos, els 5 dígitos senars seran els ja expressats, agregant-hi el 0 i els seus complementaris. Per al càlcul del nombre de múltiples de 99, s'haurà de restar els nombres que tenen un 0 inicial, que són 31680. O sigui que el nombre total de 99 serà  $2 \cdot 11 \cdot 5!5! - 31680 = 285120 (= 9 \cdot 31680)$ .

a/d) El màxim serà 9876524130.

b/d) El mínim serà 1024375869.

c/d) La probabilitat serà

$$\frac{285120}{(10! - 9!)} = \frac{9 \cdot 31680}{9 \cdot 9!} = \text{la mateixa que a c)}$$

Barcelona, juny de 1983.

*La revista CM no publica la solució de Jordi Dou, segurament per massa succinta, ja que la publicada és molt prolixa. Jordi Dou, però, hi afegeix una nota en castellà, que la revista reproduceix íntegrament en anglès*

*Nota de l'editor de CRUX MATHEMATICORUM: "Comment by Jordi Dou, Barcelona, Spain. Parts (a), (b), and (c) of this problem were proposed in Madrid in 1933 at an examination for professors in which I took part. We were also asked to find the sum,  $\Sigma$ , of all the numbers concerned (permutations of nine nonzero digits which are divisible by 99). If  $\Sigma(A)$  denotes the sum of all those odd-position digits sum to 28, then*

$$\Sigma(A) = 9 \cdot 4!5! \left( 101010101 \frac{28}{5} + 10101010 \frac{17}{4} \right) = 15\,774\,545\,441\,952;$$

*and if  $\Sigma(B)$  denotes the sum of all whose odd-position digits sum to 17, then*

$$\Sigma(B) = 2 \cdot 4!5! \left( 101010101 \frac{17}{5} + 10101010 \frac{28}{4} \right) = 2\,385\,454\,541\,184.$$

Thus

$$\Sigma = \Sigma(A) + \Sigma(B) = 18\,159\,999\,983\,136.$$

It was a pleasure for me to rework this problem on its fiftieth anniversary, but armed, this time, with a calculator and in the tranquillity of retirement."

---

*El problema següent va ser proposat per Jordi Dou en homenatge a l'editor de CRUX, Léo Sauvé. Va ser publicada la proposta i la solució del proponent excepcionalment en castellà.*

**Problema 5.** (Núm 600. Proposat al CM Vol 7 Núm 1 Gener 81. Resolt al Vol 8 Núm 2 Febrer 82.) (Popuesta para CRUX dedicada al Prof. Léo Sauvé.)

En una urna hay 4 bolas señaladas con las letras C, R, U, X. Se extraen sucesivamente  $n$  bolas con devolución. Sea  $P_n$  la probabilidad de que aparezca CRUX en 4 extracciones sucesivas.

a) Calcular el valor mínimo de  $n$  para que  $P_n > 0.99$ .

b) Hallar una fórmula explícita de  $P_n$  en función de  $n$ .

*Solució literal de Jordi Dou publicada al CM.* Entre las  $4^n$  variaciones de orden  $n$  de los 4 elementos de  $\{C, R, U, X\}$ , sea  $A_n$  el número de las que no contienen CRUX.  $A_1 = 4$ ,  $A_2 = 16$ ,  $A_3 = 64$ ,  $A_4 = 255$ ,  $A_5 = 1016$ , ... y en general  $A_n = 4A_{n-1} - A_{n-4}$ , ya que entre las  $A_{n-1}$  variaciones de orden  $n-1$  hay  $A_{n-4}$  que terminan en CRU y por tanto

$$A_n = 4(A_{n-1} - A_{n-4}) + 3A_{n-4}.$$

a) Llamando  $a_n = A_n/A_{n-1}$ , se tiene

$$4 = a_2 = a_3 > a_4 > a_5 > \dots > a_n > a$$

siendo  $a \neq 0$  el valor que satisface  $a^n = 4a^{n-1} - a^{n-4}$ . ( $a \sim 3.984188231$ .)

Sea  $\bar{P}_n = 1 - P_n$ . Se tendrá  $\bar{P}_n = A_n 4^{-n}$ . Sea  $p_n = \bar{P}_n/\bar{P}_{n-1}$ ; tenemos

$$1 = p_2 = p_3 > p_4 > \dots > p_n > p = a/4 \sim 0.9727478027,$$

$$\bar{P}_{10} = A_{10} 4^{-10} = 0.9727478027,$$

$$p_{11} = \frac{A_{11}}{4A_{10}} = \frac{4063872}{41020000} = 0.996047058.$$

Tendremos  $\bar{P}_{10} p^{n-10} < \bar{P}_n < \bar{P}_n p_1^{n-10}$ . Poniendo  $\bar{P}_n = 0.01$ ,

$$n^{-10} > \frac{\log 0.01 - \log \bar{P}_{10}}{\log p} \sim 1155.7.$$

Vemos que

$$\bar{P}_{1165} > 0.9727470.996047^{1155} \sim 0.0100277,$$

y que

$$\bar{P}_{1166} < 0.9727480.996048^{1156} \sim 0.0099997,$$

por tanto  $P_{1165} < 0.99 < P_{1166}$ . Luego  $n = 1166$ .

b) Sea

$$\varphi(n) = 4^n - \binom{n-3}{1} 4^{n-4} + \binom{n-6}{2} 4^{n-8} - \dots = \sum_{0 \leq i \leq n/4} (-1)^i \binom{n-3i}{i} 4^{n-4i}.$$

Para  $n = 1, 2, 3, 4, 5$  se tiene  $\varphi(n) = A_n$ . Si suponemos  $A_i = \varphi(i)$  para  $i < n$  se tiene

$$A_n = 4A_{n-1} - A_{n-4} = 4\varphi(n-1) - \varphi(n-4),$$

y siendo

$$4(-1)^i \binom{n-1-3i}{i} 4^{n-1-4i} - (-1)^{i-1} \binom{n-4-3(i-1)}{i-1} 4^{n-4-4(i-1)} = (-1)^i \binom{n-3i}{i} 4^{n-4i},$$

tendremos  $4\varphi(n-1) - \varphi(n-4) = \varphi(n) = A_n$ .  $P_n = 1 - \bar{P}_n = (4^n - A_n) 4^{-4i}$ , luego

$$P_n = \sum_{1 \leq i \leq n/4} (-1)^{i+1} \binom{n-3i}{i} 4^{-4i}.$$

En una sucesión  $A_i$ :  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_i = 4A_{i-1} - A_{i-4}$ , tal que  $a_2 \geq a_3 \geq a_4 \geq a$  (que es el caso del problema), claro que las  $a_i$  son decrecientes.

El resultado  $n = 1166$  de a) puede obtenerse fácilmente de la expresión de  $P_n$  hallada en b). Para el cálculo de  $P_{1166}$  con error menor que  $10^{-6}$  basta calcular los 20 primeros términos. Claro que el método utilizado en la solución, basado en la rápida convergencia de  $a_n$  o  $p_n$  es más simple.

*Editor's comment.*

The linguistic policy of this journal is to publish in French and English only. This time, exceptionally, we decided to honour our distinguished proposer, who recently retired from the Escola Tècnica Superior Arquitectura de Barcelona after a lifetime of service to mathematics and architecture, by publishing his solution in the original Castilian.



## POLINOMIS

Lluís Bibiloni i Matos, Pelegrí Viader i Canals

### Introducció

Designarem un polinomi de grau  $n$  de la variable  $x$  mitjançant la notació

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Així,  $a_k$  sempre denotarà el coeficient del monomi de grau  $k$ . En principi els coeficients seran nombres reals i, aleshores, direm que  $P(x)$  és un polinomi a coeficients reals i escriurem  $P(x) \in \mathbb{R}[x]$  (o complexos,  $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ , encara que llavors s'acostuma a especificar aquesta circumstància).

El grau d'un monomi  $a_k x^k$ ,  $a_k \neq 0$ , és el nombre natural  $k$ . El grau d'un polinomi és el grau del monomi de grau màxim. Les constants es consideren polinomis de grau 0. El polinomi 0, és a dir, el polinomi idènticament nul, no té grau. En la major part dels problemes, els coeficients acostumen a ser enters ( $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ ) o racionals ( $P(x) \in \mathbb{Q}[x]$ ). Cal recordar que els polinomis són una subclasse de les expressions algebraiques d'una variable. Són les expressions algebraiques enteres, és a dir, que les operacions que lliguen les variables i els coeficients són la suma, la resta i la multiplicació.

**Definició.** Dos polinomis o, en general, dues expressions algebraiques de qualsevol nombre de variables s'anomenen *equivalents* si prenen el mateix valor numèric per a qualsevol sistema de valors que assignem a les variables.

Exemples d'expressions equivalents són les ben conegudes identitats de suma i diferència del quadrat d'un binomi; en símbols:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

## Polinomis

o la seva generalització coneguda com la fórmula del binomi de Newton. En el cas important  $a = 1, b = x$  la fórmula de Newton agafa la forma:

$$(1+x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n.$$

### El principi d'identitat

**Definició.** Un polinomi s'anomena *idènticament nul* quan els seus coeficients són zero.

**Definició.** Dos polinomis s'anomenen *idèntics* quan tenen el mateix grau i els mateixos coeficients.

Per tant, dos polinomis són idèntics quan la seva diferència és un polinomi idènticament nul. La importància d'aquestes definicions rau en el

**Principi d'Identitat.** Dos polinomis són idèntics si, i només si, són equivalents.

*Esquema d'una demostració:* Si  $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$  i  $Q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$  són equivalents (s'acostuma a escriure  $P(x) \equiv Q(x)$ ), en particular han de coincidir per  $x = 0$  de manera que  $a_0 = P(0) = Q(0) = b_0$ , així, doncs, per a tot valor d' $x$  serà

$$a_1x + \cdots + a_nx^n = b_1x + \cdots + b_mx^m.$$

Això es pot escriure

$$xP_1(x) = x(a_1 + \cdots + a_nx^{n-1}) = x(b_1 + \cdots + b_mx^{m-1}) = xQ_1(x)$$

per a tot valor d' $x$ . En altres paraules  $xP_1(x) \equiv xQ_1(x)$ . D'això en podem concloure que  $P_1(x) = Q_1(x)$  sempre que  $x \neq 0$  però per poder derivar que  $a_1 = b_1$  (i arribar a una demostració per inducció), necessitem poder assegurar que  $P_1(0) = Q_1(0)$  i això s'ha de demostrar. Coneixeu algun argument que garanteix la veritat d'aquesta afirmació?

Per una demostració alternativa vegeu el problema PL5

A l'hora de resoldre problemes, la conseqüència més important del Principi d'Identitat és l'anomenat *mètode dels coeficients indeterminats*. Explicarem en què consisteix aquest mètode resolent el següent problema de tothom conegut.

Les solucions de l'equació  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$  admeten l'expressió

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Solució. és obvi que les solucions de l'equació de segon grau  $\gamma(x - \alpha)^2 + \beta = 0$  són

$$x_1 = \alpha + \sqrt{-\frac{\beta}{\gamma}}, \quad x_2 = \alpha - \sqrt{-\frac{\beta}{\gamma}}.$$

D'altra banda, és clar que si dos polinomis són equivalents, han de tenir les mateixes arrels. Per tant, el problema quedarà resolt si sabem determinar  $\alpha, \beta$  i  $\gamma$  de manera que  $ax^2 + bx + c$  i  $\gamma(x - \alpha)^2 + \beta$  siguin equivalents. és evident que  $\gamma(x - \alpha)^2 + \beta$  és equivalent a  $\gamma x^2 - 2\gamma\alpha x + \gamma\alpha^2 + \beta$  i del principi d'identitat obtenim que aquest últim polinomi i  $ax^2 + bx + c$  són equivalents si, i només si,

$$\begin{cases} a = \gamma \\ b = 2\gamma\alpha \\ c = \gamma\alpha^2 + \beta. \end{cases}$$

Queda a càrrec del lector discutir i resoldre aquest sistema d'equacions en les incògnites  $\alpha, \beta$  i  $\gamma$  i acabar el problema a la seva satisfacció.

PL1. Trobeu tots els nombres primers de la forma  $n^4 + 4$ .

Indicació: Factoritzeu el polinomi  $x^4 + 4$  en producte de dos polinomis de segon grau utilitzant el mètode dels coeficients indeterminats.

PL2. (XXIV Olimpíada Espanyola.) Calculeu per a qualsevol valor del paràmetre enter  $t$ , solucions enteres  $x, y$  de l'equació

$$y^2 = x^4 - 22x^3 + 43x^2 + 858x + t^2 + 10452(t + 39)$$

Algunes identitats remarcables

- $\frac{x^n - a^n}{x - a} = x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1}$
- $\frac{x^n + a^n}{x - a}$  la divisió no és exacta.
- Si  $n$  és senar:  $\frac{x^n + a^n}{x + a} = x^{n-1} - ax^{n-2} + a^2x^{n-3} - \dots - a^{n-2}x + a^{n-1}$
- Si  $n$  és parell:  $\frac{x^n + a^n}{x + a}$  la divisió no és exacta.
- Si  $n$  és parell:  $\frac{x^n - a^n}{x + a} = x^{n-1} - ax^{n-2} + a^2x^{n-3} - \dots + a^{n-2}x - a^{n-1}$ .
- Si  $n$  és senar:  $\frac{x^n - a^n}{x + a}$  la divisió no és exacta.

El cas  $a = 1$  és de molta importància (suma dels  $n$  primers termes d'una progressió geomètrica):

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = x^{n-1} + x^{n-2} + x^{n-3} + \dots + x + 1.$$

De passada, ja que som aquí, esmentem que

$$\frac{1}{1 - x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad (\text{sèrie infinita}). \text{ La igualtat val només si } |x| < 1.$$

D'aquí, per substitució directa s'obté (per  $|x| < 1$ ):

$$\frac{1}{1 + x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad (\text{signes alternats}).$$

$$\frac{1}{1 - x^2} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$$

$$\frac{1}{1 - x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + x^{3k} + \dots$$

**PL3.** Demostreu que per a tot  $n = 0, 1, 2, \dots$ ,

$$\frac{1 - x^{2n+1}}{1 - x} = (1 + x)(1 + x^2) \dots (1 + x^{2^n}).$$

Aritmètica de Polinomis

Suposem conegudes les operacions algebraiques habituals, incloent la divisió entera de polinomis i la propietat fonamental que afirma el grau del producte de dos polinomis és la suma dels graus dels factors.

Les propietats que llistem a continuació són vàlides pels polinomis a coeficients racionals, reals i complexos.

• Càlcul del *màxim comú divisor* de dos polinomis utilitzant l'algorisme d'Euclides. Si  $R(x)$  és el residu de dividir  $P(x)$  per  $Q(x)$ , els divisors comuns de  $P(x)$  i  $Q(x)$  són els mateixos que els divisors comuns de  $Q(x)$  i  $R(x)$ . L'algorisme consisteix en anar fent les divisions següents:

$$\begin{array}{ll} P(x) = C_1(x)Q(x) + R_1(x) & \text{grau de } R_1(x) < \text{grau de } Q(x); \\ Q(x) = C_2(x)R_1(x) + R_2(x) & \text{grau de } R_2(x) < \text{grau de } R_1(x); \\ R_1(x) = C_3(x)R_2(x) + R_3(x) & \text{grau de } R_3(x) < \text{grau de } R_2(x); \\ \dots & \dots \\ R_{k-2}(x) = C_k(x)R_{k-1}(x) + R_k(x) & \text{grau de } R_k(x) < \text{grau de } R_{k-1}(x); \\ R_{k-1}(x) = C_{k+1}(x)R_k(x). & \end{array}$$

Si  $R_k(x)$  és una constant, direm que  $\text{mcd}(P(x), Q(x)) = 1$ , i que  $P(x)$  i  $Q(x)$  són primers entre sí. En altre cas,  $\text{mcd}(P(x), Q(x)) = R_k(x)$ .

• *Mínim comú múltiple*. Es pot calcular com el producte dels polinomis dividit pel *màxim comú divisor*.

• *Concepte de polinomi irreductible*: Un polinomi és *irreductible* o *primer* quan no es pot expressar com a producte de polinomis de grau inferior. Cal parar compte en el fet que un polinomi pot ser irreductible a  $\mathbb{Q}[x]$  i ser reductible, per exemple, a  $\mathbb{R}[x]$  o a  $\mathbb{C}[x]$ . Trobeu-ne exemples.

• Igual que en el cas dels nombres enters, tenim el

**Teorema de la factorització única.**: Tot polinomi a coeficients racionals es pot expressar de manera única com a producte de polinomis irreductibles.

• *Avaluació d'un polinomi per un valor concret de la variable utilitzant el: Teorema del residu*: El residu de dividir  $P(x)$  per  $x - a$  és  $P(a)$ . La divisió és convenient fer-la pel mètode de Ruffini.

**PL4.** Demostreu que  $x^2 - 2$  és irreductible a  $\mathbb{Q}[x]$ .

### Arrels

Si  $P(a) = 0$ , es diu que el nombre  $a$  és una *arrel* del polinomi  $P(x)$ . Fixeu-vos que si  $a$  es una arrel de  $P(x)$ , el teorema del residu ens afirma que  $x - a$  és un divisor de  $P(x)$ , és a dir,  $P(x) = C(x)(x - a)$ .

**PL5.** Demostreu que un polinomi de grau  $n > 0$  no pot tenir més de  $n$  arrels.

Utilitzeu aquest resultat per derivar una demostració del Principi d'Identitat. (De fet, es tracta de provar una afirmació més forta que implica aquest enunciat: vegeu el problema següent).

**PL6.** Demostreu que si un polinomi de grau  $n$  s'anulla per més de  $n$  valors de la variable, aleshores el polinomi és idènticament nul.

Quan s'admeten arrels complexes, el resultat contingut en el problema **PL5** es completa amb l'important:

**Teorema Fonamental de l'àlgebra**, que ens assegura que un polinomi de grau  $n$  té exactament  $n$  arrels, que poden ser complexes.

Això implica que en el camp complex, els únics polinomis irreductibles són els polinomis de grau 1.

Si els coeficients del polinomi són nombres reals, les arrels complexes s'han de presentar de dues en dues ja que si  $a + bi$  és arrel,  $a - bi$  (el complex conjugat) també ho és (demostru-ho). Això justifica el següent resultat: *un polinomi amb coeficients reals i grau imparell té almenys una arrel real.*

Si  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  són les  $n$  arrels del polinomi  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  de grau  $n$ , el polinomi admet la descomposició en factors lineals:

$$P(x) = a_n(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n).$$

S'ha de parar compte amb el  $a_n$  del davant, és fàcil d'oblidar-lo. Si hi ha arrels múltiples, els factors iguals es poden agrupar:

$$P(x) = a_n(x - \alpha_1)^{r_1}(x - \alpha_2)^{r_2} \cdots (x - \alpha_s)^{r_s}.$$

La relació

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \equiv a_n(x - \alpha_1)^{r_1}(x - \alpha_2)^{r_2} \cdots (x - \alpha_s)^{r_s}$$

i el Principi d'identitat impliquen que els coeficients de  $P(x)$  s'expressen en funció de les seves arrels mitjançant les anomenades fórmules de Cardano:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

$$\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \cdots + \alpha_{n-1}\alpha_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

$$\alpha_1\alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2\alpha_4 + \cdots + \alpha_{n-2}\alpha_{n-1}\alpha_n = -\frac{a_{n-3}}{a_n}$$

...

$$\alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n},$$

és a dir, la suma de tots els possibles productes de  $k$  arrels és exactament el coeficient de  $x^{n-k}$  dividit per  $a_n$  amb signe  $(-1)^k$ .

PL7. L'equació  $x^3 + 3x^2 + qx + 3q = 0$  té dues solucions que sumen 0. Calculeu, si és possible, el coeficient  $q$  i trobeu totes les solucions.

Els primers membres de les fórmules de Cardano tenen la propietat de ser invariants per permutacions de les arrels (és a dir, són *funcions simètriques* de les seves variables, cosa que vol dir que no canvien de valor si intercanviem  $\alpha_i$  per  $\alpha_j$ , etc.). són les anomenades *funcions simètriques elementals*. Un resultat important i útil a l'hora de resoldre problemes és el teorema següent: *Qualsevol funció racional simètrica de les arrels d'un polinomi s'expressa com a funció racional dels coeficients i reciprocament.*

A la pràctica, trobar l'expressió concreta d'una determinada funció simètrica de les arrels no és fàcil. Per exemple:

PL8. Siguin  $a, b, c$  les arrels del polinomi  $x^3 - 2x^2 + x + 5$ . Trobeu el valor de  $a^4 + b^4 + c^4$ .

PL9. (XXVII Olimpíada Espanyola.) Considereu l'equació  $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ ,  $r \neq 0$ , que suposem admet tres arrels reals i positives,  $a, b, c$ . Determineu la relació que ha de lligar els nombres  $p, q$  i  $r$  per tal que els tres nombres  $a, b, c$  puguin ésser les longituds dels costats d'un triangle.

(Indicació: Suposeu les arrels ordenades  $a \geq b \geq c$  i expresseu la condició de poder formar triangle com una desigualtat que involucri una funció simètrica de  $a, b, c$ .)

De les relacions de Cardano, l'última és la més útil. Ens diu que el producte de totes les arrels i  $a_n$  és igual al terme independent, amb el signe corresponent:

$$a_n\alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_n = (-1)^n a_0.$$

Si els coeficients del polinomi són enters, llavors aquesta última relació ens demostra que si  $\alpha_k$  és una arrel entera del polinomi, ha de ser forçosament un dels divisors de  $a_0$  amb signe + o -. No és difícil deduir també que si  $\alpha_k$  és una arrel fraccionària del polinomi, diguem  $p/q$ , llavors  $p$  ha de ser un divisor de  $a_0$  (amb signe + o -) i  $q$  ha de ser un divisor de  $a_n$ . En particular, si  $a_n = 1$  el polinomi no pot tenir arrels fraccionàries, llevat de les enteres.

No és difícil tampoc obtenir el següents resultats:

**PL10.** Si  $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ , i  $P(0)$  i  $P(1)$  són imparells, el polinomi no té arrels enteres.

**PL11.** Si cap dels nombres  $P(-1), P(0), P(1)$  és múltiple de 3, el polinomi  $P \in \mathbb{Z}[x]$  no té arrels enteres.

**PL12.** Si un polinomi té una arrel de multiplicitat  $r$ , el polinomi derivat té també la mateixa arrel amb multiplicitat  $r - 1$ . Com a conseqüència, si un polinomi no té arrels múltiples,  $\text{mcd}(P(x), P'(x)) = 1$ .

Si  $\alpha$  és arrel múltiple de  $P(x)$  de grau  $n$ , també és arrel del polinomi  $P(x) - Q(x) \cdot P'(x)$  on  $Q(x)$  és qualsevol polinomi. Un cas particular interessant és dona quan  $Q(x) = x/n$  ja que aleshores els polinomi  $P(x) - P'(x) \cdot (x/n)$  té grau  $n - 1$ .

## Fitació de les arrels

Hi ha moltes maneres de donar fites superiors de les arrels positives d'un polinomi. Una de senzilla i fàcil d'obtenir és la fita de MacLaurin: totes les arrels positives es mantenen inferiors que el nombre  $1 + N/a_n$  on  $N$  és el màxim valor absolut dels coeficients negatius. En general es compleix:

### Regla de Laguerre-Thibault.

Si en dividir un polinomi per  $x - L$ , (on  $L$  és un nombre positiu) tots els coeficients del quocient i el residu són positius,  $L$  és una fita superior de les arrels del polinomi. Una manera pràctica de fer això és efectuar la divisió per Ruffini i observar que tots els signes del resultat són positius.

**PL13.** Demostreu la Regla de Laguerre-Thibault i que la fita de MacLaurin és realment una fita superior de les arrels.



**Regla de Descartes.**

Si  $P(x)$  té els coeficients reals, el nombre total d'arrels reals positives (comptant multiplicat) és inferior o igual al nombre total de canvis de signe en els coeficients (se suposa el polinomi ben ordenat; si alguns coeficients són 0, no s'han de tenir en compte per a calcular el nombre de canvis de signe). De la mateixa manera, el nombre total d'arrels reals negatives (comptant multiplicat) és inferior o igual al nombre total de canvis de signe en els coeficients del polinomi  $P(-x)$ . En qualsevol cas, la diferència entre el nombre d'arrels i el nombre de canvis de signe és sempre un nombre *parell*. La Regla de Descartes només és útil en determinades condicions "extremes". Si no hi ha canvis de signe, llavors *segur* que no hi ha arrels positives; si només hi ha un canvi de signe *segur* que només hi ha una arrel positiva.

**PL14.** Verifiqueu que el polinomi  $x^{11} + x^8 - 3x^5 + x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2$  té com a màxim 5 arrels positives i 2 de negatives. Demostreu que, com a mínim, té 4 arrels complexes.

**PL15.** (XXIII Olimpíada Espanyola.) Per a cada nombre natural  $n$  considerem el polinomi

$$P_n(x) = x^{n+2} - 2x + 1.$$

- Demostreu que l'equació  $P_n(x) = 0$  té una arrel  $c_n$  i només una a l'interval  $(0, 1)$ .
- Calculeu  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ .

*Canvis de variable*

**PL16.** Demostreu que si en un polinomi canviem  $x$  per:

- $-x$ , aleshores les arrels canvien de signe.
- $x + a$ , aleshores les arrels queden sumades amb  $-a$ .
- $\beta x$ , aleshores les arrels queden multiplicades per  $1/\beta$ .
- $1/x$ , aleshores les arrels queden invertides.

(S'entén sempre que ens referim a la relació entre les arrels del nou polinomi i les del vell.)

Aquests últims resultats són força útils en molts problemes. Canviar la  $x$  per  $x - a$  pot ser difícil en alguns casos, donat el càlcul que això representa. De vegades, per a fer això,

pot ser útil recordar el *Teorema de Taylor*:

$$P(x) = P(a) + \frac{P'(a)}{1!}(x-a) + \frac{P''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{P'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{P^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Si fem  $a = 0$ , trobem una manera interessant d'expressar els coeficients d'un polinomi:  $a_k = P^{(k)}(0)/k!$

### Polinomis especials

**PL17.** Els polinomis de la forma  $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a$  amb  $a \neq 0$  s'anomenen polinomis recíprocs de quart grau. Demostreu

a) Si  $\alpha$  és arrel, aleshores  $1/\alpha$  també ho és.

b) Es poden trobar les arrels dividint tot el polinomi per  $x^2$  i fent el canvi  $y = x + 1/x$ .

Els polinomis de la forma  $x^n - 1$  són especialment importants. Les seves arrels són fàcils de trobar:  $x = \sqrt[n]{1}$ .

Recorrent a la radicació complexa mitjançant la fórmula de Moivre:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^k = \cos k\theta + i \sin k\theta,$$

s'obté

$$1, \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}, \cos \frac{4\pi}{n} + i \sin \frac{4\pi}{n}, \dots, \cos \frac{2(n-1)\pi}{n} + i \sin \frac{2(n-1)\pi}{n}.$$

Aquests nombres complexos, tots de mòdul 1, s'anomenen les *arrels  $n$ -èsimes de la unitat*. Si les dibuixem al pla complex, es distribueixen regularment sobre el cercle unitat i unint els extrems dels afixos corresponents obtenim un  $n$ -àgon regular. Entre aquestes arrels  $n$ -èsimes de la unitat n'hi ha que tenen la propietat de "generar" totes les altres en el sentit següent:  $\xi^0, \xi^1, \xi^2, \xi^3, \dots, \xi^{n-1}$  són totes les arrels  $n$ -èsimes de la unitat. Direm que  $\xi$  és una *arrel primitiva  $n$ -èsima de la unitat*.

### PL18.

a) Trobeu les arrels primitives sisenes de la unitat.

b) Sigui  $\zeta = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ . Demostreu que  $\zeta^k$  és una arrel primitiva  $n$ -èsima de la unitat si i només si  $k$  i  $n$  son primers entre si.

(Suggeriment: Si recordeu la funció  $\varphi(n)$  (l'indicador d'Euler), podem dir que el nombre total d'arrels primitives  $n$ -èsimes de la unitat és  $\varphi(n)$ .)

PL19. Es defineix  $\Phi_n(x)$  com el  $n$ -èsim polinomi ciclotòmic de la següent manera:

$$\Phi_n(x) = (x - \xi_1)(x - \xi_2) \cdots (x - \xi_{\varphi(n)})$$

on  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\varphi(n)}$  són totes les arrels primitives  $n$ -èsimes de la unitat. Comproveu que

a)  $\Phi_2(x) = x + 1$

b)  $\Phi_3(x) = x^2 + x + 1$

c)  $\Phi_4(x) = x^2 + 1$

d)  $\Phi_5(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

e)  $\Phi_6(x) = x^2 - x + 1$

Conjectureu com serà  $\Phi_p(x)$  si  $p$  és primer i demostreu la vostra conjectura.

Tots els polinomis ciclotòmics són irreductibles sobre els enters o els racionals, és a dir, no admeten descomposicions en factors de grau més petit amb coeficients racionals.

## Problemes

PL20. Demostreu que la mitjana geomètrica de dos nombres és sempre menor o igual que la seva mitjana aritmètica.

PL21. (Olimpíada Austríaca). Trobeu tots els enters positius  $n$  pels quals l'equació de segon grau

$$a_{n+1}x^2 - 2x\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{n+1}^2} + (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = 0$$

té arrels reals per a qualssevol nombres reals  $a_1, a_2, \dots, a_n$ .

PL22. (Olimpíada Russa, Leningrad). Siguin  $P_1, P_2$  i  $P_3$  polinomis de segon grau amb coeficient principal positiu i arrels reals. Demostreu que, si cada parell d'ells té una arrel comuna, llavors el polinomi  $P_1 + P_2 + P_3$  té també arrels reals.

**PL23.** (Mathematics Magazine). Demostreu que el polinomi  $x^4 - 5x^3 - 4x^2 - 7x + 4$  no té arrels negatives.

**PL24.** Si les arrels del polinomi  $x^3 + ax^2 + bx + c$  estan

a) en progressió aritmètica, demostreu que  $2a^3 - 9ab + 27c = 0$ .

b) en progressió geomètrica, demostreu que  $a^3c = b^3$ .

**PL25.** (Olimpíada Internacional). Demostreu que

$$\cos \frac{\pi}{7} - \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} = \frac{1}{2}.$$

**PL26.** (15th IMO, 1973). Siguin  $a$  i  $b$  nombres reals pels quals l'equació

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$$

té almenys una solució real. Per a tots aquests parells  $(a, b)$ , trobeu el mínim valor de  $a^2 + b^2$ .

**PL27.** Calculeu la suma  $1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2^3 + \dots + n \cdot 2^{n-1}$ .

**PL28.** (XXIV Olimpíada Catalana). Demostreu que per a qualsevol polinomi  $p(x)$  existeix un nombre real  $k$  tal que un dels dos polinomis  $p(x) + k$  i  $xp(x) + k$  no té cap arrel real i l'altre en té només una.

**PL29.** Inscrivim un heptàgon regular en el cercle de radi unitat. Demostreu que la longitud del costat és una arrel del polinomi  $x^6 - 7x^4 + 14x^2 - 7$ .

PL30. El producte de dues de les quatre arrels de

$$x^4 - 18x^3 + kx^2 + 200x - 1984$$

és -32. Determineu  $k$ .

PL31. Demostreu que tot polinomi té un múltiple polinomial no zero (és a dir el polinomi multiplicat per un altre polinomi), els exponents del qual són tots divisibles per 1000000.

PL32. Demostreu que

$$\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{3} + \dots + n\binom{n}{n} = n2^{n-1}.$$

PL33. Demostreu que

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}.$$

PL34. (XXIII Olimpíada Espanyola.) Demostreu que per a tot nombre natural  $n > 1$  es compleix

$$1 \cdot \sqrt{\binom{n}{1}} + 2 \cdot \sqrt{\binom{n}{2}} + 3 \cdot \sqrt{\binom{n}{3}} + \dots + n \cdot \sqrt{\binom{n}{n}} \leq \sqrt{2^{n-1} n^3}.$$

### Mostra de solucions

#### Solució del problema PL2

Un polinomi de quart grau  $Q(x)$ , sempre admet una representació de la forma  $Q(x) \equiv (p(x))^2 + q(x)$  amb  $q(x)$  de primer grau. Només cal escriure  $p(x) = ax^2 + bx + c$  i determinar  $a, b, c$  per minimitzar el grau de  $Q(x) - (p(x))^2$ . També ho podeu fer completant quadrats.

Sigui, doncs,  $Q(x) = x^4 - 22x^3 + 43x^2 + 858x + t^2 + 10452(t+39)$ . és clar que per eliminar els monomis de quart i de tercer grau de  $Q(x) - (p(x))^2$  haurà de ser  $a = 1$  i  $b = -11$  Si escrivim  $p(x) = x^2 - 11x + c$ , per tal de determinar  $c$  fem

$$Q(x) - (p(x))^2 = (-2c - 78)x^2 + (22c + 858)x - c^2 + t^2 + 10452(t+39)$$

de manera que  $-2c - 78 = 0$  equival a  $c = -39$  (quina casualitat!!). El coeficient de primer grau, passa a valer, aleshores,  $22(-39) + 858 = 0$  (una altra casualitat, segurament). Resumint,

$$Q(x) = (x^2 - 11x - 39)^2 + t^2 + 10452(t+39) - 39^2.$$

El terme independent es pot escriure  $t^2 - 39^2 + 10452(t+39) = (t+39)(t-39) + 10452(t+39)$  i per tant,  $(t+39)(t+10452-39)$ . Fent el canvi de variable

$$t = s - \frac{10452 - 39 + 39}{2} = s - \frac{10452}{2} = s - 5226,$$

agafa la forma  $(s - 5187)(s + 5187) = s^2 - 5187^2$ . El problema inicial es pot reformular demanant que per cada valor del paràmetre enter  $s$  es trobin solucions enteres  $x, y$  de l'equació

$$y^2 = (x^2 - 11x - 39)^2 + s^2 - 5187^2$$

que és equivalent a l'equació

$$y^2 - s^2 = (x^2 - 11x - 39)^2 - 5187^2.$$

En arribar aquest punt, val a dir que l'enunciat del problema sinó ambigu, com a mínim, és confús. Si no es llegeix amb atenció, hom pot pensar que es demanen totes les solucions i, aleshores, el problema no es raonable, tal com veurem més endavant.

Un cop convençuts que allò que es demana és trobar algunes solucions enteres  $x, y$  per a cada valor del paràmetre  $s$  (o  $t = s - 5226$ ) es pot procedir de la següent manera. Fent  $y = \pm s$ ,  $x, y$  seran solucions si  $(x^2 - 11x - 39)^2 = 5187^2$  i, resulta (de nou, casualment) que l'equació  $x^2 - 11x - 39 = 5187$  equivalent a  $x^2 - 11x - 5226$  té les solucions  $x_1 = -67, x_2 = 78$  de manera que per a cada  $t$  enter,  $x = -67, y = \pm(t - 5226)$  i  $x = 78, y = \pm(t - 5226)$  són quatre solucions del tipus que es demanen.

Des d'un punt de vista estricte, per donar el problema per acabat cal, encara, explicar perquè es raonable suposar que el problema no pot demanar altra cosa. Per a cada valor enter de  $x$ ,  $n(x) = (x^2 - 11x - 39)^2 - 5187^2$  és un enter que admet una expressió en

diferència de quadrats. Resoldre  $y^2 - s^2 = n(x)$  equival a trobar totes les descomposicions de  $n(x)$  en diferència de quadrats. Aquest és un problema que depèn de la descomposició de  $n$  en factors primers. De fet és fàcil provar i ho deixem com exercici pel lector, que a cada descomposició d'un enter  $m$  en producte de dos factors,  $m = ab$  de la mateixa paritat, li correspon una representació com a diferència de quadrats. Per exemple, un nombre relativament petit com  $4725 = 2^3 5^2 7$  admet 12 representacions, essencialment diferents, en diferència de dos quadrats.

Per últim direm, que si hem dedicat tant d'espai en aquest problema no es pas perquè el considerem especialment enriquidor, ans al contrari, perquè ningú no dediqui a la seva solució, mes temps d'aquell que és convenient.

### Solució del problema PL8

L'expressió  $a^4 + b^4 + c^4$  és una funció simètrica de les arrels; per tant es pot expressar com a funció dels coeficients. Si  $a$  és arrel del polinomi  $x^3 - 2x^2 + x + 5$  s'ha de complir que  $a^3 - 2a^2 + a + 5 = 0$ . Així, si dividim  $a^4$  entre  $a^3 - 2a^2 + a + 5$  tindrem

$$a^4 = (a + 2)(a^3 - 2a^2 + a + 5) + 3a^2 - 7a - 10 = 3a^2 - 7a - 10.$$

Igualment

$$b^4 = 3b^2 - 7b - 10 \quad \text{i} \quad c^4 = 3c^2 - 7c - 10.$$

O sigui que

$$\begin{aligned} a^4 + b^4 + c^4 &= 3a^2 - 7a - 10 + 3b^2 - 7b - 10 + 3c^2 - 7c - 10 = \\ &= 3(a^2 + b^2 + c^2) - 7(a + b + c) - 30. \end{aligned}$$

Ara,

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + ac + bc)$$

i, per les relacions de Cardano,

$$a + b + c = 2, \quad ab + ac + bc = 1$$

i tenim

$$a^4 + b^4 + c^4 = 3 \cdot (2^2 - 2 \cdot 1) - 7 \cdot 2 - 30 = -38.$$

**Solució del problema PL26**

Tenim una equació recíproca de 4rt grau. Dividint per  $x^2$  i fent el canvi  $y = x + 1/x$  resulta  $y^2 + ay + (b - 2) = 0$ . El canvi efectuat dóna  $x^2 - yx + 1 = 0$ . Per tal que  $x$  sigui real, la  $y$  ha de complir  $y^2 - 4 \geq 0$  i per tant  $|y| \geq 2$ . Com que l'equació en  $y$  és  $y^2 + ay + b - 2 = 0$ , les arrels seran

$$y = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4(b - 2)}}{2}$$

Si una d'elles ha de ser  $|y| \geq 2$ , aleshores  $|a| + \sqrt{a^2 - 4(b - 2)} \geq 4$ . D'aquí traiem  $8|a| \geq 8 + 4b$ . Simplificant, elevant al quadrat i sumant  $4b^2$  als dos costats obtenim  $4a^2 + 4b^2 \geq 5b^2 + 4b + 4$  d'on

$$a^2 + b^2 \geq \frac{5}{4} \left( b^2 + \frac{4}{5}b + \frac{4}{5} \right) = \frac{5}{4} \left( b + \frac{2}{5} \right)^2 + \frac{4}{5}$$

El mínim del segon membre es dóna quan  $b = -2/5$  i val exactament  $4/5$ . El corresponent valor de  $a$  és  $4\sqrt{5}/5$  i, efectivament, per aquests valors de  $a$  i  $b$  es compleixen les condicions del problema.

**Solució del problema PL27**

$$\begin{aligned} 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} &= \frac{d}{dx}(x + x^2 + \dots + x^n) = \\ &= \frac{d}{dx} \frac{x^{n+1} - x}{x - 1} = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

Substituint  $x$  per 2, obtenim la suma desitjada:  $2^n(n-1) + 1$ .

**Solució del problema PL29**

El costat de l'heptàgon és  $2 \sin \pi/7$ . Aplicant la fórmula de De Moivre:

$$\left( \cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7} \right)^7 = \cos \pi + i \sin \pi$$

Igualant parts imaginàries, tenim:

$$-64 \sin^7 \frac{\pi}{7} + 112 \sin^5 \frac{\pi}{7} - 56 \sin^3 \frac{\pi}{7} + 7 \sin \frac{\pi}{7} = 0$$

Ara només cal substituir  $\sin \frac{\pi}{7}$  per  $l/2$ .



## NOMBRES COMPLEXOS

*Cristóbal Sánchez Rubio*

### Introducció

És habitual trobar a la majoria de textos la introducció als nombres complexos amb l'argument "natural" de resoldre l'equació quadràtica

$$x^2 + 1 = 0,$$

com a pas previ al fet que tota equació de segon grau tingui dues solucions. No obstant, històricament no va anar així, ja que la resolució mitjançant radicals de l'equació polinòmica de segon grau era perfectament coneguda pels algebristes italians del Renaixement. Una equació de segon grau en el camp real té dues solucions, una o cap; situacions que es corresponen des del punt de vista geomètric amb el fet que una circumferència (o una cònica) i una recta es tallin en dos punts, un o cap. Res no exigia haver de resoldre l'equació  $x^2 + 1 = 0$ .

Més important era buscar una fórmula per a la resolució de l'equació polinòmica de grau tres. Quan aquesta fórmula es descobreix (Tartaglia i Cardano en el segle XVI) apareix la situació següent que és ben sorprenent:

Si l'equació general polinòmica de tercer grau

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

la transformem en una de la forma

$$x^3 + px + q = 0$$

dividint per  $a$  i després fent un canvi de variable del tipus  $x = x' - \frac{b}{3}$ , en resoldre aquesta darrera equació s'arriba a la fórmula

$$x = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} - \frac{p}{3\sqrt[3]{\frac{-q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}}$$

## Nombres Complexos

Considerem un polinomi de tercer grau amb tres arrels reals conegudes,  $-2$ ,  $1 + \sqrt{3}$  i  $1 - \sqrt{3}$ ,

$$(x+2)(x-1-\sqrt{3})(x-1+\sqrt{3}) = (x+2)(x^2-2x-3) = x^3-6x-4.$$

Si apliquem la fórmula de resolució a l'equació  $x^3 - 6x - 4 = 0$  prenent els dos signes + s'obté:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-4}} + \frac{2}{\sqrt[3]{2 + \sqrt{-4}}} = \sqrt[3]{2 + 2\sqrt{-1}} + \frac{2}{\sqrt[3]{2 + 2\sqrt{-1}}}.$$

On són les arrels de l'equació donada si la seva existència és inqüestionable?

En primer lloc ens apareix l'expressió  $\sqrt{-1}$  que en principi no té significat. Des d'un punt de vista purament formal podem operar amb el símbol  $\sqrt{-1}$  sense preocupar-nos pel seu significat i només fent servir que el seu quadrat és  $-1$ .

Com que

$$\begin{aligned} (-1 - \sqrt{-1})^3 &= -1 + 3\sqrt{-1} - 3(\sqrt{-1})^2 + (\sqrt{-1})^3 = 2 + 2\sqrt{-1} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \sqrt[3]{2 + 2\sqrt{-1}} = -1 + \sqrt{-1} \end{aligned}$$

podem intentar el càlcul de  $x$

$$\begin{aligned} x &= \sqrt[3]{2 + 2\sqrt{-1}} + \frac{2}{\sqrt[3]{2 + 2\sqrt{-1}}} = -1 + \sqrt{-1} + \frac{2}{-1 + \sqrt{-1}} = \\ &= -1 + \sqrt{-1} + 2 \frac{-1 - \sqrt{-1}}{1 + 1} = -2. \end{aligned}$$

Les altres dues arrels apareixen en prendre els altres dos valors de les arrels cúbiques. Aquesta relació amb nombres com  $\sqrt{-1}$  l'existència dels quals era més que qüestionable a l'època (d'aquí el nom d'"imaginari") i que tanmateix servien per a obtenir les solucions reals d'una equació va tardar dos segles a formalitzar-se i fou el problema que de d'una manera "natural" exigí el maneig de les arrels quadrades de nombres negatius.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Per a un estudi complet de les fórmules per a la resolució de les equacions de tercer i quart grau vegeu per exemple *Àlgebra moderna* de G. Birkhoff i S. MacLane. Ed. Vicens Vives. Pàgina 121

## El punt de vista formal

Podem definir els complexos com el conjunt  $\mathbb{C} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$  amb les operacions:

$$(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b')$$

$$(a, b) \cdot (a', b') = (aa' - bb', ab' + a'b).$$

És fàcil comprovar que és un cos commutatiu.

Per la definició que s'ha donat de  $\mathbb{C}$  com a parells ordenats, és important fer notar que dos complexos són iguals si i només si ho són els seus dos components

$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ i } b = b'.$$

Podem destacar-ne els següents elements algebraicament distingits:

- Element neutre de la suma:  $(0, 0)$ .
- Element neutre del producte:  $(1, 0)$ .
- Element oposat de  $(a, b)$ :  $-(a, b) = (-a, -b)$ .
- Element invers de  $(a, b)$ :  $\frac{1}{(a, b)} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2}\right)$ , definit per a tot parell

diferent de  $(0, 0)$ .

També és senzill comprovar que identificant qualsevol nombre real  $a$  amb el parell  $(a, 0)$ , els nombres reals queden "submergits" en el conjunt  $\mathbb{C}$ . Només cal anul·lar el segon component i comprovar que les operacions definides abans coincideixen amb la suma i el producte ordinaris de nombres reals. D'ara endavant si  $a$  és un nombre real utilitzarem indistintament la notació  $a$  o el parell  $(a, 0)$ .

Si posem  $i = (0, 1)$ , és immediat comprovar que  $i^2 = -1$  i clarament tenim:

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a + bi$$

que és l'anomenada forma binòmica d'un nombre complex.

És habitual dir part real al primer component del parell  $(a, b)$  i al segon dir-ne part imaginària.

Els complexos que tenen part real nul·la s'anomenen imaginaris purs. En particular  $i = (0, 1)$  s'anomena unitat imaginària. Com que  $i^2 = -1$ , des d'un punt de vista formal podem posar  $i = \sqrt{-1}$ .

Quan no sigui indispensable d'explicitar les parts real i imaginària d'un complex el designarem simplement  $z$  i indicarem respectivament per  $\operatorname{Re}(z)$  i  $\operatorname{Im}(z)$  les seves parts real i imaginària.

## Nombres Complexos


**Definició.** Donat un complex  $z = a + bi$ , definim el conjugat de  $z$  i el designem per  $\bar{z}$ , el complex  $a - bi$ .

Són de comprovació immediata les propietats següents:

$$\overline{z \pm z'} = \bar{z} \pm \bar{z}', \quad \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}', \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'} \quad (z' \neq 0), \quad \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

### Interpretació geomètrica. Mòdul i argument d'un nombre complex.

Si representem el parell ordenat  $(a, b)$  sobre el pla de la manera usual (el primer component a l'eix horitzontal i el segon al vertical), obtenim, per a cada complex, un punt que anomenem afix del complex. Quan no hi hagi possibilitat de confusió identificarem punt i nombre complex. Del pla així conformat se'n diu pla complex; de l'eix horitzontal se'n sol dir eix real i del vertical, imaginari.



Si tracem el vector amb origen a l'origen  $O$  de coordenades i extrem a l'afix  $P$  de  $z = (a, b)$ , i anomenant  $\varphi$  l'angle format per la part positiva de l'eix real i el vector  $\overrightarrow{OP}$ , tenim les relacions següents:

$$\begin{aligned} \overline{OP} &= \sqrt{a^2 + b^2} & \tan \varphi &= b/a \\ a &= \overline{OP} \cos \varphi & b &= \overline{OP} \sin \varphi \end{aligned}$$

El nombre real positiu que mesura la distància de  $O$  a  $P$  ( $\overline{OP}$ ) s'anomena mòdul del complex  $z$  i es representa per  $|z|$ . L'angle  $\varphi$  està determinat pel parell  $(a, b) \neq (0, 0)$  llevat d'un múltiple de  $2\pi$ ; per això diem que  $\varphi$  és un *argument* de  $z$  i escriurem  $\arg(z)$ . Si volem determinar un únic argument per a  $z$ , només cal restringir  $\varphi$  a un interval semiobert de longitud  $2\pi$  que normalment és  $[0, 2\pi)$ .

Amb aquestes definicions i notacions, les relacions anteriors queden així:

$$(1) \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$(2) \quad a = |z| \cos \varphi, \quad b = |z| \sin \varphi.$$

Tenint present que la imatge geomètrica de la conjugació és una simetria respecte l'eix real i que  $|z|$  és una distància, són esperables les propietats següents la demostració de les quals es proposa com exercici.

Exercici 1.  $z\bar{z} = |z|^2$ .

Exercici 2.  $|z| = 0 \iff z = 0$ .

Exercici 3.  $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ .

Exercici 4.  $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$ .

Exercici 5.  $|\bar{z}| = |z|$ .

Exercici 6.  $|zz'| = |z||z'|$ .

Exercici 7. Si  $z' \neq 0$ , llavors  $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$ .

Exercici 8. Si  $zz' = 0$ , llavors  $z = 0$  o bé  $z' = 0$ . (Aquesta propietat es pot enunciar equivalentment: Si  $zz' = 0$  i  $z \neq 0$ , llavors  $z' = 0$ .)

Exercici 9.  $|z| = 1$  si i només si  $\frac{1}{z} = \bar{z}$ .

Exercici 10. Desigualtat triangular:  $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ . Quan es compleix la igualtat?

### Forma trigonomètrica d'un complex

Per simplificar la notació posem  $r = |z|$ ,  $r' = |z'|$  i siguin  $\varphi = \arg(z)$ ,  $\varphi' = \arg(z')$ . Per (2), tenim

$$z = a + bi = r \cos \varphi + ir \sin \varphi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad (3)$$

Aquesta manera de representar un nombre complex s'anomena diu forma trigonomètrica i és especialment útil a l'hora de multiplicar dos complexos.

En efecte, siguin els complexos  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ,  $z' = r'(\cos \varphi' + i \sin \varphi')$ . Calculem el producte  $zz'$

$$\begin{aligned} zz' &= r(\cos \varphi + i \sin \varphi)r'(\cos \varphi' + i \sin \varphi') = \\ &= rr'(\cos \varphi \cos \varphi' - \sin \varphi \sin \varphi' + i(\sin \varphi \cos \varphi' + \cos \varphi \sin \varphi')) = \\ &= rr'(\cos(\varphi + \varphi') + i \sin(\varphi + \varphi')). \end{aligned} \quad (4)$$

L'expressió (4) ens indica que en multiplicar dos complexos es multipliquen els seus mòduls i se sumen els seus arguments.

Posant  $z = z'$  a (4), resulta

$$z^2 = r^2(\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$$

i reiterant el procés  $n$  vegades queda

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi) \quad (5)$$

## Nombres Complexos

coneguda con la fórmula de Moivre.

Com que  $\cos(-\varphi) = \cos \varphi$  i  $\sin(-\varphi) = -\sin \varphi$ , resulta

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r(\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \frac{1}{r} \frac{\cos \varphi - i \sin \varphi}{(\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \varphi - i \sin \varphi)} = \frac{1}{r} (\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)).$$

Ara podem estendre (4) al quocient i (5) a exponents negatius.

$$\frac{z}{z'} = z \frac{1}{z'} = \frac{r}{r'} (\cos(\varphi - \varphi') + i \sin(\varphi - \varphi'))$$

i si  $n \geq 0$ , llavors

$$z^{-n} = r^{-n} (\cos n\varphi - i \sin n\varphi).$$

### Raons trigonomètriques d'angles múltiples

Segui  $z$  un complex de mòdul 1 i argument  $\varphi$ . Si calculem  $z^n$  mitjançant (5) i pel binomi de Newton, desenvolupem, i separem les parts real i imaginària obtenim

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi = \binom{n}{0} \cos^n \varphi + \binom{n}{1} \cos^{n-1} \varphi i \sin \varphi + \dots + \binom{n}{n} i^n \sin^n \varphi$$

i tenint present que  $i^{4k} = 1$ ,  $i^{4k+1} = i$ ,  $i^{4k+2} = -1$ ,  $i^{4k+3} = -i$ , resulta

$$\begin{aligned} \cos n\varphi &= \binom{n}{0} \cos^n \varphi - \binom{n}{2} \cos^{n-2} \varphi \sin^2 \varphi + \dots \pm \binom{n}{p} \cos^{n-p} \varphi \sin^p \varphi \\ \sin n\varphi &= \binom{n}{1} \cos^{n-1} \varphi \sin \varphi - \binom{n}{3} \cos^{n-3} \varphi \sin^3 \varphi + \dots \pm \binom{n}{q} \cos^{n-q} \varphi \sin^q \varphi \end{aligned}$$

on si  $n$  és parell,  $p = n$ ,  $q = n - 1$  i si  $n$  és imparell,  $p = n - 1$ ,  $q = n$ .

Per exemple per a  $n = 5$ , resulta:

$$\begin{aligned} \cos 5\varphi &= \cos^5 \varphi - 10 \cos^3 \varphi \sin^2 \varphi + 5 \cos \varphi \sin^4 \varphi \\ \sin 5\varphi &= 5 \cos^4 \varphi \sin \varphi - 10 \cos^2 \varphi \sin^3 \varphi + \sin^5 \varphi \end{aligned}$$

i d'aquestes se'n dedueix:

$$\tan 5\varphi = \frac{5 \tan \varphi - 10 \tan^3 \varphi + \tan^5 \varphi}{1 - 10 \tan^2 \varphi + 5 \tan^4 \varphi}.$$

El fet d'expressar  $\cos n\varphi$  com un polinomi en  $\cos \varphi$  condueix a igualtats interessants entre raons trigonomètriques amb arguments expressats mitjançant un nombre enter de graus.

Per exemple si a l'expressió anterior de  $\cos 5\varphi$ , escrivim les potències parelles de  $\sin \varphi$  en funció de  $\cos \varphi$ , queda:

$$\cos 5\varphi = \cos^5 \varphi - 10 \cos^3 \varphi (1 - \cos^2 \varphi) + 5 \cos \varphi (1 - \cos^2 \varphi)^2 = 16 \cos^5 \varphi - 20 \cos^3 \varphi + 5 \cos \varphi$$

posant  $x = \cos \varphi$  i  $p = \cos 5\varphi$  resulta l'equació

$$16x^5 - 20x^3 + 5x - p = 0$$

les cinc arrels de la qual són,

$$\cos \varphi, \quad \cos(\varphi + 72^\circ), \quad \cos(\varphi + 144^\circ), \quad \cos(\varphi + 216^\circ), \quad \cos(\varphi + 288^\circ).$$

Aplicant les fórmules de Cardano-Vieta a l'equació polinòmica anterior, el producte de les arrels val

$$\cos \varphi \cos(\varphi + 72^\circ) \cos(\varphi + 144^\circ) \cos(\varphi + 216^\circ) \cos(\varphi + 288^\circ) = \frac{\cos 5\varphi}{16}.$$

Particularitzant per a qualsevol valor de  $\varphi$  i reduint els angles a l'interval  $[0, 180^\circ]$  s'obtenen curioses igualtats:

$$\text{Per a } \varphi = 9^\circ \implies \cos 9^\circ \cos 63^\circ \cos 81^\circ \cos 153^\circ = -\frac{1}{16}.$$

$$\text{Per a } \varphi = 12^\circ \implies \cos 12^\circ \cos 84^\circ \cos 132^\circ \cos 156^\circ = \frac{1}{16}.$$

NC1. Proveu les igualtats següents:

a)  $4 \cos 10^\circ \cos 50^\circ \cos 70^\circ = \cos 30^\circ$ .

b)  $4 \sin 1^\circ \sin 59^\circ \sin 61^\circ = \sin 3^\circ$ .

(Indicació. Expressau  $\cos 3x$  en funció de  $\cos x$  i utilitzeu les fórmules de Cardano-Vieta.)

NC2. Proveu les igualtats següents:

a)  $\tan 15^\circ + \tan 75^\circ = 4$ .

b)  $\tan 20^\circ - \tan 40^\circ + \tan 80^\circ = 3 \tan 60^\circ$ .

c)  $\tan 25^\circ \tan 35^\circ \tan 85^\circ = \tan 75^\circ$ .

(Indicació. Expressau  $\tan 3x$  en funció de  $\tan x$  i utilitzeu les fórmules de Cardano-Vieta.)

Sempre és possible expressar  $\cos n\varphi$  en funció únicament de  $\cos \varphi$  utilitzant dos mètodes diferents: El primer consisteix a posar  $\cos^2 \varphi = 1 - \sin^2 \varphi$  a

$$\cos n\varphi = \binom{n}{0} \cos^n \varphi - \binom{n}{2} \cos^{n-2} \varphi \sin^2 \varphi + \dots \pm \binom{n}{p} \cos^{n-p} \varphi \sin^p \varphi$$

## Nombres Complexos

i com que totes les potències de  $\sin \varphi$  són parelles s'arriba al resultat desitjat. El segon mètode consisteix a procedir per recurrència i això ens porta a uns polinomis amb propietats interessants anomenats polinomis de Chebyshev i que no són d'altres que els que resulten d'expressar  $\cos n\varphi$  en funció de  $\cos \varphi$  i els designarem per  $T_n$ . D'acord amb la notació habitual de polinomis posarem  $x = \cos \varphi$  (el que suposa imposar a  $x$  la condició  $-1 \leq x \leq 1$ ). Llavors pel que hem abans es pot escriure:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x).$$

D'altra banda, la igualtat trigonomètrica

$$\cos(n+1)\varphi + \cos(n-1)\varphi = 2 \cos \varphi \cos n\varphi$$

es pot escriure en termes dels  $T_n$  com

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2xT_n(x)$$

relació que, en principi, només és vàlida per a  $-1 \leq x \leq 1$ , però sent els  $T_k(x)$  polinomis, ho és per a tot  $x$ .

Per tant la relació recurrent:

$$T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

ens permet calcular els polinomis de Chebyshev.

De tot l'anterior es dedueixen algunes propietats de demostració senzilla, com és ara:

- Tots els coeficients de  $T_n(x)$  són enters i el coeficient de  $x^n$  és  $2^{n-1}$ .
- $T_n(x)$  té  $n$  arrels reals en l'interval  $[-1, 1]$ .
- Els extrems de  $T_n(x)$  a  $[-1, 1]$  són  $-1$  i  $+1$ .

La primera és conseqüència de la relació de recurrència i les altres dues s'obtenen fàcilment a partir de les relacions  $x = \cos \varphi$  i  $T_n(x) = \cos n\varphi$ . En efecte, com que  $T_n(x)$  té grau  $n$  i  $\cos n\varphi = 0$  s'anul·la pels  $n$  valors

$$\cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

de l'interval  $[-1, 1]$ , podem factoritzar  $T_n$  en la forma

$$T_n(x) = 2^{n-1} \left(x - \cos \frac{\pi}{2n}\right) \left(x - \cos \frac{3\pi}{2n}\right) \cdots \left(x - \cos \frac{(2n-1)\pi}{2n}\right)$$



i les dues últimes propietats són immediates.

*Exercici 11.* És sempre possible expressar  $\sin n\varphi$  en funció exclusivament de  $\sin \varphi$ ?  
(Indicació. Distingiu entre  $n$  parell i senar.)

### Arrels $n$ -èsimes d'un nombre complex

Donat un complex  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  busquem tots els complexos  $z' = r'(\cos \varphi' + i \sin \varphi')$  tals que  $(z')^n = z$ .

Utilitzant la fórmula de Moivre, resulta

$$(r')^n (\cos n\varphi' + i \sin n\varphi') = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

i com que els mòduls han de ser iguals i els arguments han de diferir en un múltiple de  $2\pi$ , queda

$$r' = \sqrt[n]{r}, \quad n\varphi' = \varphi + 2k\pi.$$

Hi ha exactament  $n$  arguments diferents, corresponents al valors  $k = 0, 1, \dots, n-1$ .

Resumint,

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left( \cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Òbviament en la representació geomètrica, els afixos corresponents a les arrels  $n$ -èsimes d'un complex donat  $z$  són els vèrtexs d'un polígon regular de  $n$  costats centrat a l'origen.

Fent a la fórmula anterior  $r = 1$  i  $\varphi = 0$ , obtenim els  $n$  complexos  $u_k$  donats per:

$$u_k = \cos \varphi_k + i \sin \varphi_k \quad \text{essent } \varphi_k = \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

que són les  $n$  arrels  $n$ -èsimes de la unitat. Sobre el pla complex es representen en els vèrtexs d'un  $n$ -àgon regular inscrit a la circumferència unitat.

L'estructura del conjunt  $U_n = \{u_k \mid (u_k)^n = 1\}$  de les arrels  $n$ -èsimes de la unitat és especialment interessant degut a la següent propietat:

Si multipliquem una arrel  $n$ -èsima qualsevol  $z'$  de  $z$  per una arrel  $n$ -èsima de la unitat s'obté una altra arrel  $n$ -èsima de  $z$ .

En efecte, si  $(z')^n = z$ , llavors  $(z'u_k)^n = (z')^n (u_k)^n = (z')^n 1 = z$ .

Per tant, en multiplicar una arrel qualsevol  $z'$  per tots els elements de  $U_n$  s'obtenen totes les arrels  $n$ -èsimes de  $z$ .

En multiplicar elements de  $U_n$  el resultat pertany a  $U_n$ , en particular qualsevol potència d'un element de  $U_n$  també pertany a  $U_n$  ja que  $((u_k)^p)^n = ((u_k)^n)^p = 1^p = 1$ .

Arrels primitives de la unitat. Polinomis ciclotòmics.

Sigui  $u_k$  un element de  $U_n$  i considerem el conjunt de les  $n$  primeres potències de  $u_k$

$$V_k = \{u_k, u_k^2, \dots, u_k^n\}.$$

Les arrels  $u_k$  tals que  $V_k = U_n$  s'anomenen arrels primitives de la unitat.

*Exercici 12.* Per a un  $n$  donat, proveu que  $u_k$  és arrel primitiva si i només si  $k$  i  $n$  són primers entre ells.

Si  $n$  és primer, aleshores totes les arrels  $n$ -èsimes de 1 són primitives, llevat del propi 1. Si  $n$  no és primer, el nombre d'arrels primitives coincideix amb el nombre de nombres primers amb  $n$  i més petits que  $n$  que es designa per  $\varphi(n)$ .

Si designem per  $u_1, u_2, \dots, u_{\varphi(n)}$  el conjunt de les arrels primitives per a un  $n$  donat, definim el polinomi

$$\Phi_n(z) = (z - u_1)(z - u_2) \cdots (z - u_{\varphi(n)})$$

Aquest polinomi de grau  $\varphi(n)$  s'anomena *polinomi ciclotòmic* d'ordre  $n$  i té una gran importància en el següent problema clàssic de geometria: Per a quins valors de  $n$  és possible construir amb regla i compàs un polígon regular de  $n$  costats? La resposta és que un tal polígon és constructible amb regla i compàs si i només si l'equació ciclotòmica corresponent  $\Phi_n(z) = 0$  és resoluble per radicals de segon grau, és a dir si les arrels de l'equació poden expressar-se usant radicals quadràtics.<sup>2</sup>

Els polinomis  $\Phi_n(z)$  poden calcular-se recurrentment ja que totes les arrels  $n$ -èsimes de la unitat compleixen l'equació

$$(6) \quad z^n - 1 = 0.$$

Separant l'arrel  $z = 1$ , queda

$$(7) \quad \frac{z^n - 1}{z - 1} = z^{n-1} + z^{n-2} + \dots + z + 1.$$

<sup>2</sup> Gauss provà als 19 anys que això és possible per als valors de  $n$  tals que els seus factors primers imparells són "primers de Fermat" diferents entre ells i només per a aquests valors. Un nombre s'anomena primer de Fermat quan és un primer del tipus:  $F_k = 2^{2^k} + 1$  per a algun  $k$ . Els únics primers de Fermat que es coneixen són:  $F_0 = 3$ ,  $F_1 = 5$ ,  $F_2 = 17$ ,  $F_3 = 257$ ,  $F_4 = 65537$ .

Si  $n$  és primer, el polinomi (7) coincideix amb  $\Phi_n(z)$ , i si  $n$  no és primer cal separar-ne les arrels no primitives que estan agrupades en els polinomis  $\Phi_d(z)$  per als divisors  $d$  de  $n$ . En aquest cas cal dividir el polinomi (7) pels polinomis  $\Phi_d(z)$  amb  $d$  divisor de  $n$ . Els primers polinomis ciclotòmics són:

$$\Phi_2(z) = \frac{z^2 - 1}{z - 1} = z + 1$$

$$\Phi_3(z) = \frac{z^3 - 1}{z - 1} = z^2 + z + 1$$

$$\Phi_4(z) = \frac{z^4 - 1}{(z - 1)\Phi_2} = \frac{z^3 + z^2 + z + 1}{z + 1} = z^2 + 1$$

$$\Phi_5(z) = \frac{z^5 - 1}{z - 1} = z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$$

$$\Phi_6(z) = \frac{z^6 - 1}{(z - 1)\Phi_2\Phi_3} = \frac{z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1}{(z + 1)(z^2 + z + 1)} = z^2 - z + 1$$

**NC3.** Resoleu l'equació  $\Phi_5(z) = 0$  i trobeu l'expressió de les quatre arrels amb radicals de segon ordre

$$z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$$

*Solució.*

Dividint per  $z^2$  i completant el quadrat de  $z + \frac{1}{z}$ , l'equació es pot posar en la forma:

$$\left(z + \frac{1}{z}\right)^2 + \left(z + \frac{1}{z}\right) - 1 = 0$$

que resolent-la respecte la incògnita  $z + \frac{1}{z}$  resulta:

$$z + \frac{1}{z} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Per facilitar l'escriptura posarem  $p = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$  i  $q = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ .

Finalment resolent les equacions quadràtiques  $z^2 - pz + 1 = 0$ ,  $z^2 - qz + 1 = 0$  s'obtenen les quatre arrels de l'equació inicial:

$$z_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4} + \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4}i,$$

$$z_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{4} + \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}i,$$

$$z_3 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{4} - \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}i,$$

$$z_4 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4} - \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4}i.$$

## Nombres Complexos

Les expressions anteriors confirmen la possibilitat de construir amb regla i compàs el pentàgon regular.

### L'exponencial complexa. Fórmula d'Euler.

Sembla natural preguntar-nos què significa  $e^z$  si  $z$  és un nombre complex. Si  $z = a + bi$ , llavors haurà de ser

$$e^z = e^{a+bi} = e^a e^{bi}.$$

El primer factor és conegut en ser  $a$  un nombre real, i el problema rau a atribuir un valor i un "significat" al segon.

Sembla lògic exigir que sigui quin sigui el valor que li donem, es conservin les propietats formals de les operacions amb potències tals com:

$$(8) \quad e^{\alpha i + \beta i} = e^{\alpha i} e^{\beta i}, \quad e^{\alpha i - \beta i} = \frac{e^{\alpha i}}{e^{\beta i}}, \quad (e^{\alpha i})^k = e^{k\alpha i}.$$

Suposem que

$$e^{i\alpha} = a + bi.$$

Suposem també que la igualtat ha de subsistir en canviar  $i$  per  $-i$

$$e^{-i\alpha} = a - bi.$$

Multiplicant ambdues igualtats resulta  $1 = a^2 + b^2$ , és a dir que  $|e^{i\alpha}| = 1$ .

Per tant  $e^{i\alpha}$  és un complex de mòdul 1 i ha de tenir la forma  $\cos \beta + i \sin \beta$ .

Vegem finalment perquè sembla raonable que  $\alpha = \beta$

Si  $\alpha \rightarrow 0$ , llavors hem d'esperar que  $e^{i\alpha} \rightarrow 1$ , i això exigeix que  $\cos \beta \rightarrow 1$  i  $\sin \beta \rightarrow 0$ ; és a dir, per a valors "petits" de  $\alpha$ , els dos angles  $\alpha$  i  $\beta$  han de ser molt semblants.

Si prenem  $\alpha = \beta$  és immediat comprovar que es compleixen totes les propietats de (8). En efecte, les dues primeres es converteixen en les conegudes fórmules trigonomètriques del sinus i cosinus d'una suma i d'una diferència d'angles i la tercera és la fórmula de Moivre.

En definitiva podem donar la següent:

**Definició.**

$$(9) \quad e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$$

com una definició raonable i motivada.<sup>3</sup>

Si fem  $\alpha = \pi$  obtenim la cèlebre igualtat

$$e^{i\pi} - 1 = 0$$

atribuïda a Euler i que relaciona els cinc nombres més "importants" del càlcul,  $e$ ,  $i$ ,  $\pi$ ,  $1$  i  $0$ .

Una conseqüència interessant de (9) és la següent:

$$e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$$

$$e^{-i\alpha} = \cos \alpha - i \sin \alpha$$

sumant i restant resulta

$$\cos \alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \quad (10)$$

Són múltiples els resultats que es deriven de l'aplicació a fórmules trigonomètriques de la definició (9) i la seva conseqüència (10). Vegem-ne unes quantes:

NC4. Demostreu:

$$a) \cos^3 \varphi = \frac{3}{4} \cos \varphi + \frac{1}{4} \cos 3\varphi.$$

$$b) \sin^3 \varphi = \frac{3}{4} \sin \varphi - \frac{1}{4} \sin 3\varphi.$$

Solució de l'apartat a).

Per (10), tenim:

$$\begin{aligned} \cos^3 \varphi &= \left( \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \right)^3 \iff 2^3 \cos^3 \varphi = e^{3i\varphi} + 3e^{2i\varphi}e^{-i\varphi} + 3e^{i\varphi}e^{-2i\varphi} + e^{-3i\varphi} = \\ &= 3(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) + (e^{3i\varphi} + e^{-3i\varphi}) = 6 \cos \varphi + 2 \cos 3\varphi \iff \\ &\cos^3 \varphi = \frac{3}{4} \cos \varphi + \frac{1}{4} \cos 3\varphi. \end{aligned}$$

L'apartat b) es fa de manera anàloga.

<sup>3</sup> Existeixen més arguments de tipus heurístic per a motivar la definició (9), vegeu per exemple *Calculus* de T. M. Apostol Ed. Reverté, Volum 1 pàgina 447 o *Complex numbers & geometry* de Liang-Shin Hann editat per The Mathematical Association of America, pàgina 38. A la primera referència es fa ús de coneixements molt senzills d'equacions diferencials i a la segona s'utilitza el desenvolupament en sèrie de  $e^x$ .

## Nombres Complexos

Aquest problema és en certa manera el procés invers dels polinomis de Chebyshev ja que s'expressen les potències de  $\sin \varphi$  i  $\cos \varphi$  en funció d'arguments múltiples de  $\varphi$ .

Les expressions del tipus

$$\sum_{j=0}^n (a_j \cos j\varphi + b_j \sin j\varphi)$$

s'anomenen polinomis trigonomètrics.

El problema 4 es pot generalitzar a qualsevol potència  $\sin^n \varphi$  o  $\cos^n \varphi$  que de manera sistemàtica pot expressar-se com a polinomi trigonomètric.

**NC5.** Demostreu:

$$\text{a) } 1 + \cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx = \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \cos \frac{nx}{2}.$$

$$\text{b) } \sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx = \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \sin \frac{nx}{2}.$$

*Solució.*

Posem

$$A = 1 + \cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx,$$

$$B = \sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx.$$

Suposant que  $x \neq 2k\pi$ ,

$$A + iB = 1 + e^{ix} + e^{i2x} + e^{i3x} + \dots + e^{inx} = \frac{e^{i(n+1)x} - 1}{e^{ix} - 1} = \frac{\cos(n+1)x + i \sin(n+1)x - 1}{\cos x + i \sin x - 1},$$

utilitzant les identitats  $\cos \alpha = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}$  i  $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$  i operant, queda

$$\begin{aligned} A + iB &= \frac{-2 \sin^2 \frac{(n+1)x}{2} + 2i \sin \frac{(n+1)x}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{-2 \sin^2 \frac{x}{2} + 2i \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \\ &= \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \frac{\cos \frac{(n+1)x}{2} + i \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\cos \frac{x}{2} + i \sin \frac{x}{2}}. \end{aligned}$$

Multiplicant pel conjugat de l'últim denominador, resulta

$$\begin{aligned}
 A + iB &= \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \frac{\left(\cos \frac{(n+1)x}{2} + i \sin \frac{(n+1)x}{2}\right) \left(\cos \frac{x}{2} - i \sin \frac{x}{2}\right)}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \\
 &= \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} e^{i \frac{(n+1)x}{2} - \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} e^{i \frac{nx}{2}} = \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \left(\cos \frac{nx}{2} + i \sin \frac{nx}{2}\right).
 \end{aligned}$$

Igualant les parts real i imaginària s'obté el resultat.

### El punt de vista geomètric

A continuació volem interpretar les operacions definides en els complexos des del punt de vista de la seva representació gràfica en l'anomenat pla complex (o d'Argand).

Siguin  $u = a + ib$ ,  $z = x + iy$  dos complexos d'afixos  $P$  i  $Q$  respectivament. Sigui  $R$  l'afix de  $u + z$ . Tenim  $u + z = a + x + (b + y)i$  que en el pla complex representa una translació de vector  $(a, b)$  com es mostra clarament a la figura de la dreta. Totes les propietats algebraiques de la suma de complexos es corresponen amb les mateixes propietats de la suma de vectors lliures en el pla.




Figura 2

Per veure la imatge gràfica del producte posem

$$\alpha = \arg(u), \quad \beta = \arg(z)$$

i designem per  $A$  i  $R$  els afixos de  $1$  i  $zu$  respectivament.

Com que  $\arg(zu) = \alpha + \beta$  i  $|zu| = |z||u|$ , els triangles  $OAP$  i  $OQR$  són semblants amb raó de semblança (Figura 3)

$$r = \frac{\overline{OQ}}{OP} = \frac{|z|}{|u|}$$




Figura 3

Si fixem  $u$ , el pas de  $Q$  a  $R$  consisteix en un gir d'angle  $\alpha$  i centre  $O$  seguit d'una homotècia de centre  $O$  i raó  $r$ . Les dues transformacions (gir i homotècia) commuten i la transformació resultant és una semblança directa que a vegades s'anomena, d'una manera més descriptiva, rotació dilativa de centre  $O$ , amplitud  $\alpha$  i raó  $r$ .

És interessant destacar-ne alguns casos particulars

- Si  $u$  és real, llavors  $\alpha = 0$  i la transformació és l'homotècia de raó  $a$ .
- Si  $|u| = 1$ , llavors la transformació es redueix a un gir d'amplitud  $\alpha$ . En particular un gir de  $90^\circ$  entorn l'origen equival a multiplicar per  $i$ .
- Si  $u = -1$ , la transformació és una simetria central entorn a  $O$ .<sup>4</sup>

Aquesta relació estreta entre transformacions geomètriques i operacions amb complexos fa

<sup>4</sup> Aquí es pot fer una petita digressió sobre per què es representen els complexos en un pla cartesià utilitzant l'eix  $OY$  per als imaginaris purs. Si interpretem en la recta real el producte de dos reals, un fix  $a$  i un altre variable  $b$ , el producte  $ab$  és la imatge de  $b$  en l'homotècia (o dilatació) de raó  $a$ . En particular el propi  $a$  és la imatge de 1 en la dilatació que defineix  $a$ . En general podem preguntar-nos per la transformació "arrel" d'una transformació donada com aquella que multiplicada per si mateixa (aplicada dues vegades en el sentit de la composició de funcions) coincideix amb la transformació inicial. Per exemple, si  $a > 0$ , la transformació "arrel" és qualsevol de les dilatacions definides per  $\pm\sqrt{a}$ . Per a  $a = -1$ , la transformació és un gir de  $180^\circ$  entorn l'origen, la seva transformació "arrel" és en aquest cas un gir de  $90^\circ$  amb el mateix centre de gir i que porta l'afix de 1 al punt  $(0, 1)$  que representa la imatge de  $i = \sqrt{-1}$ .



que, de vegades, un problema de plantejament purament geomètric es resolgui elegantment interpretant-lo al pla complex. Vegem-ne un exemple, amb un problema clàssic.

**NC6.** *El plànol del tresor.* Disposem d'un plànol per a trobar un tresor amb les següents instruccions:

En el paratge on és el tresor hi ha un pi  $P$  i un avet  $A$ . Si traslladem tot el terreny (amb el tresor inclòs) de manera que  $P$  ocupi la posició de  $A$ , a continuació girem  $90^\circ$  amb centre  $P$  i sentit contrari al de les agulles del rellotge i finalment girem uns altres  $90^\circ$  amb centre  $A$  i en el mateix sentit, el tresor és en el mateix lloc del començament. Trobeu el tresor.

*Solució.* Clarament hem de trobar un punt que quedi invariant després de fer les tres transformacions descrites a l'enunciat (una translació i dos girs).

Es pot resoldre geomètricament estudiant la transformació producte però és molt més ràpid resoldre-ho en el pla complex.

En una referència amb origen a  $P$ , eix real positiu en la direcció  $PA$  i unitat  $\frac{1}{2}PA$ , sigui  $z$  un complex qualsevol. Anem a veure qui és el transformat de  $z$  en aplicar-li les tres transformacions de l'enunciat.

Translació de vector  $\overrightarrow{PA}$ :  $z \rightarrow z + 2$ .

Gir de centre  $P$  i amplitud  $90^\circ$  (multiplicar per  $i$ ):

$$z + 2 \rightarrow (z + 2)i.$$

Per poder aplicar més fàcilment el segon gir, traslladem l'origen al punt  $A$ :  $(z + 2)i \rightarrow (z + 2)i - 2$

Gir de centre  $A$  i amplitud  $90^\circ$  (multiplicar per  $i$ ):

$$(z + 2)i - 2 \rightarrow ((z + 2)i - 2)i$$

Ara hem de tornar a dur l'origen al punt  $P$ :  $((z + 2)i - 2)i \rightarrow ((z + 2)i - 2)i + 2$

Per tal que  $z$  sigui invariant per a aquesta successió de moviments, ha de complir:




Figura 4

## Nombres Complexos

$$((z+2)i - 2)i + 2 = z$$

equació que té una única solució que és  $z = -i$ .

La construcció de la solució és immediata, només cal girar  $-90^\circ$  amb centre  $P$  el punt  $M$  que és el punt mitjà del segment  $PA$  per trobar la posició del tresor  $T$ .

A la figura s'ha comprovat la solució aplicant a  $T$  els tres moviments de l'enunciat i observant que es torna al mateix punt.

La conjugació s'interpreta en el pla complex com una simetria axial respecte de l'eix real. La relació entre els afixos de  $z$  i  $\frac{1}{z}$  s'obté fàcilment amb la igualtat:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

d'on  $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = \arg(\bar{z}) = -\arg(z)$ .




Figura 5

Com que a més a més  $\left|\frac{1}{z}\right| |z| = 1$ , resulta que l'afix de  $\frac{1}{z}$  s'obté a partir de l'afix de  $z$  mitjançant una inversió respecte del cercle unitat seguida d'una simetria respecte l'eix real. La construcció geomètrica de l'afix de l'invers es mostra a la figura 5 en el cas que  $|z| > 1$ , si  $|z| < 1$  es pot invertir el procés ja que l'invers de l'invers de  $z$  és el propi  $z$ . Si  $|z| = 1$ , llavors l'invers coincideix amb el conjugat.

De manera més general la inversió de pol l'origen i potència  $k > 0$  equival a la transformació:

$$z \rightarrow \frac{k}{\bar{z}}$$

**Exercici 13.** Proveu que si  $z$  és un complex no nul, llavors els afixos de  $z$ ,  $-z$ ,  $\frac{1}{z}$ , i  $-\frac{1}{z}$  estan alineats.

Alguns llocs geomètrics i relacions freqüents en geometria tenen expressions clares en el pla complex, com per exemple:

- El punt mitjà dels afixos  $A, B$  de  $z, z'$  és l'afix  $M$  del complex  $\frac{z+z'}{2}$ .
- La circumferència de centre  $A$  afix del complex  $a$  i radi  $r$  (real positiu), és  $|z-a|=r$ .
- El lloc geomètric dels punts tals que la raó entre les distàncies a dos punts donats  $A, B$  és el nombre real  $\lambda > 0$ . Si  $a$  i  $b$  són els complexos que tenen per afixos  $A$  i  $B$ , el lloc demanat és  $\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = \lambda$ . Pot comprovar-se com exercici que es tracta d'una circumferència que té el centre alineat amb  $A$  i  $B$ . És l'anomenat cercle d'Apoloni (vegeu el problema 40 del final del capítol).
- El baricentre del triangle de vèrtexs els afixos dels complexos  $z_1, z_2, z_3$  és l'afix de  $\frac{z_1+z_2+z_3}{3}$ .

NC7. Siguin  $z$  i  $z'$  complexos amb afixos  $A$  i  $B$  respectivament. Mantinguem  $z'$  fix.

- Quin és el lloc geomètric de  $A$  per tal que els afixos de  $z, z'$  i  $zz'$  estiguin alineats?
- Quin és el lloc geomètric de l'afix de  $zz'$ ?

Solució. Siguin  $P$  l'afix de  $zz'$  i  $Q$  l'afix de 1.




Figura 6

- Sabem que els triangles  $OQA$  i  $OBP$  són semblants. Per tant

$$\angle OQA = \angle OBP$$

però  $\angle OBA$  és suplementari de  $\angle OBP$  en ser  $A, B$  i  $P$  punts alineats.

En conseqüència

$$\angle OQA + \angle OBA = 180^\circ$$

## Nombres Complexos

és a dir el quadrilàter  $OQAB$  és inscripcible. Com que  $O$ ,  $Q$  i  $B$  són fixos,  $A$  ha d'estar en el circumcentre del triangle  $OQB$ .

b) Quan  $A$  es mou en la circumferència  $OQB$ ,  $\angle OAQ$  és constant i per la semblança anterior,  $\angle OPB$  també és constant, per tant  $P$  està en l'arc capaç d'angle  $\angle OAQ$  sobre el segment  $OB$ .

### Polígons regulars i nombres complexos

Com ja s'ha vist anteriorment, els afixos de les arrels  $n$ -èsimes de la unitat formen un polígon regular de  $n$  costats inscrit en la circumferència unitat i amb un vèrtex a  $(1, 0)$ . Algunes propietats mètriques curioses d'aquests polígons poden establir-se amb força facilitat utilitzant les propietats dels nombres complexos i dels polinomis.

El conjunt  $U_n = \{u_k \mid (u_k)^n = 1; k = 0, 1, \dots, n-1\}$  de les arrels  $n$ -èsimes de la unitat té  $n$  elements donats per:

$$u_k = \cos \varphi_k + i \sin \varphi_k \quad \text{essent } \varphi_k = \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

i qualsevol d'ells és arrel del polinomi

$$P_n(z) = z^n - 1 = (z-1)(z^{n-1} + z^{n-2} + \dots + z + 1)$$

en conseqüència qualsevol arrel  $z$  diferent de 1 compleix

$$z^{n-1} + z^{n-2} + \dots + z + 1 = 0$$

i aplicant les fórmules de Cardano-Vieta a l'equació  $z^n - 1 = 0$ , resulta

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = 0.$$

**NC8.** Siguin  $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4$  vèrtexs consecutius d'un pentàgon regular inscrit en una circumferència de radi 1. Proveu que les cordes  $A_0A_1$  i  $A_0A_2$  compleixen

$$(\overline{A_0A_1} \cdot \overline{A_0A_2})^2 = 5.$$

*Solució 1.* Siguin  $u_0, u_1, u_2, u_3, u_4$  les arrels cinquenes de la unitat i  $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4$  els seus afixos.

Com que  $u_0 = 1$ , tenim

$$\overline{A_0A_1} = |u_1 - 1|, \quad \overline{A_0A_2} = |u_2 - 1|$$

llavors

$$(\overline{A_0A_1} \cdot \overline{A_0A_2})^2 = |u_1 - 1|^2 |u_2 - 1|^2 = \left| [(u_1 - 1)(u_2 - 1)]^2 \right|$$




Figura 7

efectuant el producte  $[(u_1 - 1)(u_2 - 1)]^2$  i tenint present que

$$u_j u_k = u_h \text{ amb } h = j + k \pmod{5}$$

resulta

$$[(u_1 - 1)(u_2 - 1)]^2 = (u_3 - u_1 - u_2 + 1)^2 = -u_4 + 4u_3 - u_2 + u_1 - 1$$

però

$$1 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0 \iff u_3 = -1 - u_1 - u_2 - u_4$$

i substituint queda

$$(\overline{A_0A_1} \cdot \overline{A_0A_2})^2 = [(u_1 - 1)(u_2 - 1)]^2 = |5u_3| = 5|u_3| = 5.$$

Solució 2.

$$P(z) = (z - u_1)(z - u_2)(z - u_3)(z - u_4) = \frac{z^5 - 1}{z - 1} = z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$$

## Nombres Complexos

fent  $z = 1$  resulta  $P(1) = 5$ .

Però  $\overline{A_0A_1} = \overline{A_0A_4}$  i  $\overline{A_0A_2} = \overline{A_0A_3}$ , per tant  $(\overline{A_0A_1} \cdot \overline{A_0A_2})^2 = \overline{A_0A_1} \cdot \overline{A_0A_2} \cdot \overline{A_0A_3} \cdot \overline{A_0A_4}$  i finalment

$$\overline{A_0A_1} \cdot \overline{A_0A_2} \cdot \overline{A_0A_3} \cdot \overline{A_0A_4} = (1 - u_1)(1 - u_2)(1 - u_3)(1 - u_4) = P(1) = 5.$$

Per descomptat que també es pot resoldre el problema sense utilitzar complexos i no és difícil, però aquesta solució és breu i fàcilment generalitzable (vegeu el problema 32 al final del capítol).

**NC9.** Donat un polígon regular de  $n$  costats inscrit al cercle unitat de vèrtexs  $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ , es considera un punt  $P$  qualsevol de la circumferència circumscrita. Demostreu que la suma dels quadrats de les distàncies de  $P$  a cada vèrtex val  $2n$  independentment de la posició de  $P$ .

*Solució.* A la figura 8 es representa la situació per a 7 costats encara que el raonament es fa en general. Suposem, sense perdre generalitat, que  $P$  és a l'arc  $A_{n-1}A_0$ .




Figura 8

Posem  $\alpha = \angle POA_0$  i  $\beta = \frac{2\pi}{n}$ . Sabem que la longitud  $l$  d'una corda d'angle central  $x$  en una circumferència de radi 1, val

$$l = 2 \sin \frac{x}{2}.$$

Per tant, l'expressió que hem d'avaluar és

$$S = \overline{PA_0^2} + \overline{PA_1^2} + \overline{PA_2^2} + \cdots + \overline{PA_{n-1}^2}$$

que segons la igualtat anterior val

$$S = 4 \left( \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) + \sin^2 \left( \frac{\alpha + 2\beta}{2} \right) + \cdots + \sin^2 \left( \frac{\alpha + (n-1)\beta}{2} \right) \right)$$

utilitzant la igualtat  $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$  queda

$$\begin{aligned} S &= 4 \left( \frac{n}{2} - (\cos \alpha + \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + 2\beta) + \cdots + \cos(\alpha + (n-1)\beta)) \right) = \\ &= 2n - 4(\cos \alpha + \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + 2\beta) + \cdots + \cos(\alpha + (n-1)\beta)). \end{aligned}$$

Només queda per veure que l'últim parèntesi és nul.

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos(\alpha + k\beta) = \cos \alpha \sum_{k=0}^{n-1} \cos k\beta - \sin \alpha \sum_{k=0}^{n-1} \sin k\beta$$

i segons el que s'ha provat en el problema 5 resulta

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos(\alpha + k\beta) = \cos \alpha \frac{\sin \frac{n\beta}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}} \cos \frac{(n-1)\beta}{2} - \sin \alpha \frac{\sin \frac{n\beta}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}} \sin \frac{(n-1)\beta}{2} = 0$$

ja que en els dos sumands hi ha el factor  $\sin \frac{n\beta}{2} = \sin \frac{2n\pi}{2n} = \sin \pi = 0$ .

## Problemes

NC10. Proveu que tot complex  $z$  de mòdul 1 amb  $z \neq -1$  pot escriure's en la forma  $\frac{1+ia}{1-ia}$  amb  $a \in \mathbb{R}$ .

NC11. Siguin  $a, b$  complexos, amb afixos  $A$  i  $B$  respectivament. Trobeu el lloc geomètric de l'afix  $Z$  del complex  $z$  tal que

$$\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = k > 0.$$

### Nombres Complexos

**NC12.** Donats  $n$  i  $m$  naturals, determineu el complex  $z$  tal que  $z^n$  i  $z^m$  són conjugats.

**NC13.** Demostreu:

$$a) \cos^2 x + \cos^2 2x + \dots + \cos^2 nx = \frac{\sin(n+1)x \cos nx}{2 \sin x} + \frac{n-1}{2}.$$

$$b) \sin^2 x + \sin^2 2x + \dots + \sin^2 nx = \frac{n+1}{2} - \frac{\sin(n+1)x \cos nx}{2 \sin x}.$$

**NC14.** Els punts  $A(a, 11)$  i  $B(b, 37)$  determinen juntament amb l'origen de coordenades un triangle equilàter. Determineu el producte  $ab$ .

**NC15.** Es considera en el pla complex la funció  $f(z) = -\frac{1}{z}$  ( $z \neq 0$ ). Si  $P$  és l'afix de  $z$  i  $Q$  el de  $f(z)$ , es demana:

a) Proveu que existeixen dos punts fixos de  $f$ , és a dir, complexos  $z$  tals que  $f(z) = z$ .

b) Siguin  $A$  i  $B$  els afixos dels punts trobats en l'apartat anterior. Proveu que per a tot  $z \neq 0$ ,  $P$ ,  $Q$ ,  $A$  i  $B$  són concíclics.

**NC16.** Proveu que  $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \alpha$  implica  $z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos n\alpha$ .

**NC17.** Si  $a$  és una arrel setena de la unitat diferent de 1, calculeu el valor de

$$\frac{a}{1+a^2} + \frac{a^2}{1+a^4} + \frac{a^3}{1+a^6}.$$

**NC18.** Determineu tots els complexos  $z$  tals que  $2z = z_1 + z_2$ , on  $z_1$  i  $z_2$  són dues arrels cúbiques diferents de  $z$ .

**NC19.** Proveu les següents igualtats:

$$a) \binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \dots = (\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4}.$$

$$b) \binom{n}{1} - \binom{n}{3} + \binom{n}{5} - \dots = (\sqrt{2})^n \sin \frac{n\pi}{4}.$$

**NC20.** Trobeu els mínims valors de  $m$  i  $n$  enters positius tals que

$$(1 + \sqrt{3}i)^m = (1 - i)^n.$$



NC21. El complex  $z$  compleix  $z + \bar{z} = |z|^2$  i  $k$  és un nombre real amb  $0 < k < 1$ . Quin és el lloc geomètric de l'afix de  $z + k\bar{z}$ ?

NC22. Representeu en el pla els afixos dels complexos que compleixen:

- a)  $z - \bar{z} = i$ .
- b)  $|z - i| = |z + i|$ .
- c)  $|2z + 3| < 1$ .
- d)  $|z + 1| < |z - 1|$ .
- e)  $|z| < |2z + 1|$ .

NC23. Proveu que si  $z = x + iy$  amb  $y > 0$ , llavors  $\left| \frac{z - i}{z + i} \right| < 1$ .

NC24. Trobeu tots els complexos que compleixen  $\bar{z} = z^3$ .

NC25. En el pla complex  $2 + i$  és el centre d'un quadrat i  $5 + 5i$  n'és un vèrtex. Calculeu-ne els altres vèrtexs.

NC26. Si  $z, z'$  són nombres complexos, demostreu que si  $|z + z'| = |z - z'|$ , aleshores  $\frac{iz}{z'}$  és real.

NC27. Es consideren en el pla els conjunts de nombres complexos

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \arg(z - (2 + 3i)) = \frac{\pi}{4} \right\}, \quad B = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z - (2 + i)| < 2 \right\}.$$

Trobeu la projecció ortogonal sobre l'eix real de  $A \cap B$ .

NC28. Demostreu que l'equació  $z^4 + 4(1 + i)z + 1 = 0$  té una arrel a cada quadrant del pla complex.

NC29. Donades les equacions amb coeficients complexos

$$x^2 - sx + p = 0, \quad x^2 - s'x + p' = 0,$$

trobeu les condicions que han de complir els coeficients per tal que les arrels siguin els vèrtexs d'un quadrat essent les de cada equació vèrtexs oposats.

### Nombres Complexos

**NC30.** Definim la successió de nombres complexos  $\{a_n\}$ ,  $n > 1$ , per

$$a_n = (1+i)\left(1+\frac{i}{\sqrt{2}}\right)\cdots\left(1+\frac{i}{\sqrt{n}}\right)$$

Estudieu si existeix un nombre natural  $m$  tal que

$$\sum_{n=1}^m |a_n - a_{n+1}| = 1990.$$

**NC31.** Trobeu les condicions que han de complir  $a$  i  $b$  reals per tal que el sistema

$$\begin{cases} \cos x + \cos y = a \\ \sin x + \sin y = b \end{cases}$$

admeti solució en  $\mathbb{R}$ . Resoleu-lo i doneu les expressions de  $x$  i  $y$  en funció de  $a$  i  $b$ .  
(Indicació: És una generalització del problema 33.)

**NC32.** Siguin  $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$  vèrtexs consecutius d'un  $n$ -àgon regular inscrit en una circumferència de radi 1. Proveu que les cordes  $A_0A_1, A_0A_2, \dots, A_0A_{n-1}$  compleixen:

$$\overline{A_0A_1} \cdot \overline{A_0A_2} \cdots \overline{A_0A_{n-1}} = n.$$

**NC33.** Sigui  $z$  un complex no nul tal que  $z + \frac{1}{z} = 1$ . Calculeu  $z^n + \frac{1}{z^n}$ .

**NC34.** Sigui  $z$  un complex no nul.

a) Proveu que

$$2\left|z + \frac{1}{z}\right| = |z - i|\left|i - \frac{1}{z}\right| + \left|i + \frac{1}{z}\right||z + i|.$$

b) Proveu que els afixos de  $z, -\frac{1}{z}, i, -i$  són concíclics.

**NC35.** Trobeu les condicions que han de complir  $a$  i  $b$  reals per tal que el sistema

$$\begin{cases} 2\cos x + 3\cos y = a \\ 2\sin x + 3\sin y = b \end{cases}$$

admeti solucions a  $\mathbb{R}$ . Resoleu-lo donant les expressions de  $x$  i  $y$  en funció de  $a$  i  $b$ .  
(Indicació. És una generalització del problema 33.)

NC36. Si  $z$  és una arrel  $n$ -èsima de la unitat, trobeu tots els possibles valors de

$$1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots + \frac{1}{z^{n-1}}.$$

NC37. Donat un polígon regular de  $n$  costats inscrit en el cercle unitat i de vèrtexs  $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ , es considera un punt  $P$  qualsevol del pla. Demostreu que la suma dels quadrats de les distàncies de  $P$  a cada vèrtex només depèn de la distància  $d$  de  $P$  al centre de la circumferència.

(Indicació: És una extensió del problema 11.)

NC38. El mateix enunciat del problema anterior però traient la restricció que  $P$  pertanyi al pla del polígon.

NC39. Proveu que els afixos dels complexos  $u, v, w$  formen un triangle equilàter si i només si

$$u^2 + v^2 + w^2 = uv + uw + vw.$$

NC40. Siguin  $a$  i  $\lambda$  nombres reals positius,  $\alpha$  un nombre real de l'interval  $[0, 2\pi)$ , Discuti el sistema

$$\begin{cases} \left| \frac{z - ai}{z - a} \right| = \lambda \\ \arg(z) = \alpha \end{cases}$$

en el camp complex.

### Mostra de solucions

#### Solució del problema NC18

Anomenem  $z_3$  la tercera arrel cúbica de  $z$ . Com que  $z_1, z_2$  i  $z_3$  són arrels de l'equació  $x^3 - z = 0$ , per les fórmules de Cardano-Vieta sabem que

$$z_1 + z_2 + z_3 = 0 \iff z_1 + z_2 = -z_3$$

llavors, l'equació inicial queda

$$2z = -z_3$$

## Nombres Complexos

elevant al cub i operant resulta

$$8z^3 = -z \iff z(8z^2 + 1) = 0$$

equació que té les tres solucions

$$z = 0, \quad z = \frac{\sqrt{2}}{4}i, \quad z = -\frac{\sqrt{2}}{4}i.$$

### Solució del problema NC31

Multiplicant la segona equació per  $i$  i sumant queda  $z_1 + z_2 = z$  on  $z_1 = \cos x + i \sin x$ ,  $z_2 = \cos y + i \sin y$ ,  $z = a + bi$ .




Figura 9

El sistema queda reduït a l'equació en nombres complexos  $z_1 + z_2 = z$  sent  $z_1$  i  $z_2$  les incògnites amb la condició  $|z_1| = |z_2| = 1$ .

El sistema tindrà solució si i només si es pot construir un triangle de costats 1, 1 i  $\sqrt{a^2 + b^2}$ . Per tant la condició és

$$\sqrt{a^2 + b^2} \leq 2.$$

La solució és (vegeu la figura)

$$z_1 = \cos(\varphi - \alpha) + i \sin(\varphi - \alpha)$$

$$z_2 = \cos(\varphi + \alpha) + i \sin(\varphi + \alpha)$$

on  $\varphi = \arg(z) = \arctan \frac{b}{a} = \arccos\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}\right)$ .

Llavors la solució del sistema inicial és

$$x = \arctan \frac{b}{a} - \arccos\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}\right) + 2k\pi$$

$$y = \arctan \frac{b}{a} + \arccos\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}\right) + 2k\pi.$$

RECURRENCIES

Josep M. Primit i Blay

Referències

APOSTOL, T. M., *Calculus*, Ed. Reverté  
 BIRKHOFF, G. i MCLANE, S., *Àlgebra moderna*, Ed. Vicens Vives  
 SPIVAK, MICHAEL, *Calculus. Calculo infinitesimal*, Ed. Reverté  
 COXETER, H. S. M, *Fundamentos de geometria*, Ed. Limusa-Wiley  
 QUEYSANNE, MICHEL, *Àlgebra básica*, Ed. Vicens Vives  
 LIANG-SHIN HANN, *Complex numbers & Geometry*, The Mathematical Association of America



## RECURRÈNCIES

Josep M. Brunat i Blay

### 1. Introducció

Representarem per  $\mathbb{C}$  el conjunt dels nombres complexos i per  $\mathbb{N}$  el conjunt dels nombres naturals. Depenent de les circumstàncies o de la conveniència, es considera que el primer nombre natural és 0 ò 1. En les discussions teòriques nosaltres suposarem que és 1, però en alguns exemples i problemes serà convenient prendre el 0 com a primer natural.

Una *successió*  $a$  de nombres complexos és una aplicació

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$$

La imatge d'un natural  $n$  es diu el  $n$ -è terme de la successió i es representa per  $a_n$ . La tradició fa que sovint una successió no es representi per una sola lletra com  $a$ , sinó per formes com  $(a_n)$  ò  $a_n$ . Això té un cert grau d'ambigüitat però, tot i així, seguirem la tradició i posarem  $a_n$  per denotar tant la successió  $a$  com el  $n$ -è terme de la successió  $a$ .

El context aclarirà si parlem del terme o de la successió.

Essencialment, doncs, una successió fa correspondre a cada natural  $n$  un nombre complex, el que ocupa la posició  $n$  a la successió.

La forma més natural de definir una successió és indicar quin  $a_n$  correspon a cada  $n$  mitjançant una fórmula *explícita*. Per exemple,

$$a_n = \frac{2}{3} 2^n + \frac{1}{3} (-1)^n$$

defineix una successió. Per calcular un terme només hem de substituir  $n$  pel valor corresponent, per exemple,

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_5 = 21.$$

## Recurrències

Però hi ha altres formes de definir una successió. Una de les més importants és mitjançant una *recurrència*. Aquest mètode consisteix en donar uns quants termes inicials, diguem  $k$ , i després indicar com es calcula cada terme a partir dels  $k$  anteriors. Els termes inicials donats es diuen *condicions inicials* i la fórmula per calcular un terme a partir dels  $k$  anteriors es diu *recurrència d'ordre  $k$* . Per exemple,

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \quad (n \geq 3),$$

defineix una successió mitjançant les condicions inicials  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 3$  i la recurrència  $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ , que és d'ordre 2. Els dos primers termes estan donats i la recurrència permet calcular cada terme a partir dels dos anteriors:

$$a_3 = a_2 + 2a_1 = 5, \quad a_4 = a_3 + 2a_2 = 5 + 6 = 11, \quad a_5 = a_4 + 2a_3 = 11 + 10 = 21, \quad \text{etc.}$$

Noteu que, amb aquesta definició, per calcular  $a_n$  hem de calcular prèviament tots els termes anteriors, cosa que no passa amb una definició explícita.

El problema que tractarem és el següent: definida una successió de forma recurrent, trobar la seva forma explícita. Per exemple, la successió  $a_n$  definida per

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \quad (n \geq 3), \quad (1)$$

és la successió

$$a_n = \frac{2}{3} 2^n + \frac{1}{3} (-1)^n. \quad (2)$$

Demostració: Les condicions inicials i la recurrència defineixen una única successió. Per tant, si la successió (2) compleix les condicions inicials i la recurrència de (1), aleshores és la successió definida a (1). Substituint a (2)  $n$  per 1 i 2 obtenim  $a_1 = 1$  i  $a_2 = 2$ , que són les condicions inicials. Per  $n \geq 3$  tenim,

$$\begin{aligned} a_{n-1} + 2a_{n-2} &= \frac{2}{3} 2^{n-1} + \frac{1}{3} (-1)^{n-1} + 2 \left( \frac{2}{3} 2^{n-2} + \frac{1}{3} (-1)^{n-2} \right) \\ &= \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) 2^n + \left( \frac{1}{3} (-1) + \frac{2}{3} \right) (-1)^{n-2} \\ &= \frac{2}{3} 2^n + \frac{1}{3} (-1)^n = a_n \end{aligned}$$

i es compleix la recurrència.

El raonament anterior no és massa satisfactori: tenim la recurrència, per art de màgia ens traiem una fórmula de la màniga i anunciem que és la solució. I, en efecte, ho és: ho hem




demostrat. Des del punt de vista lògic, l'argument és impecable. Ara bé, ens agradaria saber com s'ha arribat a la fórmula en qüestió. D'això tractarem.

Un dels aspectes essencials de la *combinatòria* és comptar, i les recurrències són una eina important per a comptar. Molts dels problemes que plantejarem són problemes en què cal comptar coses depenent de un cert natural  $n$  i la forma de fer-ho és plantejar una recurrència. Posem-ne un exemple.

**Problema 1.** Calculeu de quantes formes diferents es pot enrajolar un passadís rectangular de mides  $2 \times n$  si es disposa de rajoles de mides  $2 \times 1$  i  $2 \times 2$  i no es poden trencar rajoles.

**Solució.** Sigui  $a_n$  el nombre demanat. Podem començar a enrajolar de tres formes diferents:



En el primer cas, queda per enrajolar un passadís  $2 \times (n-1)$ , que es pot fer de  $a_{n-1}$  formes diferents. En els altres dos casos queda per enrajolar un passadís  $2 \times (n-2)$ , que es pot fer de  $a_{n-2}$  formes diferents. Per tant,

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \quad (n \geq 3).$$

Clarament  $a_1 = 1$  i  $a_2 = 3$ . Ja hem vist abans que aquestes condicions inicials i la recurrència defineixen la successió

$$a_n = \frac{2}{3}2^n + \frac{1}{3}(-1)^n. \quad \square$$

En aquesta mena de problemes combinatoris, els  $a_n$  sempre són enters. Tanmateix, per a la discussió teòrica convé admetre que els nombres que apareixen puguin ésser complexos. A més, les recurrències són útils en altres contextos, com trobar fórmules per sumes en les que el nombre de sumands depèn de  $n$ , en problemes econòmics, en problemes de complexitat algorísmica i d'altres. En aquests casos no sempre els termes de les successions són enters i les tècniques que veurem s'hi poden aplicar igualment.

## Recurrències

En la part teòrica, primer estudiarem les *recurrències lineals homogènies amb coeficients constants*, que són les de la forma

$$a_n - c_1 a_{n-1} - \cdots - c_k a_{n-k} = 0 \quad (n \geq k + 1),$$

per certes constants  $c_1, \dots, c_k$ , és a dir, aquelles en què cada terme s'obté dels  $k$  anteriors multiplicant-los per constants i sumant. El mot *homogènies* prové del zero del segon terme de la igualtat. Primer veurem amb detall els casos  $k = 1$  i  $k = 2$ . Un exemple important amb  $k = 2$  és el dels *nombres de Fibonacci*, que comentarem breument. Després considerarem el cas general, amb  $k$  arbitrari, però sense detalls, només per deixar constància que el mètode es pot generalitzar. Finalment, veurem com, per certes funcions  $f(n)$ , es poden resoldre recurrències de la forma

$$a_n - c_1 a_{n-1} - \cdots - c_k a_{n-k} = f(n) \quad (n \geq k + 1),$$

és a dir, no homogènies. L'apartat titulat *Altres mètodes* és menys sistemàtic. Recull tècniques i observacions diverses, que poden ésser útils per recurrències lineals i no lineals. Acabarem la part teòrica amb comentaris bibliogràfics.

Després hi ha els enunciats dels problemes. Advertim que no estan ordenats per grau de dificultat. Tampoc pel mètode a emprar, entre d'altres motius perquè n'hi ha que admeten mètodes de solució diferents. No sempre el mètode sistemàtic és el més curt, així que paga la pena pensar una mica abans de posar-se a calcular. Hi ha també indicacions i solucions d'uns quants problemes.

Cal dir que hi ha tota una teoria, la de les *funcions generadores*, que combina àlgebra i combinatòria i que s'aplica particularment bé a les recurrències. Als llibres que citem a la bibliografia s'estudia aquesta teoria amb més o menys aprofundiment segons els casos. Aquí, però, no la tractem i tots els problemes que proposem es poden resoldre sense el recurs d'aquesta teoria.

## 2. Recurrències lineals homogènies d'ordre 1 i 2

Les recurrències lineals d'ordre 1 s'anomenen *progressions geomètriques*. Són successions en què cada terme  $a_n$  s'obté de l'anterior multiplicant-lo per una constant:

$$a_n - c_1 a_{n-1} = 0 \quad (n \geq 2).$$

La solució és molt fàcil.

**Teorema 1.** *Sigui  $c_1 \neq 0$ . Les successions  $a_n$  que compleixen*

$$a_n - c_1 a_{n-1} = 0 \quad (n \geq 2)$$

*són les de la forma*

$$a_n = Ac_1^n$$

*on  $A$  és una constant determinada per  $a_1$ .*

*Demostració.* Comprovem primer que, per tota constant  $A$ , la successió  $a_n = Ac_1^n$  compleix la recurrència:

$$a_n - c_1 a_{n-1} = Ac_1^n - c_1 Ac_1^{n-1} = Ac_1^n - Ac_1^n = 0.$$

Segui ara  $a_n$  tal que compleixi la recurrència. Si trobem  $A$  de forma que  $a_1 = Ac_1$ , és a dir, prenent  $A = a_1/c_1$  (noteu que  $c_1 \neq 0$ ), aleshores la successió  $b_n = Ac_1^n$  compleix la recurrència i té el mateix valor inicial que  $a_n$ . Per tant,

$$a_n = b_n = Ac_1^n. \quad \square$$

El polinomi  $x - c_1$  s'anomena *polinomi característic* de la recurrència  $a_n - c_1 a_{n-1} = 0$ . El conjunt de successions  $a_n$  que compleixen una recurrència formen la *solució general* de la recurrència. El teorema anterior diu que la solució general de la recurrència  $a_n - c_1 a_{n-1} = 0$  està formada per les successions de la forma

$$a_n = Ac_1^n,$$

amb  $A$  constant. Si coneixem el valor inicial  $a_1$ , podem determinar  $A$  i obtenir la fórmula explícita de la successió.

**Problema 2.**  $a_1 = 2$ ,  $a_n - 3a_{n-1} = 0$  ( $n \geq 2$ ).

*Solució.* La solució general de la recurrència és  $a_n = A \cdot 3^n$ . Ara,  $2 = a_1 = 3A$  implica  $A = 2/3$ . Per tant,

$$a_n = \frac{2}{3} 3^n = 2 \cdot 3^{n-1}. \quad \square$$

De fet, en l'argument anterior l'important és que  $A$  queda determinat coneixent un terme; que aquest terme sigui el primer  $a_1$  o qualsevol altre és menys important.

## Recurrències

El mètode per resoldre les d'ordre 2 està suggerit per l'anterior.

**Teorema 2.** *Siguin  $c_1, c_2$  constants amb  $c_2 \neq 0$ . Les successions  $a_n$  tals que*

$$a_n - c_1 a_{n-1} - c_2 a_{n-2} = 0 \quad (n \geq 3)$$

*són les següents,*

(i) *si  $x^2 - c_1 x - c_2 = (x - \alpha)^2$ , són les de la forma*

$$a_n = (A + Bn)\alpha^n$$

*on  $A$  i  $B$  estan unívocament determinats per  $a_1$  i  $a_2$ .*

(ii) *si  $x^2 - c_1 x - c_2 = (x - \alpha)(x - \beta)$  amb  $\alpha \neq \beta$ , són les de la forma*

$$a_n = A\alpha^n + B\beta^n$$

*on  $A$  i  $B$  estan unívocament determinats per  $a_1$  i  $a_2$ .*

**Demostració.** (i) Comprovem que totes les successions  $a'_n = A\alpha^n$  amb  $A$  constant compleixen la recurrència:

$$\begin{aligned} a'_n - c_1 a'_{n-1} - c_2 a'_{n-2} &= A\alpha^n - c_1 A\alpha^{n-1} - c_2 A\alpha^{n-2} \\ &= A\alpha^{n-2}(\alpha^2 - c_1\alpha - c_2) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Comprovem que les successions  $a''_n = Bn\alpha^n$  amb  $B$  constant també la compleixen:

$$\begin{aligned} a''_n - c_1 a''_{n-1} - c_2 a''_{n-2} &= Bn\alpha^n - c_1 B(n-1)\alpha^{n-1} - c_2 B(n-2)\alpha^{n-2} \\ &= Bn\alpha^{n-2}(\alpha^2 - c_1\alpha - c_2) + B\alpha^{n-2}(c_1\alpha + 2c_2) \\ &= B\alpha^{n-2}(c_1\alpha + 2c_2). \end{aligned}$$

Ara,  $x^2 - c_1 x - c_2 = (x - \alpha)^2 = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2$  implica  $c_1 = 2\alpha$  i  $c_2 = -\alpha^2$ . Per tant,

$$c_1\alpha + 2c_2 = 2\alpha^2 - 2\alpha^2 = 0.$$

Aleshores les successions  $a_n = a'_n + a''_n = (A + Bn)\alpha^n$  compleixen la recurrència.

Recíprocament, si  $a_n$  compleix la recurrència, podem determinar  $A$  i  $B$  per tal que la successió  $b_n = (A + Bn)\alpha^n$  tingui valors inicials  $a_1$  i  $a_2$ . Aleshores,

$$a_1 = (A + B)\alpha, \quad a_2 = (A + 2B)\alpha^2,$$

donen

$$A = \frac{2\alpha a_1 - a_2}{\alpha^2}, \quad B = \frac{a_2 - \alpha a_1}{\alpha^2}.$$

(Noteu que  $c_2 \neq 0$  comporta  $\alpha \neq 0$ ). Per aquests valors de  $A$  i  $B$ , resulta

$$a_n = b_n = (A + Bn)\alpha^n.$$

(ii) De la mateixa forma que abans, es comprova que les successions de la forma  $a'_n = A\alpha^n$  i  $a''_n = B\beta^n$  compleixen la recurrència i, per tant, les successions  $a_n = A\alpha^n + B\beta^n$  també la satisfan.

Recíprocament, si  $a_n$  compleix la recurrència, podem trobar  $A$  i  $B$  de forma que

$$a_n = A\alpha^n + B\beta^n.$$

En efecte, imposant les condicions inicials

$$a_1 = A\alpha + B\beta, \quad a_2 = A\alpha^2 + B\beta^2,$$

obtenim:

$$A = \frac{a_1\beta - a_2}{\alpha(\beta - \alpha)}, \quad B = \frac{a_1\alpha - a_2}{\beta(\alpha - \beta)}$$

(Notem que  $c_2 \neq 0$  implica que  $\alpha \neq 0$  i  $\beta \neq 0$ . A més,  $\alpha - \beta \neq 0$  per hipòtesi.)  $\square$

El polinomi  $x^2 - c_1x - c_2$  es diu el *polinomi característic* de la recurrència  $a_n - c_1a_{n-1} - c_2a_{n-2} = 0$ . Com hem vist, les arrels d'aquest polinomi donen la solució general de la recurrència.

**Problema 3.**  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 3$ ,  $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$  ( $n \geq 3$ ).

*Solució.* El polinomi característic és  $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$ . Així, la solució cercada és de la forma

$$a_n = (A + Bn)2^n.$$

Imposant les condicions inicials

$$1 = a_1 = (A + B)2, \quad 3 = a_2 = (A + 2B)2^2,$$

obtenim  $A = B = 1/4$ . Per tant,

$$a_n = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}n\right)2^n = (1 + n)2^{n-2}. \quad \square$$

## Recurrències

**Problema 4.**  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 3$ ,  $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$  ( $n \geq 3$ ).

*Solució.* El polinomi característic és  $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$ . La solució general de la recurrència és

$$a_n = A2^n + B(-1)^n.$$

Per  $n = 1$  i  $n = 2$ , tenim,

$$1 = 2A - B, \quad 3 = 4A + B$$

d'on  $A = 2/3$  i  $B = 1/3$ . Per tant,

$$a_n = \frac{2}{3}2^n + \frac{1}{3}(-1)^n = \frac{1}{3}(2^{n+1} + (-1)^n). \quad \square$$

En l'enunciat del teorema i en els exemples, els coeficients  $A$  i  $B$  s'acaben determinant mitjançant  $a_1$  i  $a_2$ . Com es pot veure, però, es poden emprar dos termes qualssevol.

Si les dues arrels del polinomi característic no són reals, aleshores la solució general es pot expressar d'una altra forma. Sigui  $x^2 - c_1x - c_2 = (x - \alpha)(x - \beta)$  amb  $\alpha$  i  $\beta$  complexos conjugats. Si  $r$  i  $\psi$  són el mòdul i l'argument de  $\alpha$ , tenim,

$$\alpha = r(\cos \psi + i \sin \psi), \quad \beta = r(\cos \psi - i \sin \psi).$$

Aleshores,

$$\begin{aligned} A\alpha^n + B\beta^n &= Ar^n(\cos n\psi + i \sin n\psi) + Br^n(\cos n\psi - i \sin n\psi) \\ &= r^n[(A + B)\cos n\psi + (A - B)i \sin n\psi] \\ &= r^n(C \cos n\psi + D \sin n\psi), \end{aligned}$$

on

$$C = A + B, \quad D = (A - B)i \quad \text{o, equivalentment,} \quad A = (C - Di)/2, \quad B = (C + Di)/2.$$

Veiem que determinar  $A$  i  $B$  és equivalent a determinar  $C$  i  $D$ . Per tant, en el cas d'arrels complexos, la solució general de la recurrència està formada per les successions

$$a_n = r^n(C \cos n\psi + D \sin n\psi).$$

**Problema 5.**  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 2$ ,  $a_n - 2a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$  ( $n \geq 2$ ).

*Solució.* El polinomi característic és  $x^2 - 2x + 2$  que té arrels  $\alpha = 1 + i$  i  $\beta = 1 - i$ . El mòdul de  $\alpha$  és  $r = \sqrt{2}$  i l'argument  $\psi = \pi/4$ . Per tant,

$$a_n = (\sqrt{2})^n (C \cos n\frac{\pi}{4} + D \sin n\frac{\pi}{4}).$$

Imposant les condicions inicials,

$$1 = a_0 = C, \quad a_1 = 2 = \sqrt{2} \left( \frac{C\sqrt{2}}{2} + D\frac{\sqrt{2}}{2} \right),$$

que dona  $C = D = 1$ . En definitiva,

$$a_n = (\sqrt{2})^n (\cos n\frac{\pi}{4} + \sin n\frac{\pi}{4}). \quad \square$$

Notem que  $a_0$  i  $a_1$  són enters i que  $a_n = 2a_{n-1} - 2a_{n-2}$  per  $n \geq 2$ . Això comporta que tots els valors  $a_n$  són enters, cosa no gens evident a la vista de la fórmula anterior.

### 3. Els nombres de Fibonacci

Leonardo Fibonacci (que vol dir fill de Bonacci), també conegut com a Leonardo de Pisa (1175-1240, dates aproximades) és un dels grans noms de la ciència. Entre d'altres llibres, fou autor del *Liber Abacci*, que és una obra cabdal en la difusió dels numerals aràbics i dels mètodes per fer les quatre operacions bàsiques tal com les fem avui.

Fibonacci estudià un dels primers problemes d'anàlisi de poblacions. El problema és el següent.

**Problema de Fibonacci.** Suposem que una parella de conills acabats de néixer pot tenir una parella de fills al final del segon mes i, a partir d'aquí, una parella cada mes. Començant amb una parella de conills acabats de néixer, i suposant que no hi ha defuncions, quantes parelles de conills hi haurà després de  $n$  mesos?

*Solució.* Sigui  $a_n$  el nombre de conills al final del mes  $n$ . Al final del primer mes només tenim la parella original, o sigui  $a_1 = 1$ . Al final del segon mes tenim la parella original i la parella de fills, és a dir,  $a_2 = 2$ . Al final del mes  $n$  hi haurà tots el que havia el mes anterior,  $a_{n-1}$ , més els nou-nats, que seran tants com parelles hi havia el mes  $n - 2$ , és a dir,  $a_{n-2}$ . Per tant,

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad (n \geq 3).$$

## Recurrències

Resolem la recurrència pel mètode de l'apartat anterior. El polinomi característic és  $x^2 - x - 1$  que té arrels

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \bar{\phi} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Per tant,

$$a_n = A \cdot \phi^n + B \cdot \bar{\phi}^n.$$

Per calcular  $A$  i  $B$  cal imposar les condicions inicials. En lloc de donar els valors  $n = 1, 2$ , ho arreglarem per donar els valors  $n = 0, 1$ . Només cal definir  $a_0$  de forma que es compleixi  $a_0 + a_1 = a_2$ , és a dir,  $a_0 = 1$ . Imposant  $a_0 = a_1 = 1$ , resulta,

$$1 = A + B, \quad 1 = A \cdot \phi + B \cdot \bar{\phi},$$

d'on

$$A = \frac{\phi}{\sqrt{5}}, \quad B = \frac{-\bar{\phi}}{\sqrt{5}}$$

i

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \phi^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \bar{\phi}^{n+1}. \quad \square$$

La recurrència  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$  es diu *recurrència de Fibonacci*, i els nombres

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\phi^n - \bar{\phi}^n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

s'anomenen *nombres de Fibonacci*, els quals formen la solució de la recurrència de Fibonacci amb condicions inicials  $f_0 = 0$  i  $f_1 = 1$ . Veiem, doncs, que el problema de Fibonacci té solució  $a_n = f_{n+1}$ . Noteu que, tot i l'aspecte de la fórmula anterior, els  $f_n$  són enters, com es dedueix de la definició recurrent. Els nombres  $f_n$  tenen multitud de curioses propietats, algunes de les quals són els problemes del 16 al 22.

El nombre  $\phi$  és la *raó àuria* o *divina proporció* dels clàssics, i ha estat emprada en moltes construccions i pintures, vegeu [Gh].

## 4. Generalització

El cas de les recurrències lineals d'ordre 1 i 2 només són casos particulars de les d'ordre  $k$ , que també es saben resoldre. Enunciarem el teorema general, però no el demostrarem. Comproveu, però, que els teoremes 1 i 2 són casos particulars del següent.



**Teorema 3.** *Siguin  $c_1, \dots, c_k$  constants,  $c_k \neq 0$  i suposem que*

$$x^k - c_1x^{k-1} - \dots - c_k = (x - \alpha_1)^{s_1+1} \dots (x - \alpha_t)^{s_t+1}.$$

*Les successions  $a_n$  tals que*

$$a_n - c_1a_{n-1} - c_2a_{n-2} - \dots - c_ka_{n-k} = 0 \quad (n \geq k+1),$$

*són les de la forma*

$$a_n = (A_{1,0} + A_{1,1}n + \dots + A_{1,s_1}n^{s_1})\alpha_1^n + \dots + (A_{t,0} + A_{t,1}n + \dots + A_{t,s_t}n^{s_t})\alpha_t^n,$$

*on els coeficients  $A_{i,j}$  estan unívocament determinats per  $a_1, \dots, a_k$ .*

El polinomi característic és el polinomi  $x^k - c_1x^{k-1} - \dots - c_k$ . Per cada arrel  $\alpha_i$  de multiplicitat  $s_i + 1$  del polinomi característic, hi ha un sumand a la solució general de la recurrència format pel producte d'un polinomi en  $n$  de grau  $s_i$  per  $\alpha_i^n$ .

**Problema 6.**  $a_1 = -6$ ,  $a_2 = 22$ ,  $a_3 = -38$ ,  $a_n - a_{n-1} - 8a_{n-2} + 12a_{n-3} = 0$  ( $n \geq 4$ ).

*Solució.* El polinomi característic és  $x^3 - x^2 - 8x + 12 = (x+3)(x-2)^2$ . Per tant,

$$a_n = A(-3)^n + (B + Cn)2^n.$$

Imposem les condicions inicials:

$$-6 = -3A + 2(B + C), \quad 22 = 9A + 4(B + 2C), \quad -38 = -27A + 8(B + 3C).$$

Aquest sistema té solució  $A = 2$ ,  $B = -1$  i  $C = 1$ . Llavors,

$$a_n = 2(-3)^n + (-1 + n)2^n. \quad \square$$

## 5. Recurrències no homogènies

Considerem ara recurrències lineals amb coeficients constants *no homogènies*, que són les del tipus

$$a_n - c_1a_{n-1} - \dots - c_ka_{n-k} = f(n) \quad (n \geq k+1), \quad (3)$$

on  $c_1, \dots, c_k$  són constants i  $f(n) \neq 0$  una funció. La recurrència homogènia associada a (3) és la que s'obté canviant  $f(n)$  per 0.

## Recurrències

Veurem que, per a certes funcions  $f(n)$ , podem trobar la solució general d'aquesta recurrència. Suposem que sabem trobar una successió concreta  $p_n$  que compleixi la recurrència (3), és a dir, que compleixi

$$p_n - c_1 p_{n-1} - \dots - c_k p_{n-k} = f(n) \quad (n \geq k + 1). \quad (4)$$

D'una tal successió se'n diu una *solució particular*. D'altra banda, d'acord amb el que ja hem vist, sabem quina és la solució general de la recurrència homogènia associada a (3),

$$h_n - c_1 h_{n-1} - \dots - c_k h_{n-k} = 0 \quad (n \geq k + 1). \quad (5)$$

Les successions  $h_n$  tenen la forma descrita al teorema 3, és a dir, són sumes de productes de polinomis en  $n$  per potències de les arrels del polinomi característic. Els coeficients dels polinomis són certs paràmetres i per cada assignació de valors a aquests paràmetres s'obté una solució de la recurrència.

Sumant les igualtats (4) i (5), obtenim que les successions  $a_n = h_n + p_n$  compleixen (3). Si les condicions inicials són donades, es poden determinar els paràmetres que apareixen a l'expressió de  $h_n$  i obtenir la fórmula explícita per  $a_n$ . El problema, doncs, és com obtenir una solució particular  $p_n$ .

El mètode següent funciona bé quan  $f(n)$  és de la forma *suma de polinomis en  $n$  per nombres elevats a  $n$* , és a dir, quan és de la forma de les solucions de recurrències lineals homogènies. Heus ací uns quants exemples on posem  $f(n)$ , mostrem que és de la forma de les solucions d'una recurrència homogènia, i posem el polinomi característic  $q(x)$  de la recurrència.

$f(n)$	$n$	$2^n - 1$	$n^2$	$n^2 2^n$
forma	$(A + Bn)1^n$	$A2^n + B1^n$	$(A + Bn + Cn^2)1^n$	$(A + Bn + Cn^2)2^n$
$q(x)$	$(x - 1)^2$	$(x - 2)(x - 1)$	$(x - 1)^3$	$(x - 2)^3$

El mètode per trobar una solució particular  $p_n$  és el següent:

- a) Calcular el polinomi característic  $p(x)$  de la recurrència homogènia associada;
- b) trobar el polinomi característic  $q(x)$  d'una recurrència homogènia tal que  $f(n)$  pertanyi a la seva solució general;
- c) escriure la solució general de la recurrència homogènia de polinomi característic  $p(x)q(x)$ ;
- d) de la solució general obtinguda a c), suprimir els sumands que corresponen a  $p(x)$ ;
- e) el resultat obtingut és un conjunt de successions entre les quals cal cercar una solució particular. Cal determinar els coeficients imposant la recurrència.

**Problema 7.**  $a_0 = 49/4$ ,  $a_1 = 1/20$ ,  $a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 2^n - 1$  ( $n \geq 2$ ).

*Solució.* L'homogènia associada és  $a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0$ , que té polinomi característic  $p(x) = x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$  i solució general

$$h_n = A \cdot (-3)^n + B \cdot 2^n.$$

Busquem ara una solució particular pel mètode explicat.

a)  $p(x) = (x + 3)(x - 2)$ .

b) De  $2^n - 1 = 2^n - 1 \cdot 1^n$  deduïm que  $q(x) = (x - 2)(x - 1)$ , de forma que  $p(x)q(x) = (x + 3)(x - 2)^2(x - 1)$ .

c) El polinomi  $p(x)q(x)$  és el característic d'una recurrència homogènia de solució general

$$b_n = A(-3)^n + B2^n + Cn2^n + D1^n.$$

d) La part corresponent a  $p(x)$  està formada pels sumands amb coeficients  $A$  i  $B$ , els quals eliminem.

e) Per tant, cerquem una solució particular de la forma  $p_n = Cn2^n + D$ . Imposant que es compleixi la recurrència original, obtenim

$$Cn2^n + D + C(n - 1)2^{n-1} + D - 6(C(n - 2)2^{n-2} + D) = 2^n - 1,$$

$$2^{n-2} [4Cn + 2C(n - 1) - 6C(n - 2)] - 4D = 2^n - 1,$$

$$2^{n-2} 10C - 4D = 2^n - 1.$$

Prenent  $C = 4/10 = 2/5$  i  $D = 1/4$  es compleix la recurrència. Una solució particular és, doncs,

$$p_n = \frac{2}{5} n 2^n + \frac{1}{4}.$$

La nostra solució cal buscar-la entre les de la forma

$$a_n = h_n + p_n = A \cdot (-3)^n + B 2^n + \frac{2}{5} n 2^n + \frac{1}{4}.$$

Imposant els valors inicials,

$$\frac{49}{4} = a_0 = A + B + \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{20} = a_1 = -3A + 2B + \frac{4}{5} + \frac{1}{4},$$

obtenim  $A = 5$  i  $B = 7$ . Per tant,

$$a_n = 5 \cdot (-3)^n + 7 \cdot 2^n + \frac{2}{5} n 2^n + \frac{1}{4}. \quad \square$$

## Recurrències

Recurrències no homogènies apareixen en problemes en què es tracta de calcular sumes de  $n$  sumands. Per exemple, les ben conegudes fórmules de la suma dels primers  $n$  naturals o de  $n$  termes d'una progressió geomètrica es poden veure d'aquesta manera, encara que els càlculs resulten més pesats que emprant els enginyosos mètodes tradicionals d'obtenir les fórmules.

**Problema 8.** Calcular  $1 + 2 + 3 + \dots + n$ .

*Solució.* Posem  $a_n = 1 + 2 + \dots + n$ . Tenim  $a_n - a_{n-1} = n$  i  $a_1 = 1$ . La solució general de l'homogènia és  $h_n = A$ . Cerquem una solució particular. Amb la notació anterior,  $p(x) = (x - 1)$ ,  $q(x) = (x - 1)^2$ , i  $p(x)q(x) = (x - 1)^3$ . A aquest polinomi correspon una solució general  $B + Cn + Dn^2$ , de la qual hem d'eliminar el terme constant  $B$ , que correspon a  $p(x)$ . Cerquem una solució particular del tipus  $p_n = Cn + Dn^2$ . Ara,

$$n = p_n - p_{n-1} = Cn + Dn^2 - C(n - 1) - D(n - 1)^2 = 2Dn + (C - D),$$

dóna  $C = D = 1/2$ . Per tant,

$$a_n = h_n + p_n = A + \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n^2.$$

Com que  $a_1 = 1$ , resulta  $A = 0$ . En definitiva,

$$a_n = \frac{n(n+1)}{2}. \quad \square$$

**Problema 9.** Calcular  $1 + r + r^2 + \dots + r^n$  per  $r \neq 1$ . (El cas  $r = 1$  és l'exemple 8.)

*Solució.* Posem  $a_n = 1 + r + r^2 + \dots + r^n$ . Tenim  $a_n - a_{n-1} = r^n$ . La solució general de la homogènia és  $h_n = A$ . Amb les notacions anteriors,  $p(x) = (x - 1)$ ,  $q(x) = (x - r)$ , i  $p(x)q(x) = (x - 1)(x - r)$ . A aquest polinomi correspon una solució general  $B + Cr^n$ , de la qual eliminem la constant  $B$ , que correspon a  $p(x)$ . Cerquem una solució particular de la forma  $p_n = Cr^n$ . Tenim,  $r^n = Cr^n - Cr^{n-1}$ , d'on  $r = Cr - C$  i  $C = r/(r - 1)$  (recordeu que  $r \neq 1$ .) Aleshores,

$$a_n = A + \frac{r^{n+1}}{r - 1}.$$

Per  $n = 1$ , tenim  $1 + r = A + r^2/(r - 1)$ , el que dóna  $A = 1/(1 - r)$ . En definitiva,

$$a_n = \frac{1}{1 - r} + \frac{r}{r - 1}r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}. \quad \square$$

## 6. Altres mètodes

Els mètodes que descriurem ara són menys sistemàtics, però sovint útils i es poden aplicar a recurrències lineals i no lineals.

*Mètode d'inducció*

El *mètode d'inducció* consisteix en calcular uns quants termes i, a la vista dels nombres que surten, conjecturar la solució. Després s'aplica inducció per establir que la conjectura és correcta.

**Problema 10.**  $a_1 = 3$ ,  $a_2 = 5$ ,  $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$  ( $n \geq 3$ ).

*Solució.* Calculem els primers termes:

$n$	1	2	3	4	5
$a_n$	3	5	9	17	33

Això suggereix  $a_n = 2^n + 1$ . Per  $n = 1, 2$ , els valors coincideixen. Si  $a_m = 2^m + 1$  per tot  $m < n$ , aleshores

$$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} = 3(2^{n-1} + 1) - 2(2^{n-2} + 1) = 3 \cdot 2^{n-1} - 2^{n-1} + 1 = 2^n + 1,$$

i la fórmula val per  $n$ .  $\square$

*Mètode d'expansió*

De vegades, a l'aplicar repetidament la recurrència podem obtenir la fórmula explícita.

**Problema 11.** Una *progressió aritmètico-geomètrica* és una successió en què cada terme s'obté del precedent multiplicant-lo per una constant  $r$  (anomenada *raó*) i sumant després al resultat una constant  $d$  (anomenada *diferència*.) Si  $r = 1$ , la successió es diu *progressió aritmètica* i, si  $d = 0$ , *progressió geomètrica*. Trobeu el valor del terme enèsim  $a_n$  en funció de la raó, la diferència i  $a_1$ . Escriviu les fórmules per als casos de progressions aritmètiques i geomètriques.

*Solució.* La definició indica que la successió compleix la recurrència  $a_n = ra_{n-1} + d$ . (Noteu que és lineal d'ordre 1, no homogènia, i que la podríem resoldre pels mètodes ja

## Recurrències

explicats.) Iterant,

$$\begin{aligned}
 a_n &= r a_{n-1} + d = r(r a_{n-2} + d) + d = r^2 a_{n-2} + (1+r)d \\
 &= r^2(r a_{n-3} + d) + (1+r)d = r^3 a_{n-3} + (1+r+r^2)d \\
 &= \dots \\
 &= r^{n-1} a_1 + (1+r+\dots+r^{n-2})d \\
 &= \begin{cases} r^{n-1} a_1 + \frac{1-r^{n-1}}{1-r} d & \text{si } r \neq 1, \\ a_1 + (n-1)d & \text{si } r = 1. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Per les progressions aritmètiques ( $r = 1$ ) tenim

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

Per les geomètriques ( $d = 0$ ) obtenim

$$a_n = a_1 r^{n-1}. \quad \square$$

### Canvis de variable

El següent exemple il·lustra el que entenem pel mètode de *canvi de variable*.

**Problema 12.** Trobeu una successió  $a_n$  de nombres reals positius tals que

$$a_0 = 2 \quad \text{i} \quad a_n^2 - 5a_{n-1}^2 = 0.$$

*Solució.* Posem  $b_n = a_n^2$ . Aleshores  $b_0 = 4$  i  $b_n - 5b_{n-1} = 0$ . Aquesta recurrència és lineal i la sabem resoldre:  $b_n = A \cdot 5^n$ . Per  $n = 0$  obtenim  $4 = A$ . Així,  $b_n = 4 \cdot 5^n$ . Per tant

$$a_n = 2(\sqrt{5})^n. \quad \square$$

El canvi  $b_n = a_n^2$  ha permès transformar la recurrència inicial, que no és lineal, en una recurrència lineal de primer ordre.

## Recurrències dobles

Una *successió doble* és una aplicació

$$a: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}.$$

La imatge d'una parella  $(n, m)$  es denota  $a_{n,m}$ . La forma *explícita* de definir una successió doble és donar una fórmula que permeti calcular directament  $a_{n,m}$  a partir de  $n$  i  $m$ . Per exemple,

$$a_{n,m} = \binom{n}{m}. \quad (5)$$

Una forma alternativa és donar unes successions de *condicions inicials* i una *recurrència doble* que permeti calcular  $a_{n,m}$  a partir dels valors  $a_{r,s}$  anteriors. Què vol dir *anteriors*? Hi ha diferents formes d'ordenar parelles de naturals, i cada una d'elles proporciona un concepte d'anteprior. El més freqüent, però, és el següent: Les parelles *anteriors* a la parella  $(n, m)$  són les parelles  $(r, s)$  tals que  $r < n$  i les parelles  $(r, s)$  tals que  $r = n$  i  $s < m$ . Per exemple, la successió de nombres binomials (5) es pot definir mitjançant les condicions inicials

$$a_{n,0} = 1, \quad a_{n,1} = n \quad (n \geq 1),$$

i la recurrència doble

$$a_{n,m} = a_{n-1,m-1} + a_{n-1,m} \quad (n \geq 2, m \geq 2).$$

En efecte, els nombres binomials compleixen les condicions inicials

$$\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{1} = n,$$

i la recurrència

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}. \quad (6)$$

Els problemes 33 i 34 tracten de recurrències dobles relacionades amb els nombres binomials.

## 7. Referències

- [An] ANDERSON, I., *Introducción a la combinatoria*, Editorial Vicens-Vives, Barcelona, 1993.
- [Bi] BIGGS, N. L. *Matemáticas discretas*, Editorial Vicens-Vives, Barcelona, 1994.
- [Br] BRUNAT, J. M., *Combinatòria i teoria de grafs*, 3a edició, Edicions UPC, Barcelona, 1997.
- [Gh] GHYCA, M. C., *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*, Editorial Poseidón, Barcelona, 1983.
- [Go] S. GOLDBERG, S. *Introduction to Difference Equations*, Dover Publications, Inc. New York, 1986.
- [Gr] GRIMALDI, R. P., *Matemáticas discreta y combinatoria*, 3ª edición, Addison-Wesley Iberoamericana, 1997.

El llibre de Ghyca [Gh] explica múltiples propietats del nombre d'or i la seva utilització en obres d'art (pintura, arquitectura) i la seva aparició en formes de la naturalesa.

Dels altres llibres, l'únic dedicat exclusivament a les recurrències, (també anomenades equacions en diferències,) és el de S. Goldberg [Go]. Hi podeu trobar molts exemples d'aplicació de les recurrències a l'economia, psicologia i sociologia.

Una discussió detallada de les recurrències lineals amb coeficients constants des d'un punt de vista no molt llunyà al que hem seguit aquí la podeu trobar a [Br]. Per exemple, hi ha la prova del teorema 3 i el motiu pel qual el mètode explicat per trobar una solució particular funciona bé. En aquest llibre hi ha, però, molt pocs exemples i cap problema.

La major part dels problemes proposats a la secció següent provenen del llibre de Grimaldi [Gr], en el qual hi ha molts exemples detallats i molts problemes proposats. També hem usat els llibres d'Anderson [An] i Biggs [Bi], que són de dimensions més reduïdes que el de Grimaldi. En tots tres trobareu notícia sobre la tècnica de les funcions generadores per resoldre recurrències, de la qual aquí no hem comentat res.



## 8. Problemes

**RE1.** Tot resolent cert problema, es diu que una persona és al nivell  $n$  quan li falten  $n$  etapes per arribar a la solució. A cada nivell té 5 alternatives, dues que la porten al nivell  $n-1$  i tres que són millors, en el sentit que la porten directament al nivell  $n-2$ . Sigui  $a_n$  el nombre de maneres d'arribar a la solució des del nivell  $n$ . Trobeu  $a_n$  sabent que  $a_1=2$ .

**RE2.** Un sistema permet d'emetre tres senyals diferents, un dels quals dura un segon i, els altres, dos segons cadascun. Trobeu el nombre de senyals diferents que es poden emetre en  $n$  segons suposant que no hi ha cap temps mort entre cada dos senyals.

**RE3.** S'estima que la facturació d'una empresa és cada any la mitjana entre la de l'any anterior i la de l'any següent. Si les vendes el 1990 són  $v_0$  i les del 1991 són  $v_1$ , calculeu les vendes de l'any  $1990 + n$ .

**RE4.** Una bandera s'ha de dissenyar amb  $n$  franges horitzontals d'igual mida. Cada franja pot ésser vermella, blava, verda o groga. Calculeu el nombre de banderes que es poden dissenyar en els següents casos:

- No hi ha cap restricció sobre el color de cada franja.
- Franges consecutives no poden tenir el mateix color.
- Franges consecutives no poden tenir el mateix color i les franges dels extrems tampoc no poden ésser del mateix color.

**RE5.** El joc de les torres de Hanoi consta de tres pals verticals A, B i C i de  $n$  discs de radis diferents que, al principi, són apilats de gran (sota) a petit (dalt), travessats pel pal A. L'objectiu és col·locar la pila en idèntica posició però al pal C. L'única jugada permesa és passar el disc més alt d'una pila a la posició superior d'una altra pila, sense cobrir, però, un disc més petit. Trobeu una relació recurrent per al nombre mínim de jugades necessàries per completar el joc i resoleu-la.

## Recurrències

**RE6.** Considerem  $n$  rectes al pla en posició general (cada dues no paral·leles, cada tres no concurrents).

- En quantes regions queda dividit el pla?
- Quantes d'aquestes regions són no fitades?

**RE7.** Considerem el conjunt de totes les paraules de longitud  $n$  en l'alfabet  $\{0, 1, 2\}$ .

- Quantes tenen els dígitos cadascun igual o superior a l'anterior?
- Quantes paraules són cap-i-cua?

**RE8.** Considerem el conjunt de totes les paraules de longitud  $n$  en l'alfabet  $\{0, 1, 2\}$ .

- Quantes n'hi ha que continguin dos símbols consecutius iguals?
- A quantes d'elles no hi ha ni dos uns consecutius ni dos dosos consecutius?

**RE9.** Determineu el nombre de paraules de longitud  $n$  en l'alfabet  $\{0, 1, 2, 3\}$  tals que no tenen cap 3 més a la dreta d'un 0.

**RE10.** Trobeu el nombre de paraules de longitud  $n$  en l'alfabet  $\{0, 1, 2, 3\}$  tals que tenen un nombre parell de zeros.

**RE11.** En el pla hi ha dos punts pintats de groc i  $n$  punts pintats de verd. Només es permet dibuixar segments que tenen per extrems punts de diferents colors.

- Proveu que el nombre mínim de segments que cal dibuixar per tal que tots els punts quedin connectats és  $n + 1$ .
- De quantes maneres diferents es poden dibuixar  $n + 1$  segments de forma que tots els punts quedin connectats?

**RE12.** Trobeu el nombre de maneres diferents de pujar una escala de  $n$  graons si en cada pas en pugem un o dos.

**RE13.** Calculeu el nombre de subconjunts del conjunt  $\{1, 2, 3, \dots, n\}$  que no contenen dos enters consecutius.

RE14. Calculeu el nombre de formes d'enrajolar un passadís rectangular de mides  $2 \times n$  si es disposa de rajoles de mides  $2 \times 1$  i si no es poden trencar rajoles.

RE15. Si  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 2$  i  $a_n = a_{n-1}a_{n-2}$  ( $n \geq 2$ ), calculeu  $a_n$ .

En els set problemes següents es segueix la notació de la secció 3. Així,  $\phi$  representa el nombre d'or,  $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ , i  $\bar{\phi}$  el seu conjugat  $\bar{\phi} = (1 - \sqrt{5})/2$ . A més,  $f_n$  denota el  $n$ -è nombre de Fibonacci,  $f_n = (\phi^n - \bar{\phi}^n)/\sqrt{5}$ .

RE16. Considereu la recurrència de Fibonacci  $a_n - a_{n-1} - a_{n-2} = 0$  amb condicions inicials  $a_0 = 1$  i  $a_1 = \phi$ . Demostreu que  $a_n = \phi^n$ .

RE17. Calculeu  $f_1 + f_2 + \dots + f_n$ .

RE18. Calculeu  $f_1 + f_3 + f_5 + \dots + f_{2n-1}$ .

RE19. Calculeu  $f_0 + f_2 + f_4 + \dots + f_{2n}$ .

RE20. Proveu que  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f_k = f_{2n}$ .

RE21. a) Demostreu que  $\phi$  i  $\bar{\phi}$  són arrels del polinomi  $x^3 - 2x - 1$ .

b) Demostreu que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k f_k = f_{3n}.$$

RE22. a) Comproveu que les igualtats  $x^2 + 1 = 2 + x$  i  $(2 + x)^2 = 5x^2$  es compleixen per  $x = \phi$  i per  $x = \bar{\phi}$ .

b) Demostreu que

$$\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} f_{2k+m} = 5^n f_{2n+m}.$$

RE23. Una carpeta conté  $n$  fulls i en busquem un examinant-los consecutivament a partir del primer. Quina és la mitjana del nombre de fulls examinats?

## Recurrències

**RE24.** Voleu pintar els vèrtexs d'un polígon de  $n$  costats de forma que vèrtexs contigus tinguin colors diferents. Disposeu d'una caixa de  $k$  colors. De quantes maneres ho podeu fer?

**RE25.** Segons es diu, el rei King Shirham de l'Índia volgué recompensar el seu Gran Visir Sissa Ben Dahir per inventar el joc dels escacs i li demanà quin premi volia. El Visir contestà: —dona'm un gra de blat pel primer quadrat, dos pel segon, quatre pel tercer, vuit pel quart, etc. fins acabar amb tots els quadrats del taulell. Cas de satisfer la demanda, quants grans de blat li hauria donat el rei al visir?

**RE26.** Calculeu,  $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + n(n+1)(n+2)$ .

**RE27.** Calculeu  $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ .

**RE28.** Sigui  $a$  un nombre real i  $n$  un enter positiu. Calculeu,  $a + 2a^2 + 3a^3 + \dots + na^n$ .

**RE29.** Trobeu una fórmula explícita per la successió  $a_n$  definida per

$$a_0 = 1, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{1 + a_{n-1}} \quad (n \geq 1).$$

**RE30.** Calculeu  $a_n$  sabent que  $a_1 = 12$ ,  $a_2 = 60$  i

$$n(n+1)a_{n+2} - 5n(n+2)a_{n+1} + 4(n+1)(n+2)a_n = 0, \quad (n \geq 0).$$

**RE31.** Resoleu per iteració la recurrència  $a_n = \alpha a_{n-1} + \beta^n$ .

**RE32.** Teniu  $n$  objectes numerats de 1 a  $n$  i  $n$  llocs numerats de 1 a  $n$  per desar-los. Sigui  $d_n$  el nombre de formes de desar els objectes de forma que no n'hi hagi cap al seu lloc. Establiu una recurrència per  $d_n$  i calculeu  $d_n$ .

**RE33.** Considereu la recurrència amb dos índexs

$$a_{0,0} = 1, \quad a_{n,k} = 0 \text{ si } k < 0 \text{ ò } k > n, \quad a_{n,k} = \frac{1}{2}(a_{n-1,k-1} + a_{n-1,k}) \text{ altrament.}$$

Calculeu uns quants  $a_{n,k}$ , conjectureu una fórmula, i proveu-la per inducció.

**RE34.** Sigui  $\lambda(n, k)$ , on  $n \geq 1$ , el nombre de  $k$ -subconjunts de  $\{1, 2, 3, \dots, n\}$  que no contenen dos enters consecutius.

a) Demostreu que  $\lambda(n, k) = \lambda(n-1, k) + \lambda(n-2, k-1)$  per tot  $n \geq 3$ .

b) Proveu que per tot  $n \geq 1$  i  $0 \leq k \leq n$ ,

$$\lambda(n, k) = \binom{n-k+1}{k}.$$

c) Calculeu el nombre  $\mu(n, k)$  de maneres d'escollir  $k$  persones d'entre  $n$  assegudes en una taula rodona sense agafar-ne dues de veïnes.

## 9. Mostra de solucions

### Solució del problema RE4

Apartat c).

Sigui  $a_n$  el nombre demanat. Si  $n = 1$ , la primera i última franja coincideixen i tenen el mateix color. Per tant,  $a_1 = 0$ . A més,  $a_2 = 4 \cdot 3 = 12$ . Per  $n \geq 3$ , les banderes demanades amb  $n$  franges es classifiquen en:

(1) les que tenen les franges en les posicions 1 i  $n-1$  de colors diferents, de les quals n'hi ha  $2a_{n-1}$ ;

(2) les que tenen les franges en les posicions 1 i  $n-1$  del mateix color, de les quals n'hi ha  $3a_{n-2}$ . Així,  $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}$ . Tenim, doncs,

$$a_1 = 0, \quad a_2 = 12, \quad a_n - 2a_{n-1} - 3a_{n-2} = 0 \quad (n \geq 3).$$

La solució és

$$a_n = 3^n + 3 \cdot (-1)^n.$$

### Solució del problema RE8b)

Sigui  $a_n$  el nombre de paraules de longitud  $n$  que no tenen dos uns ni dos dosos consecutius.

Tenim  $a_1 = 3$  i  $a_2 = 7$ . Per  $n \geq 3$ , aquestes paraules es classifiquen en:

## Recurrències

- (1) les que no tenen cap zero, de les quals n'hi ha 2;
- (2) les que tenen el primer zero a la posició 1, de les quals n'hi ha  $a_{n-1}$ ;
- (3) les que tenen el primer zero a la posició  $k$ ,  $2 \leq k \leq n-1$ , de les quals n'hi ha  $2a_{n-k}$ ;
- (4) les que tenen el primer zero a l'última posició, de les quals n'hi ha 2.

Resulta, doncs,  $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + \dots + 2a_1 + 4$ . Això implica  $a_n - a_{n-1} = a_{n-1} + a_{n-2}$ , el que dóna la recurrència  $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$ . Tenim, doncs,

$$a_1 = 3, \quad a_2 = 7, \quad a_n - 2a_{n-1} - a_{n-2} = 0 \quad (n \geq 3),$$

que té solució

$$a_n = \frac{1}{2} \left[ (1 + \sqrt{2})^{n+1} + (1 - \sqrt{2})^{n+1} \right].$$

### Solució del problema RE15

Amb el canvi  $b_n = \log_2 a_n$  resulta

$$b_0 = 0, \quad b_1 = 1, \quad b_n = b_{n-1} + b_{n-2} \quad (n \geq 2),$$

que defineix la successió de Fibonacci  $b_n = f_n$ . Per tant, la solució és  $a_n = \exp_2 f_n$ .

### Solució del problema RE18

Si  $a_n = f_1 + f_3 + f_5 + \dots + f_{2n-1}$ , tenim  $a_n - a_{n-1} = f_{2n-1}$ . La solució general de la homogenia és  $h_n = A$ . Les propietats dels nombres de Fibonacci permet veure sense càlcul que  $f_{2n}$  és una solució particular. Aleshores,  $a_n = A + f_{2n}$ . Posant  $n = 1$  obtenim  $1 = a_1 = A + f_2 = A + 1$ , d'on  $A = 0$ . Així,  $a_n = f_{2n}$ .

### Solució del problema RE22

a) En tots dos casos, simplificant s'obté l'equació  $x^2 - x - 1 = 0$ , que té solucions  $\phi$  i  $\bar{\phi}$ .

b)

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} f_{2k+m} &= \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \frac{\phi^{2k+m} - \bar{\phi}^{2k+m}}{\sqrt{5}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (\phi^2)^k \cdot \phi^m - \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (\bar{\phi}^2)^k \cdot \bar{\phi}^m \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} [\phi^m (1 + \phi^2)^{2n} - \bar{\phi}^m (1 + \bar{\phi}^2)^{2n}] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\phi^m (2 + \phi)^{2n} - \bar{\phi}^m (2 + \bar{\phi})^{2n}) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\phi^m (5\phi^2)^n - \bar{\phi}^m (5\bar{\phi}^2)^n) \\
 &= 5^n \frac{1}{\sqrt{5}} (\phi^{2n+m} - \bar{\phi}^{2n+m}) \\
 &= 5^n f_{2n+m}.
 \end{aligned}$$

### Solució del problema RE24

Segui  $a_n$  el nombre de les coloracions considerades del polígon de  $n$  vèrtexs. Numerem els vèrtexs  $1, 2, \dots, n$  en sentit directe. Tenim  $a_3 = k(k-1)(k-2)$ . Calculem  $a_4$ . Coloracions tals que 1 i 3 tinguin diferent color n'hi ha  $k(k-1)(k-2)^2$ , que corresponen a  $k$  possibles colors pel vèrtex 2,  $k-1$  pel 1,  $k-2$  pel 3 i  $k-2$  pel 4. Coloracions tals que els vèrtexs 1 i 3 tenen el mateix color n'hi ha  $k(k-1)^2$ , que corresponen a  $k$  colors possibles pel vèrtex 2,  $k-1$  colors pels vèrtexs 1 i 3 i  $k-1$  pel vèrtex 4. Per tant,

$$a_4 = k(k-1)^2 + k(k-1)(k-2)^2 = k(k-1)(k^2 - 3k + 3).$$

Per  $n \geq 4$ , les coloracions es classifiquen en:

(1) Aquelles en què els vèrtexs 1 i 3 tenen diferent color. D'aquestes n'hi ha tantes com coloracions del polígon que s'obté suprimint el vèrtex 2 i unint els vèrtexs 1 i 3, que són  $a_{n-1}$ , pel nombre de colors possibles del 2, que són  $(k-2)$ . Així, d'aquestes n'hi ha  $(k-2)a_{n-1}$ .

(2) Aquelles en què els vèrtexs 1 i 3 tenen el mateix color. D'aquestes n'hi ha tantes com coloracions del cicle que s'obté suprimint el vèrtex 2 i identificant els vèrtexs 1 i 3, multiplicat pel nombre possible de coloracions del 2, que són  $(k-1)$ . En tenim, doncs,  $(k-1)a_{n-1}$ .

En definitiva, obtenim

$$a_3 = k(k-1)(k-2), \quad a_4 = k(k-1)(k^2 - 3k + 3), \quad a_n = (k-2)a_{n-1} + (k-1)a_{n-2} \quad (n \geq 3).$$

## Recurrències

El polinomi característic té arrels  $k - 1$  i  $-1$ . La solució és

$$a_n = (k - 1)^n + (k - 1)(-1)^n.$$

### Solució del problema RE30

Fent el canvi  $a_n = nb_n$  i simplificant el factor  $n(n + 1)(n + 2)$  queda

$$b_1 = 12, \quad b_2 = 30, \quad b_{n+2} - 5b_{n+1} + 4b_n = 0 \quad (n \geq 1),$$

que té solució  $b_n = 3 \cdot 2^{2n-1} + 6$ . Aleshores,

$$a_n = 3n2^{2n-1} + 6n.$$

### Solució del problema RE32

$d_n$  és el nombre de permutacions de  $1, 2, 3, \dots, n$  tals que cap nombre és a la seva posició. Aquestes permutacions s'anomenen *desarranjaments*. Tenim  $d_1 = 0$ ,  $d_2 = 1$ . Per  $n \geq 3$ , fixem un  $r$ ,  $1 \leq r \leq n - 1$ , i considerem els desarranjaments que tenen  $r$  a l'última posició. Aquests es classifiquen en dues classes segons la posició que ocupi  $n$ .

- (1) Que  $n$  ocupi la posició  $r$  n'hi ha  $d_{n-2}$ ;
- (2) Que  $n$  ocupi una posició diferent de la  $r$  n'hi ha  $d_{n-1}$ .

Com que  $r$  pot tenir  $n - 1$  valors, obtenim

$$d_n = (n - 1)d_{n-1} + (n - 1)d_{n-2} \quad (n \geq 3).$$

Fem el canvi  $d_n = n!b_n$ ; s'obté

$$b_1 = 0, \quad b_2 = 1/2, \quad n(b_n - b_{n-1}) = -(b_{n-1} - b_{n-2}) \quad (n \geq 3)$$

Ara fem el canvi  $c_n = b_n - b_{n-1}$ , que dóna

$$c_2 = 1/2, \quad c_n = -c_{n-1}/n \quad (n \geq 3).$$

Per expansió resulta  $c_n = (-1)^n/n!$  per  $n \geq 2$ . Aleshores,

$$b_n = c_n + b_{n-1} = c_n + (c_{n-1} + b_{n-2}) = \dots = c_n + c_{n-1} + \dots + c_2 + b_1 = \sum_{k=2}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

D'aquí,

$$d_n = n!b_n = \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right).$$



## DESIGUALTATS

*Ignasi Mundet i Riera*

Per començar, deixa'm proposar-te dos problemes...

- Suposem que tenim  $n$  nombres reals qualssevol  $a_1, \dots, a_n$ , de manera que la seva suma sigui 1. Demuestra que la suma dels quadrats d'aquests nombres és més gran que  $1/n$ .
- Prenem novament  $n$  nombres reals,  $a_1, \dots, a_n$ , però ara exigim que siguin positius. Suposem que el seu producte és igual a 1. Demuestra que llavors la seva suma és més gran que  $n$ .

Abans de continuar llegint, intenta resoldre'ls...

Te n'has cansat? Doncs deixa'm donar-te una pista. Mira de resoldre aquest problema:

*Demostreu que per a tot nombre real  $x$  es té la desigualtat*

$$x^2 - 6x + 13 \geq 4.$$

Aquest és més fàcil, no? Va, vinga, pensa'l.

És probable que el primer que hakis fet sigui derivar. Molt bé; és una possibilitat. Ara, tot i que a tu et sembli molt natural, deixa'm dir-te (no t'ofenguis!), que això és un pel recargolat. En efecte, si escrivim

$$x^2 - 6x + 13 = (x - 3)^2 + 4,$$

i recordem que un nombre real elevat al quadrat *sempre* és més gran o igual que zero, el problema és obvi. Aquesta pista no és cap tonteria. Les derivades són un instrument potentíssim i molt astut, però n'hi ha d'altres més elementals i senzills que permeten resoldre els dos problemes del començament. En canvi, si vols fer-ho usant tècniques de càlcul infinitesimal, el més probable és que et faltin alguns coneixements (cosa molt normal). Per tant, intenta resoldre els dos problemes amb aquesta *eina*: tot nombre real elevat al quadrat és més gran o igual que zero. Au, a pensar!

Com que veig que tornes a llegir, t'explico algunes maneres de solucionar els dos problemes. És perfectament possible que tu ja els hakis resolt, però que hakis seguit un altre camí (ja me l'explicaràs). Espero que, en tot cas, les solucions que et dono et resultin interessants...

*La desigualtat de Cauchy-Schwartz*

Anem a resoldre el primer. Recordes la fórmula del producte escalar? Si tens dos vectors de l'espai,  $x = (x_1, x_2, x_3)$  i  $y = (y_1, y_2, y_3)$ , el seu producte escalar  $x \cdot y = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

## Desigualtats

és igual al producte dels mòduls de  $x$  i  $y$  pel cosinus de l'angle que determinen els dos vectors. Ara bé, com que per a qualsevol nombre  $\alpha$  real el valor absolut de  $\cos \alpha$  està entre 0 i 1, resulta que

$$x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = x \cdot y \leq \|x\| \cdot \|y\| = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{1/2}(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)^{1/2}.$$

Elevant-ho tot al quadrat i comparant els termes dels extrems, obtenim:

$$(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2).$$

Ens podem preguntar: si en lloc de prendre vectors en dimensió tres els agafem en una dimensió arbitrària, segueix essent certa aquesta desigualtat? La resposta és afirmativa. Escrivim-ho bé:

**TEOREMA.** *Siguin  $x_1, \dots, x_n$  i  $y_1, \dots, y_n$  nombres reals. Llavors es compleix*

$$(x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2).$$

Aquesta desigualtat s'anomena **desigualtat de Cauchy-Schwartz**. Demostrem-la. Escrivim  $x = (x_1, \dots, x_n)$  i  $y = (y_1, \dots, y_n)$ . Si prenem qualsevol nombre real  $\lambda$ , es compleix

$$(x - \lambda y) \cdot (x - \lambda y) = \|x - \lambda y\|^2 \geq 0.$$

Desenvolupem i obtenim

$$(x - \lambda y) \cdot (x - \lambda y) = x \cdot x - 2\lambda x \cdot y + \lambda^2 y \cdot y.$$

Fixa't ara en el terme de la dreta. Oi que és un polinomi en  $\lambda$  amb coeficients reals? A més, hem quedat que aquest polinomi sempre és positiu. Això, ja ho deus saber (i si no, mira de demostrar-ho), implica que el discriminant del polinomi és negatiu. Escrivim-ho:

$$0 \geq (2x \cdot y)^2 - 4(x \cdot x)(y \cdot y).$$

Desenvolupa el terme de la dreta, divideix per quatre, i obtindràs que

$$(x \cdot x)(y \cdot y) \geq (x \cdot y)^2,$$

que és el que volíem demostrar (escrit d'una altra manera). Doncs ara torna a pensar el primer problema, a veure si et surt.

## Desigualtat MA-MG

Si tens  $n$  nombres reals,  $x_1, \dots, x_n$ , la seva mitjana aritmètica es defineix:

$$M_A(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Segur que això ja t'ho havien explicat (potser sols escriure la mitjana  $\bar{x}$ ). Ara bé, no se t'ha acudit mai que es podria fer la mitjana d'una altra manera? Per exemple, en lloc de sumar els nombres i dividir per  $n$ , podríem multiplicar-los i calcular l'arrel  $n$ -èsima del resultat. Aquesta mitjana s'anomena mitjana geomètrica; l'escriurem:

$$M_G(x_1, \dots, x_n) = (x_1 \cdot \dots \cdot x_n)^{1/n}$$

Quina relació hi ha entre les mitjanes  $M_A$  i  $M_G$ ? Per exemple, quina és la més gran? Està clar que si els nombres  $x_1, \dots, x_n$  poden ser tant negatius com positius, a vegades  $M_A > M_G$  i a vegades  $M_A < M_G$  (per què?). Per tant, a partir d'ara considerarem mitjanes de nombres positius. Què es pot dir aleshores? Mirem què passa amb dos nombres positius  $a$  i  $b$ . Llavors  $M_A(a, b) = \frac{a+b}{2}$  i  $M_G(a, b) = \sqrt{ab}$ . Quina és més gran? Va, a veure si ho endevines!

Sí, és clar: sempre es compleix  $M_A(a, b) \geq M_G(a, b)$ . Per demostrar-ho podem fer servir el truc de sempre:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$$

Desenvolupo i em surt:

$$a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$$

i per tant:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

Ja està. Ah, per cert! En quins casos és  $M_A(a, b) = M_G(a, b)$ ? (Això t'ho deixo a tu perquè ho pensis.)

I què passa si en lloc de considerar mitjanes de dos nombres, les agafem de tres nombres? O de qualsevol quantitat de nombres? Doncs resulta que la desigualtat  $M_A \geq M_G$  sempre es compleix. Això se sol anomenar **la desigualtat entre la mitjana aritmètica i la mitjana geomètrica** (o, més curt: **desigualtat MA-MG**):

**TEOREMA.** *Siguin  $x_1, \dots, x_n$  nombres reals positius. Llavors es compleix:*

$$M_A(x_1, \dots, x_n) \geq M_G(x_1, \dots, x_n),$$

*i només hi ha igualtat quan  $x_1 = \dots = x_n$ .*

## Desigualtats

T'explico una demostració (molt bonica) que en va donar un matemàtic hongarès que es diu G.Pólya. Primer de tot, demostra (si no la saps), aquesta desigualtat: per a tot  $x$  real,  $e^{x-1} \geq x$ . (En quins casos hi ha igualtat?).

Diguem  $M_A(x_1, \dots, x_n) = a$  i escrivim:

$$e^{\frac{x_1}{a}-1} \geq \frac{x_1}{a}$$

$$e^{\frac{x_2}{a}-1} \geq \frac{x_2}{a}$$

...

$$e^{\frac{x_n}{a}-1} \geq \frac{x_n}{a}$$

Multiplico tots els termes de la dreta i tots els de l'esquerra i obtinc:

$$e^{\frac{x_1+\dots+x_n}{a}-n} \geq \frac{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}{a^n}.$$

I si ara uso que  $M_A(x_1, \dots, x_n) = a$  a l'esquerra em queda un  $e^0 = 1$  i per tant:

$$1 \geq \frac{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}{a^n}$$

(això és el que volíem demostrar, no?). Queda per veure que només hi ha igualtat quan tots els  $x_i$  són iguals (va, fes-ho tu).

..i ara sí que pots solucionar el segon problema.

## Altres mitjanes

T'explicaré una altra manera de demostrar la desigualtat anterior. És menys enginyosa, però es pot usar per demostrar moltes altres desigualtats entre mitjanes. Observa aquestes propietats trivials de la mitjana aritmètica:

1.  $M_A(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{2n}) = M_A(M_A(x_1, \dots, x_n), M_A(x_{n+1}, \dots, x_{2n}))$ .

2. Si  $x_1 \geq y_1, \dots, x_n \geq y_n$ , llavors  $M_A(x_1, \dots, x_n) \geq M_A(y_1, \dots, y_n)$ .

3. Si  $y < M_A(x_1, \dots, x_n)$ , llavors  $y < M_A(y, x_1, \dots, x_n) < M_A(x_1, \dots, x_n)$ .

4. Si  $y > M_A(x_1, \dots, x_n)$ , llavors  $y > M_A(y, x_1, \dots, x_n) > M_A(x_1, \dots, x_n)$ .

Comprova que la mitjana geomètrica també ho compleix (de fet, és ben raonable que una mitjana tingui aquestes propietats, no?). Ara siguin  $x_1, \dots, x_n$  nombres positius. Per demostrar la desigualtat  $M_A(x_1, \dots, x_n) \geq M_G(x_1, \dots, x_n)$ , usarem inducció sobre  $n$ . El cas  $n = 2$  és fàcil, i l'hem vist al començament de la secció anterior. Suposem doncs que

## I. Mundet

$n > 2$  i que el teorema és cert per a tot enter  $k$ ,  $2 \leq k < n$ . Si  $n$  és parell,  $n = 2m$ , uso la hipòtesi inductiva:

$$\begin{aligned}M_A(x_1, \dots, x_m) &\geq M_G(x_1, \dots, x_m), \\M_A(x_{m+1}, \dots, x_{2m}) &\geq M_G(x_{m+1}, \dots, x_{2m}),\end{aligned}$$

i les propietats anteriors:

$$\begin{aligned}M_A(x_1, \dots, x_{2m}) &= M_A(M_A(x_1, \dots, x_m), M_A(x_{m+1}, \dots, x_{2m})) \geq \\&\geq M_A(M_G(x_1, \dots, x_m), M_G(x_{m+1}, \dots, x_{2m})) \geq \\&\geq M_G(M_G(x_1, \dots, x_m), M_G(x_{m+1}, \dots, x_{2m})) = \\&= M_G(x_1, \dots, x_{2m})\end{aligned}$$

Ara suposem que  $n$  sigui senar,  $n = 2m + 1$ . Vegem que aquí també funciona la cosa. Suposem el contrari, i arribarem a un absurd. Sigui doncs

$$a = M_A(x_1, \dots, x_n) < M_G(x_1, \dots, x_n) = b$$

Aleshores prenc un  $y$  tal que  $a < y < b$ . Per les propietats de les mitjanes,

$$a < M_A(y, x_1, \dots, x_n) < y < M_G(y, x_1, \dots, x_n) < b.$$

És a dir, que

$$M_A(y, x_1, \dots, x_n) \leq M_G(y, x_1, \dots, x_n).$$

Però  $y, x_1, \dots, x_n$  són  $n + 1 = 2m + 2$  nombres. Ara, per hipòtesi inductiva, el teorema és cert per  $m + 1$  nombres (comprova que  $m + 1 < n$ ). Però hem vist abans que si el teorema és cert per  $m + 1$ , llavors també ho és per  $2m + 2$ . Per tant ha de ser

$$M_A(y, x_1, \dots, x_n) \geq M_G(y, x_1, \dots, x_n).$$

Contradicció! (i, per tant, ja hem acabat).

Vegem com aquesta tècnica es pot usar per provar altres desigualtats. Fixa't que per veure que en general  $M_A \geq M_G$ , només he usat que tant  $M_A$  com  $M_G$  compleixen les propietats (1) a (4) i que si prenem dos nombres, aleshores la desigualtat és certa (aquest últim fet és fàcil de demostrar).

Definim ara la mitjana harmònica dels nombres positius diferents de zero  $x_1, \dots, x_n$ :

$$M_H(x_1, \dots, x_n) = \left( \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \right)$$

## Desigualtats

Ara, per veure que sempre  $M_H \leq M_A$ , només cal comprovar-ho con-  
de dos nombres, i després verificar que la mitjana  $M_H$  també complei-  
a (4) (fes-ho!).

En general, si  $x_1, \dots, x_n$  són nombres positius diferents de zero i  $\alpha \neq 0$  és i  
es defineix:

$$M_\alpha(x_1, \dots, x_n) = \left( \frac{x_1^\alpha + \dots + x_n^\alpha}{n} \right)^{1/\alpha}$$

Observa que la mitjana aritmètica és  $M_1$  i l'harmònica  $M_{-1}$ . Definim també

$$M_0(x_1, \dots, x_n) = M_G(x_1, \dots, x_n).$$

Aleshores es pot demostrar aquest

TEOREMA. Siguin  $\alpha$  i  $\beta$  dos nombres reals qualssevol, i suposem que  $\alpha < \beta$ . Llavors

$$M_\alpha(x_1, \dots, x_n) \leq M_\beta(x_1, \dots, x_n),$$

amb igualtat només quan tots els  $x_i$  són iguals. Et veus amb cor de demostrar-lo? Pensa  
una estona i veuràs que amb tot el que t'he explicat és força fàcil.

... i altres desigualtats

### Desigualtat de Young

Sigui  $y = \phi(x)$  una funció que per  $x \geq 0$  és contínua, estrictament creixent (és a dir, si  
 $x_1 > x_2 \geq 0$  llavors  $\phi(x_1) > \phi(x_2)$ ) i tal que  $\phi(0) = 0$ , i  $\phi(x) \rightarrow \infty$  quan  $x \rightarrow \infty$ . Llavors  
existeix la funció inversa de  $\phi$ , que escriurem  $\psi$ . Es compleix per a tot  $x$  positiu que  
 $\psi(\phi(x)) = x$ . Aleshores, si  $a$  i  $b$  són nombres positius, la **desigualtat de Young** diu que

$$ab \leq \int_0^a \phi(x) dx + \int_0^b \psi(x) dx.$$

Per demostrar-la, dibuixa el gràfic de  $\phi$  i veuràs que el resultat és absolutament obvi (pots  
considerar per separat els casos  $b > \phi(a)$ ,  $b = \phi(a)$  i  $b < \phi(a)$ ).

### Desigualtat de Hölder

Considera la desigualtat de Young amb la funció  $\phi(x) = x^{p-1}$ . Joga una mica i obtindràs  
la **desigualtat de Hölder**: Si  $p$  i  $q$  són positius tals que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , aleshores

$$ab < \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

## I. Mundet

### Desigualtat de Jensen

Sigui  $\phi$  una funció definida per a tot nombre real que sigui convexa. Llavors, si  $x_1, \dots, x_n$  són nombres reals qualssevol, es compleix

$$\phi\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) \geq \frac{\sum_{i=1}^n \phi(x_i)}{n}.$$

Més en general, si  $f$  és una funció real definida a l'interval  $[0, 1]$ , llavors

$$\int_0^1 \phi(f(s)) ds \geq \phi\left(\int_0^1 f(s) ds\right).$$

### Desigualtat de Bernouilli

Sigui  $x \geq -1$  i  $0 < \alpha < 1$ . Llavors

$$(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x.$$

En canvi, si  $\alpha < 0$  o  $\alpha > 1$ , llavors es compleix

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x.$$

Només hi ha igualtat (en els dos casos) quan  $x = 0$ . (Aquesta és fàcil de demostrar.)

## Problemes

Per acabar, uns quants problemes. Alguns es resolen amb el que hem vist fins ara; d'altres amb una mica d'imaginació i prou; i d'altres, amb les dues coses.

### Problemes senzills

DE1. Sigui  $n > 1$  un nombre natural. Demosta que

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

DE2. Demosta que si  $x + y + z = 6$  llavors  $x^2 + y^2 + z^2 \geq 12$ .

### Desigualtats

**DE3.** Quin dels dos nombres és més gran:

$$(19941994!)^2 \text{ ó } 19941994^{19941994}.$$

**DE4.** Demostreu que per a qualsevol  $x$  real es compleix

$$e^x \leq x + e^{x^2}.$$

**DE5.** Quina és la mínima longitud possible de la diagonal més gran d'un trapezi d'àrea 1?

**DE6.** Demostreu que donats nombres reals  $T_j$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ ) arbitraris, es compleix la desigualtat

$$\sum_{j,k=1}^n \cos(T_k - T_j) \geq 0.$$

**DE7.** A l'interior d'un quadrat de costat 1 hi ha nou punts. Demostreu que existeix un triangle amb l'àrea més petita que  $1/8$  i tal que els seus vèrtexs són tres dels nou punts donats.

**DE8.** Suposem que  $n$  és un nombre natural, i que els nombres  $a_i$  (on  $1 \leq i \leq n$ ) i  $p$  són reals i positius. Demostreu la desigualtat:

$$n \cdot \sum_{i=1}^n a_i^p \leq \left( \sum_{i=1}^n a_i^{p+1} \right) \cdot \left( \sum_{i=1}^n a_i^{-1} \right).$$

**DE9.** Sabem dels nombres  $a_1, \dots, a_n$ , que per a qualsevol  $k$  es compleix la desigualtat  $a_{k+1} - 2a_k + a_{k-1} \geq 0$  i a més a més que  $a_1 = a_n = 0$ . Demostreu que aleshores tots els  $a_j$  són no positius.

**DE10.** Existeix alguna funció injectiva  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  que compleixi per a qualsevol  $x \in \mathbb{R}$  la desigualtat  $f(x^2) - (f(x))^2 \geq 1/4$ ?

**DE11.** Demostreu la desigualtat

$$\frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{5}{6} \dots \frac{99}{100} < \frac{1}{10}.$$



Problemes no tan senzills

DE12. Demuestra la desigualtat

$$\frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{3n+1}}.$$

DE13. Demuestra la desigualtat

$$\frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{5}{6} \cdots \frac{99}{100} < \frac{1}{12}.$$

DE14. Demuestra que per a qualssevol nombres positius  $x_1, \dots, x_n$  es té la desigualtat

$$\frac{x_1}{x_2 + x_3} + \frac{x_2}{x_3 + x_4} + \cdots + \frac{x_{n-2}}{x_{n-1} + x_n} + \frac{x_{n-1}}{x_n + x_1} + \frac{x_n}{x_1 + x_2} \geq \frac{n}{4}.$$

DE15. Sigui  $A$  un conjunt de  $S$  punts a l'espai de tres dimensions. Siguin  $S_x$ ,  $S_y$  i  $S_z$  les quantitats de punts que surten a les projeccions ortogonals de  $A$  sobre els plans  $x = 0$ ,  $y = 0$  i  $z = 0$  respectivament. Demuestra que

$$S^2 \leq S_x S_y S_z.$$

DE16. Sigui  $f$  una funció no negativa, contínua i còncava a l'interval  $[0, 1]$  i tal que  $f(0) = 1$ . Llavors

$$\int_0^1 x f(x) dx \leq \frac{2}{3} \left( \int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

Mostra de solucions

Solució del problema DE2

Aplicant la desigualtat Cauchy-Schwartz als vectors  $u = (1, 1, 1)$  i  $v = (x, y, z)$ , surt

$$((1, 1, 1) \cdot (x, y, z))^2 = (u \cdot v)^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2),$$

### Desigualtats

o bé,  $36 = (x + y + z)^2 \leq 3(x^2 + y^2 + z^2)$ , i d'aquí es dedueix, dividint per 3, el resultat. La desigualtat no es pot millorar, ja que el vector  $(2, 2, 2)$  fa que sigui  $x^2 + y^2 + z^2 = 12$ .

### Solució del problema DE6

Sigui el nombre complex

$$A = \sum_1^n e^{iT_j} = \sum_1^n (\cos T_j + i \sin T_j).$$

El seu conjugat és  $\bar{A} = \sum_1^n e^{-iT_j} = \sum_1^n (\cos T_j - i \sin T_j)$ , i el producte  $A\bar{A}$ , que és un nombre real més gran o igual que zero, és

$$0 \leq A\bar{A} = \sum_{j,k} e^{i(T_j - T_k)} = \sum_{j,k} \cos(T_j - T_k).$$

Observeu que la part imaginària de  $A\bar{A}$ , que és  $\sum_{j,k} \sin(T_j - T_k)$ , és nul·la, tan per la deducció anterior, com per la observació directa dels termes  $\sin(T_r - T_s)$  i  $\sin(T_s - T_r)$  iguals i de signe contrari.

### Solució del problema DE11

Observem que

$$\frac{1}{2} < \frac{2}{3}, \quad \frac{3}{4} < \frac{4}{5}, \quad \dots, \quad \frac{k-1}{k} < \frac{k}{k+1} < 1.$$

Això ens permet escriure

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \dots \left(\frac{97}{98}\right)^2 \left(\frac{99}{100}\right)^2 < \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \dots \frac{97 \cdot 98 \cdot 99 \cdot 100}{98 \cdot 99 \cdot 100 \cdot 100} = \frac{1}{100}$$

i, fent l'arrel quadrada, surt el resultat

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \dots \frac{99}{100} < \frac{1}{10}.$$

### Solució del problema DE15

Considerem la família  $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$  de plans paral·lels a  $z = 0$  que contenen punts del conjunt donat: es fa passar per cada punt del conjunt inicial un pla paral·lel a  $z = 0$ , i es treuen els plans repetits. Cada un dels plans  $\pi_i$  conté un o més punts del conjunt inicial. Sigui  $a_i$  el nombre de punts que són al pla  $\pi_i$ . Designem per  $x_i$ , (resp.  $y_i$ ) el nombre de projeccions sobre  $x = 0$  (resp.  $y = 0$ ) dels punts del conjunt que són a  $\pi_i$ . Es compleix

$$S_x = \sum_1^k x_i, \quad S_y = \sum_1^k y_i, \quad a_i \leq x_i y_i, \quad a_i \leq S_x, \quad S = \sum_1^k a_i.$$

Calculant surt

$$\begin{aligned}
 S^2 &= (a_1 + a_2 + \dots + a_k)^2 = \left( (\sqrt{x_1}, \dots, \sqrt{x_k}) \cdot \left( \frac{a_1}{\sqrt{x_1}}, \dots, \frac{a_k}{\sqrt{x_k}} \right) \right)^2 \leq \\
 &\leq \left\| (\sqrt{x_1}, \dots, \sqrt{x_k}) \right\|^2 \left\| \left( \frac{a_1}{\sqrt{x_1}}, \dots, \frac{a_k}{\sqrt{x_k}} \right) \right\|^2 = (x_1 + \dots + x_k) \left( \frac{a_1^2}{x_1} + \dots + \frac{a_k^2}{x_k} \right) = \\
 &= S_x \left( \frac{a_1^2}{x_1} + \dots + \frac{a_k^2}{x_k} \right) \leq S_x \left( \frac{a_1 S_z}{x_1} + \dots + \frac{a_k S_z}{x_k} \right) = S_x \left( \frac{a_1}{x_1} + \dots + \frac{a_k}{x_k} \right) S_z \leq \\
 &\leq S_x (y_1 + \dots + y_k) S_z = S_x S_y S_z.
 \end{aligned}$$

Les desigualtats geomètriques són les antigues com la famosa geometria. Així, el primer llibre que Elements d'Euclides conté diverses propietats sobre desigualtats entre angles i costats d'un triangle. El més important és, però, la Proposició XX: en un triangle, la suma de dos costats és més gran que el tercer. Entre aquesta Proposició es troben totes les desigualtats entre elements d'un triangle.

En aquest capítol establim algunes d'aquestes desigualtats, primerament perquè el triangle és la base elemental de les figures geomètriques i més tard, als polígons. Les hem seleccionat d'entre les moltes que es coneixen i que es troben escampades en llibres, revistes, col·leccions i seccions de problemes i exàmens, etc. Han de servir, quan ho calgui, resultats que figuren als capítols de Geometria i Desigualtats.

## Notacions bàsiques

Designarem, com és habitual, els tres costats d'un triangle per  $a$ ,  $b$  i  $c$ . Els angles oposats respectius es designaran per  $A$ ,  $B$  i  $C$ . Les circumferències per  $R$  el radi del cercle circumscrit al triangle i per  $r$  el radi del cercle inscrit. El radi dels cercles inscrits ( $n$ -òmnimans) es designaran per  $r_1, r_2$  i  $r_3$ . Les mitjanes de les tres altures s'anomenen  $h_a, h_b$  i  $h_c$ , i les de les seves mitjanes  $m_a, m_b$  i  $m_c$ .  $S$  serà l'àrea del triangle i  $p$  el semiperímetre.

## La desigualtat d'Euler

Començarem amb una desigualtat de les més antigues atribuïda a Euler, que diu que en un triangle el radi de la circumferència circumscrita és més gran o igual que el quadrat de la circumferència inscrita. És una desigualtat simple i elemental, la que es demostra i ho trobareu a la següent.



## DESIGUALTATS GEOMÈTRIQUES

Miquel Amengual Covas

Les desigualtats geomètriques són tan antigues com la mateixa geometria. Així, el primer llibre dels *Elements* d'Euclides conté diversos teoremes sobre desigualtats entre angles i costats d'un triangle. El més important és, potser, la Proposició XX: *en un triangle, la suma de dos costats és més gran que el tercer*. Sobre aquesta Proposició es basen totes les desigualtats entre elements d'un triangle.

En aquest capítol establirem alguna d'aquestes desigualtats, precisament perquè el triangle és la més elemental de les figures geomètriques més simples, els polígons. Les hem seleccionat d'entre les moltíssimes que es coneixen i que es troben escampades en llibres, revistes, col·leccions i seccions de problemes i exàmens, etc. Hem fet servir, quan ha calgut, resultats que figuren als capítols de Geometria i Desigualtats.

### Notacions bàsiques

Designarem, com és habitual, els tres costats d'un triangle per  $a$ ,  $b$  i  $c$ . Els angles oposats respectius es designaran per  $A$ ,  $B$  i  $C$ . Es representarà per  $R$  el radi del cercle circumscrit al triangle, i per  $r$  el radi del cercle inscrit. Els radis dels cercles excrits (o exinscrits) es designaran per  $r_a$ ,  $r_b$  i  $r_c$ . Les mesures de les tres altures seran  $h_a$ ,  $h_b$  i  $h_c$ , i les de les tres mitjanes  $m_a$ ,  $m_b$  i  $m_c$ .  $S$  serà l'àrea del triangle, i  $p$  el semiperímetre.

### La desigualtat d'Euler

Començarem amb una desigualtat de les més antigues, atribuïda a Euler, que diu que *en tot triangle, el radi de la circumferència circumscrita és més gran o igual que el diàmetre de la circumferència inscrita*. És una desigualtat emblemàtica, ja que és simple i no trivial a la vegada.

## Desigualtats geomètriques

Aquesta desigualtat

$$R \geq 2r, \quad (1)$$

és una conseqüència de la fórmula, també d'Euler,

$$OI^2 = R(R - 2r),$$

que relaciona el quadrat de la distància entre l'incentre  $I$  i el circumcentre  $O$  d'un triangle, amb els radis  $r$  i  $R$ . En donarem una demostració.

Tenim les igualtats elementals  $(p - a) + (p - b) + (p - c) = p$ ,  $S = rp = r_a(p - a) = r_b(p - b) = r_c(p - c)$  que per simple substitució donen

$$(2) \quad \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} = \frac{1}{r}.$$

D'altra banda,

$$\begin{aligned} r_a + r_b + r_c - r &= S \left( \frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} - \frac{1}{p} \right) = \\ &= S \left( \frac{c}{(p-a)(p-b)} + \frac{c}{p(p-c)} \right) = \frac{Sabc}{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{abc}{S} = 4R, \end{aligned}$$

o sigui,

$$(3) \quad r_a + r_b + r_c = 4R + r.$$

Apliquem ara la desigualtat entre les mitjanes aritmètica i geomètrica (*desigualtat MA-MG*) a cada un dels primers membres de (2) i (3) sortirà

$$(r_a + r_b + r_c) \left( \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} \right) \geq 9$$

que es redueix a

$$(4R + r) \frac{1}{r} \geq 9$$

de la que resulta immediatament la desigualtat d'Euler (1). La igualtat val si i només si el triangle és equilàter.

Si a (1) substituïm  $R$  i  $r$  per les seves expressions en funció dels costats del triangle, tindrem

$$\frac{abc}{4\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}} \geq 2\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}$$

que podem escriure en qualsevol de les dues formes

$$abc \geq 8(p-a)(p-b)(p-c)$$

o bé

$$1 \geq 8\sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}\sqrt{\frac{(p-c)(p-a)}{ca}}\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}},$$

de les quals, tenint present que  $p-a = \frac{-a+b+c}{2}$ , etc. i que  $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}$ , etc. resulten, respectivament, les dues desigualtats

$$(4) \quad abc \geq (-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)$$

i

$$1 \geq 8 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$

que són dues de les moltes formes equivalents de la desigualtat d'Euler. (Vegeu el problema 1.)

### Algunes tècniques per a resoldre desigualtats geomètriques.

Les desigualtats geomètriques poden ser difícils de resoldre perquè hi ha pocs mètodes sistemàtics per a abordar-les, fins i tot les més simples. Solen ser necessaris diversos intents d'assaig i error per a trobar la correcta combinació d'estimacions i manipulacions. A continuació es mostren algunes tècniques que, combinades amb desigualtats algebraiques clàssiques, són útils per a arribar al resultat desitjat.

(i) Tota desigualtat homogènia entre les costats  $a$ ,  $b$ ,  $c$  d'un triangle pot transformar-se en una desigualtat entre els seus angles  $A$ ,  $B$ ,  $C$  i recíprocament, mitjançant l'ús de fórmules com  $a = 2R \sin A$ ,  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ , etc.

**Exemple 1.** Efectuant les operacions indicades en la desigualtat (4),

$$abc \geq (-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c) > 0,$$

obtenim

$$abc \geq a(b^2 + c^2 - a^2) + b(c^2 + a^2 - b^2) + c(a^2 + b^2 - c^2) - 2abc > 0$$

### Desigualtats geomètriques

o, equivalentment,

$$3abc \geq a(b^2 + c^2 - a^2) + b(c^2 + a^2 - b^2) + c(a^2 + b^2 - c^2) > 2abc,$$

de la qual, dividint per  $2abc$ , resulta

$$\frac{3}{2} \geq \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} > 1$$

o sigui

$$1 < \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}.$$

**Exemple 2.** A partir de la desigualtat MA-MG aplicada als nombres positius  $bc(p-a)$ ,  $ca(p-b)$ ,  $ab(p-c)$  i de (2), tenim

$$\begin{aligned} bc(p-a) + ca(p-b) + ab(p-c) &\geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2(p-a)(p-b)(p-c)} \geq \\ &\geq 3\sqrt[3]{64(p-a)^2(p-b)^2(p-c)^2} = \\ &= 12(p-a)(p-b)(p-c). \end{aligned}$$

que equival a

$$\frac{bc}{(p-b)(p-c)} + \frac{ca}{(p-c)(p-a)} + \frac{ab}{(p-a)(p-b)} \geq 12$$

és a dir,

$$\operatorname{cosec}^2 \frac{A}{2} + \operatorname{cosec}^2 \frac{B}{2} + \operatorname{cosec}^2 \frac{C}{2} \geq 12$$


ja que  $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}$  i cíclicament.

(ii) Qualsevol desigualtat entre les costats d'un triangle es pot transformar en una desigualtat entre tres nombres positius arbitraris, i recíprocament.

En efecte, considerem la circumferència inscrita en un triangle arbitrari de costats  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Com que els segments de tangent traçats a una circumferència des d'un punt exterior són iguals, tenim

$$AE = AF = x, \quad BF = BD = y, \quad CD = CE = z$$





i, en conseqüència

$$a = y + z, \quad b = z + x, \quad c = x + y,$$

$$x = p - a, \quad y = p - b, \quad z = p - c.$$

Aquestes equacions impliquen que per un tal triangle les distàncies entre els vèrtexs i els punts de tangència contigus dels costats amb la circumferència inscrita són nombres positius i, dualment, corresponents amb tres nombres positius existeix un triangle els costats del qual vénen donats per (4). Aquesta dualitat permet utilitzar totes les desigualtats vàlides per a qualsevol terna de nombres positius.

Vegem tres aplicacions d'aquest mètode.

**Exemple 3.** Si  $a$ ,  $b$ ,  $c$  són les longituds dels costats d'un triangle, demostreu que

$$\frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{c+a-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3.$$

Fent servir la substitució indicada

$$x = \frac{b+c-a}{2}, \quad y = \frac{c+a-b}{2}, \quad z = \frac{a+b-c}{2}$$

la desigualtat que hem de provar s'escriu

$$\frac{y+z}{2x} + \frac{z+x}{2y} + \frac{x+y}{2z} \geq 3$$

que és equivalent a

$$\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + \left(\frac{y}{z} + \frac{z}{y}\right) + \left(\frac{z}{x} + \frac{x}{z}\right) \geq 6.$$

### Desigualtats geomètriques

Només queda aplicar un resultat elemental: si  $\alpha$  i  $\beta$  són nombres reals positius, llavors  $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} \geq 2$ , complint-se la igualtat si i només si  $\alpha = \beta$ . Això és immediat, però constitueix un teorema fonamental per a les desigualtats.

És compleix la igualtat si i només si el triangle és equilàter.

**Exemple 4.** Si  $A, B, C$  són els angles d'un triangle, proveu que

$$\tan^2 \frac{A}{2} + \tan^2 \frac{B}{2} + \tan^2 \frac{C}{2} \geq 1.$$

Si expressem els quadrats de les tangents dels semiangles en funció dels costats i fem servir un a altra vegada la substitució

$$x = p - a, \quad y = p - b, \quad z = p - c,$$

la desigualtat proposada equival successivament a les següents:

$$\begin{aligned} \frac{(p-b)(p-c)}{p(p-a)} + \frac{(p-c)(p-a)}{p(p-b)} + \frac{(p-a)(p-b)}{p(p-c)} &\geq 1, \\ \frac{xy}{(x+y+z)z} + \frac{yz}{(x+y+z)x} + \frac{zx}{(x+y+z)y} &\geq 1 \end{aligned}$$

i finalment,

$$(5) \quad \frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \geq x + y + z.$$

Ara bé, a partir de la desigualtat MA-MG tenim

$$\frac{\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x}}{2} \geq \sqrt{\frac{xy}{z} \frac{yz}{x}}$$

és a dir

$$\frac{\frac{yz}{x} + \frac{zx}{y}}{2} \geq y$$

i, anàlogament,

$$\frac{\frac{yz}{x} + \frac{zx}{y}}{2} \geq z, \quad \frac{\frac{zx}{y} + \frac{xy}{z}}{2} \geq x.$$

La suma d'aquestes tres últimes desigualtats dóna, precisament, (5). Hi ha igualtat si i només si el triangle és equilàter.

**Exemple 5.** (IMO 1983) Siguin  $a, b, c$  les longituds dels costats d'un triangle. Demostreu que

$$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0$$

i determineu-ne el cas d'igualtat.

Posem una vegada més

$$x = p - a, \quad y = p - b, \quad z = p - c,$$

i trobem que

$$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) = xy^3 + yz^3 + zx^3 - xy^2z - yz^2x - zx^2y.$$

Per tant la desigualtat que hem de demostrar és equivalent a

$$xy^3 + yz^3 + zx^3 \geq xy^2z + yz^2x + zx^2y = xyz(x+y+z)$$

o bé, dividint per  $xyz$ ,

$$\frac{z^2}{x} + \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} \geq x + y + z,$$

la qual es pot deduir de la desigualtat de Cauchy-Schwartz

$$(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) \geq (x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)^2$$

posant'hi

$$x_1 = \frac{z}{\sqrt{x}}, \quad x_2 = \frac{x}{\sqrt{y}}, \quad x_3 = \frac{y}{\sqrt{z}}; \quad y_1 = \sqrt{x}, \quad y_2 = \sqrt{y}, \quad y_3 = \sqrt{z}.$$

La igualtat es compleix si i només si els vectors  $(x_1, x_2, x_3)$  i  $(y_1, y_2, y_3)$  són linealment dependents, és a dir, quan  $\frac{z}{x} = \frac{x}{y} = \frac{y}{z}$ , d'on  $x = y = z$  i això correspon al triangle equilàter.

Observeu que la desigualtat també es compleix si el triangle és degenerat; en aquest cas hi ha igualtat si dos vèrtexs són coincidents.

(iii) Vegem, finalment, l'important paper que fan les funcions convexes i les funcions còncaves per a generar desigualtats a partir d'identitats.

**Exemple 6.** Si  $A, B, C$  són els angles d'un triangle, proveu que

$$\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

### Desigualtats geomètriques

Utilitzant el fet que la funció  $f(x) = \sin x$  és convexa a l'interval  $[0, \pi]$  i la desigualtat de Jensen, resulta

$$\sin A + \sin B + \sin C \leq 3 \sin \frac{A+B+C}{3} = 3 \sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

La igualtat es compleix si i només si el triangle és equilàter.

**Exemple 7.** Proveu que en tot triangle de costats  $a, b, c$  i semiperímetre  $p$ ,

$$\sqrt{p} < \sqrt{p-a} + \sqrt{p-b} + \sqrt{p-c} \leq \sqrt{3p}.$$

Per a la primera desigualtat escrivim  $p = (p-a) + (p-b) + (p-c)$  i tenint present que si  $u, v, w$  són tres nombres positius qualssevol es compleix  $\sqrt{u+v+w} < \sqrt{u} + \sqrt{v} + \sqrt{w}$ , s'obté el resultat.

Per a la segona, fem servir la convexitat de la funció  $f(x) = \sqrt{x}$  a  $\mathbb{R}^+$  i la desigualtat de Jensen

$$\sqrt{p-a} + \sqrt{p-b} + \sqrt{p-c} \leq 3 \sqrt{\frac{(p-a) + (p-b) + (p-c)}{3}} = \sqrt{3p}$$

Hi ha igualtat si i només si el triangle és equilàter.

**Exemple 8.** (IMO 1961) Proveu que en tot triangle de costats  $a, b, c$ , i àrea  $S$ ,

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 4S\sqrt{3}.$$

De la desigualtat obvia

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0$$

resulta

$$(*) \quad a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

Com que l'àrea d'un triangle és igual al semiproducte de dos costats pel sinus de l'angle comprès, tenim

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$$

i, per tant, (\*) s'escriu equivalentment com

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 2S \left( \frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} \right).$$

Peró la funció  $f(x) = \frac{1}{\sin x}$  és còncava a l'interval  $(0, \pi)$ , i per tant la desigualtat de Jensen dona immediatament

$$\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} \geq 3 \frac{1}{\sin\left(\frac{A+B+C}{3}\right)} = 3 \frac{1}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3},$$

és a dir,

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 4S\sqrt{3}.$$

Es compleix la igualtat justament per a  $a = b = c$ .

**Exemple 9.** En tot triangle de costats  $a, b, c$  i semiperímetre  $p$ ,

$$\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq \frac{9}{p}.$$

Com que  $\frac{p-a}{p} + \frac{p-b}{p} + \frac{p-c}{p} = 1$  i la funció  $f(x) = \frac{1}{x}$  és còncava per a  $x > 0$ , novament per la desigualtat de Jensen resulta

$$\frac{p}{p-a} + \frac{p}{p-b} + \frac{p}{p-c} \geq 3 \frac{1}{\frac{\frac{p-a}{p} + \frac{p-b}{p} + \frac{p-c}{p}}{3}} = 9,$$

equivalent a la proposada. Hi ha igualtat si i només si el triangle és equilàter.

Una mica diferents de les anteriors tenim els següents exemples de desigualtats entre algunes rectes notables d'un triangle.

**Exemple 10.** (GE17) Proveu que en tot triangle  $ABC$  de costats  $A, b, c$ , i semiperímetre  $p$  i mitjanes  $m_a, m_b, m_c$  es compleix


$$\frac{3}{2}p < m_a + m_b + m_c < 2p.$$

Aprofitem aquest problema, que es troba resolt al capítol de Geometria, per exposar un mètode per a obtenir desigualtats on hi intervenen les mitjanes d'un triangle i donar una solució al problema diferent a la que s'exposa allí.

Sigui  $L$  el punt mitjà de  $BC$  i  $A'$  el punt simètric de  $A$  respecte de  $L$ . Sigui  $C''$  el punt d'intersecció de  $BC$  amb la paral·lela a la mitjana  $BM$  traçada per  $A$ .

### Desigualtats geomètriques

Volem provar que els costats del triangle  $AC''A'$  mesuren  $m_a$ ,  $m_b$ ,  $m_c$ , i les seves mitjanes  $\frac{3}{2}a$ ,  $\frac{3}{2}b$ ,  $\frac{3}{2}c$ .



Tenim

$$AA' = 2 \cdot AM = 2m_a$$

$$AC'' = 2 \cdot BM = 2m_b \quad (\text{ja que } BM \text{ és paral·lela mitjana en el triangle } CAC'')$$

i que la mitjana  $CN$  és igual a la paral·lela mitjana  $BP'$  en el triangle  $CC''A'$  com a conseqüència de la igualtat de  $\triangle CAN$  i  $\triangle BA'P'$  (per ser  $ABA'C'$  un paral·lelogram,  $CA = BA'$ ,  $\angle CAN = \angle BA'P'$  i  $A'P' = \frac{1}{2}A'C' = \frac{1}{2}CN = AN$ ).

Per tant

$$A'C'' = 2 \cdot BP' = 2 \cdot CN = 2m_c.$$

Per altra banda, el punt  $B$  és el baricentre del triangle  $AC''A'$  perquè està sobre la mitjana  $C''M$  i compleix  $\frac{C''B}{BM} = \frac{2 \cdot BM}{BM} = 2$ ; les mitjanes de  $\triangle AC''A'$  mesuren doncs

$$\frac{3}{2} \cdot C''B = \frac{3}{2} \cdot BC = \frac{3}{2}a,$$

$$\frac{3}{2} \cdot A'B = \frac{3}{2} \cdot CA = \frac{3}{2}b,$$

$$\frac{3}{2} \cdot AB = \frac{3}{2}c.$$

A més a més, és immediat observar que

$$\text{Àrea} \triangle AC''A' = 3S,$$

essent  $S$  l'àrea del triangle  $ABC$ .

Aquests resultats ens permeten concloure que el semiperímetre del triangle  $AC''A'$  és igual a

$$m_a + m_b + m_c,$$

el radi de la seva circumferència inscrita és igual a

$$\frac{3S}{m_a + m_b + m_c}$$

i el de la seva circumferència circumscrieta

$$\frac{2m_a m_b m_c}{3S},$$

per la qual cosa tota desigualtat entre  $R$ ,  $r$ ,  $p$  del  $\triangle ABC$  pot transformar-se en una altra aplicant-la al triangle  $AC''A'$ .

Passem ara a establir la desigualtat proposada en aquest exemple.

Tenim

$$AA' = 2m_a < AB + BA' = b + c,$$

o sigui que,

$$2m_a < b + c$$

i, anàlogament

$$2m_b < c + a, \quad 2m_c < a + b$$

la suma de les quals dóna

$$m_a + m_b + m_c < 2p.$$

Si apliquem aquesta desigualtat al triangle  $AC''A'$ , obtenim

$$\frac{3}{2}a + \frac{3}{2}b + \frac{3}{2}c < 2m_a + 2m_b + 2m_c$$

és a dir,

$$\frac{3}{2}p < m_a + m_b + m_c.$$

En la solució citada es prova que els coeficients obtinguts,  $\frac{3}{2}$  i 2, són els millors.

**Exemple 11.** Si  $h_a$ ,  $h_b$ ,  $h_c$  són les altures d'un triangle de costats  $a$ ,  $b$ ,  $c$  i  $r$  el radi de la seva circumferència inscrita,

$$h_a + h_b + h_c \geq 9r.$$

### Desigualtats geomètriques

Dividint  $a + b + c = 2p$  per  $2S = 2rp = ah_a = bh_b = ch_c$  obtenim

$$\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{r}$$

i per la desigualtat MA-MG,

$$(h_a + h_b + h_c) \left( \frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} \right) \geq 3 \sqrt[3]{h_a h_b h_c} \cdot 3 \sqrt[3]{\frac{1}{h_a h_b h_c}} = 9$$

que es redueix a

$$(h_a + h_b + h_c) \frac{1}{r} \geq 9,$$

equivalent a la proposada. Hi ha igualtat si i només si el triangle és equilàter.

**Exemple 12.** Siguin  $v_a$ ,  $v_b$ , respectivament, les bisectrius interiors dels angles  $A$  i  $B$  d'un triangle qualsevol.

Proveu que si  $A < B$ , llavors  $v_a > v_b$ .

Donat que

$$v_a^2 = \frac{4bcp(p-a)}{(b+c)^2} \quad \text{i} \quad v_b^2 = \frac{4cap(p-b)}{(c+a)^2},$$

obtenim

$$\begin{aligned} v_a^2 - v_b^2 &= 4cp \left( \frac{b(p-a)}{(b+c)^2} - \frac{a(p-b)}{(c+a)^2} \right) = \\ &= \frac{2cp}{(b+c)^2(c+a)^2} (b(-a+b+c)(c+a)^2 - a(a-b+c)(b+c)^2) = \\ &= \frac{2cp}{(b+c)^2(c+a)^2} (c^3(b-a) + c^2(b^2 - a^2) + 3abc(b-a) + ab(b^2 - a^2)). \end{aligned}$$

Donat que  $A < B$  implica  $a < b$ , resulta  $v_a > v_b$ .

### Problemes

**DG1.** Demostreu que la longitud d'un costat del triangle de Morley d'un triangle  $T$  donat, és menor que un terç de la longitud del costat més petit de  $T$ .

(El triangle de Morley de  $T$  és el triangle equilàter amb vèrtexs als punts d'intersecció de les trisectrius interiors adjacents dels angles de  $T$ . Vegeu el problema GE12.)



DG2. Demostreu que les següents desigualtats entre elements d'un triangle

$$\begin{aligned} (a+b)(b+c)(c+a) &\geq 8(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b), \\ \frac{\sin A + \sin B + \sin C}{\sin A \sin B \sin C} &\geq 4, \\ \sin A + \sin B + \sin C &\geq \sin 2A + \sin 2B + \sin 2C, \\ \frac{R}{r^2} &\geq \frac{2p^2}{rr_a r_b r_c}, \\ a^2(b+c-a) + b^2(c+a-b) + c^2(a+b-c) &\leq 3abc \quad (\text{IMO 1964}) \end{aligned}$$

són formes equivalents de la desigualtat d'Euler.

DG3. Si  $R$  és el radi de la circumferència circumscrita a un triangle i  $r$  el de la seva circumferència inscrita, proveu que

$$\frac{R}{r} + \frac{r}{R} \geq \frac{5}{2}.$$

La igualtat es compleix només quan el triangle és equilàter.

DG4. Demostreu que si  $v_a, v_b, v_c$  són les bisectrius interiors d'un triangle de semiperímetre  $p$ ,

$$v_a + v_b + v_c \leq p\sqrt{3}$$

És compleix la igualtat si i només si el triangle és equilàter.

DG5. (Teorema d'Erdős-Mordell) Si  $P$  és punt interior a un triangle  $ABC$  i  $PA_1, PB_1, PC_1$  són les perpendiculars traçades per  $P$  als costats  $BC, CA$  i  $AB$ , llavors

$$PA + PB + PC \geq 2(PA_1 + PB_1 + PC_1).$$

DG6. Amb la notació del problema anterior, demostreu que

$$2\left(\frac{1}{PA} + \frac{1}{PB} + \frac{1}{PC}\right) \leq \frac{1}{PA_1} + \frac{1}{PB_1} + \frac{1}{PC_1}.$$

DG7. Amb la notació del problema DG5, proveu que

$$PA_1 \cdot PB_1 \cdot PC_1 \leq \frac{1}{8} PA \cdot PB \cdot PC.$$

### Desigualtats geomètriques

DG8. Siguin  $A \geq B \geq C > 0$  els angles d'un triangle. Proveu que

$$\frac{\cos B}{\cos C} + \frac{\cos C}{\cos B} \leq \frac{\sin^2 A}{\sin B \sin C}.$$

DG9. Donat el triangle  $ABC$ , d'incentre  $I$ , siguin  $R_a, R_b, R_c$  els radis de les circumferències circumscrites als triangles  $IBC, ICA, IAB$ , respectivament. Demostreu que

$$4 \sum_{\text{cíclica}} \frac{R_a^2 + R_b^2}{ab} \geq 2 + \sum_{\text{cíclica}} \frac{a^2 + b^2}{ab}.$$

DG10. En un triangle  $ABC$ , sigui  $r$  el radi de la circumferència inscrita i  $\rho_A$  el radi de la circumferència tangent a  $AB, AC$  i exteriorment a la seva circumferència inscrita; definim  $\rho_B$  i  $\rho_C$  anàlogament. Demostreu que

$$\rho_A + \rho_B + \rho_C \geq r.$$

DG11. Sigui  $G$  el baricentre i  $O$  el circumcentre d'un triangle acutangle  $ABC$ . Demostreu que

$$0 \leq OG \leq \frac{R}{3},$$

essent  $R$  el radi de la circumferència circumscrita.

DG12. Demostreu que en tot triangle de costats  $a, b, c$  i radi de la circumferència circumscrita igual a  $R$ , es compleix la següent desigualtat

$$\frac{a^2}{b+c-a} + \frac{b^2}{c+a-b} + \frac{c^2}{a+b-c} \geq 3\sqrt{3}R.$$

DG13. Dues circumferències concèntriques tenen, respectivament, radis  $R$  i  $R_1, R_1 > R$ . El quadrilàter  $ABCD$  està inscrit a la petita i el  $A_1B_1C_1D_1$  a la gran. El punt  $A_1$  pertany a la prolongació de  $CD$ ,  $B_1$  a la de  $DA$ ,  $C_1$  a la de  $AB$  i  $D_1$  a la de  $BC$ . Proveu que

$$\frac{\text{Àrea}(A_1B_1C_1D_1)}{\text{Àrea}(ABCD)} \geq \frac{R_1^2}{R^2}.$$

DG14. El tetràedre  $ABCD$  té tres angles diedres rectes en el vèrtex  $D$ . Si la longitud de l'altura corresponent al vèrtex  $D$  és  $h$  i el radi de la circumferència inscrita al triangle  $ABC$  és  $r$ , demostreu que

$$h \geq r\sqrt{2}.$$

DG15. Siguin  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  les altures d'un triangle acutangle  $ABC$  i  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  els segons punts d'intersecció de les rectes  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  amb la circumferència circumscrita al triangle  $ABC$ . Demostreu que

$$AA_1^2 \sin 2A + BB_1^2 \sin 2B + CC_1^2 \sin 2C > 24S_0,$$

on  $S_0$  indica l'àrea del triangle  $A'B'C'$ .

DG16. En un triangle  $ABC$  escollim punts arbitraris  $K \in BC$ ,  $L \in AC$ ,  $M \in AB$ ,  $N \in LM$ ,  $R \in MK$  i  $F \in KL$ . Si  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ ,  $S_4$ ,  $S_5$ ,  $S_6$  i  $S$  denoten, respectivament, les àrees dels triangles  $AMR$ ,  $CKR$ ,  $BKF$ ,  $ALF$ ,  $BNM$ ,  $CLN$  i  $ABC$ , demostreu que

$$S \geq 8\sqrt[6]{S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 S_6}.$$

DG17. Siguin  $a$ ,  $b$ ,  $c$  els costats d'un triangle,  $p$  el seu semiperímetre i  $r$  el radi de la seva circumferència inscrita. Demostreu que

$$\frac{1}{(p-a)^2} + \frac{1}{(p-b)^2} + \frac{1}{(p-c)^2} \geq \frac{1}{r^2}.$$

DG18. Els tres vèrtexs d'un triangle de costats  $a$ ,  $b$ ,  $c$  són punts de coordenades enteres en el pla euclidià. Si  $R$  és el radi de la seva circumferència circumscrita, proveu que

$$abc \geq 2R.$$

DG19. Si designem per  $S(x, y, z)$  l'àrea d'un triangle de costats  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , proveu que per a dos triangles qualssevol de costats respectius  $a$ ,  $b$ ,  $c$  i  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$ , es compleix

$$\sqrt{S(a, b, c)} + \sqrt{S(a', b', c')} \leq \sqrt{S(a + a', b + b', c + c')}.$$

### Desigualtats geomètriques

**DG20.** Sigui  $h$  l'altura d'un tetràedre regular i  $h_1, h_2, h_3, h_4$  les distàncies d'un punt interior a les seves cares. Proveu que

$$\begin{aligned} \text{a) } & h_1 + h_2 + h_3 + h_4 = h. \\ \text{b) } & \frac{h-h_1}{h+h_1} + \frac{h-h_2}{h+h_2} + \frac{h-h_3}{h+h_3} + \frac{h-h_4}{h+h_4} \geq \frac{12}{5}. \end{aligned}$$

**DG21.** Si  $ABCD$  és un quadrilàter convex i anomenem  $AB = a, BC = b, CD = c$  i  $DA = d$ , demostreu que

$$S \leq \left( \frac{a+b+c+d}{4} \right)^2,$$

on  $S$  és l'àrea del quadrilàter  $ABCD$ .

**DG22.** Sigui  $ABC$  un triangle i  $D$  el punt del costat  $BC$  tal que la circumferència inscrita en  $\triangle ABD$  i la circumferència excrita relativa al costat  $DC$  de  $\triangle ADC$  tenen el mateix radi  $\rho_1$ . Definim  $\rho_2$  i  $\rho_3$  anàlogament. Demostreu que

$$\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 \geq \frac{9}{4}r,$$

essent  $r$  el radi de la circumferència inscrita en  $\triangle ABC$ .

**DG23.** Siguin  $A', B', C'$ , respectivament, els punts d'intersecció de les prolongacions de les bisectrius interiors dels angles  $A, B, C$  d'un triangle amb la seva circumferència circumscrita. Si  $S$  denota l'àrea de  $\triangle ABC$  i  $S'$  l'àrea de  $\triangle A'B'C'$ , demostreu la desigualtat

$$16(S')^3 \geq 27R^4S,$$

essent  $R$  el radi de la circumferència circumscrita a  $\triangle ABC$ .

**DG24.** Donat un triangle  $ABC$  de costats  $a, b, c$  i un triangle  $A'B'C'$  de costats  $\frac{b+c}{2}, \frac{c+a}{2}, \frac{a+b}{2}$ , demostreu que

$$r' \geq r.$$

essent  $r$  i  $r'$ , respectivament, els radis de les circumferències inscrites en  $\triangle ABC$  i  $\triangle A'B'C'$ .

**DG25.** Designem per  $T$  i  $T'$  dos triangles de costats  $a, b, c$  i  $a', b', c'$ , respectivament, sent

$$(a')^2 = 2a(p-a), \quad (b')^2 = 2b(p-b), \quad (c')^2 = 2c(p-c).$$

Proveu que

$$(i) p \geq p', \quad (ii) R \geq R', \quad (iii) r' \geq r \quad (iv) \frac{S'}{(p')^2} \geq \frac{S}{p^2}$$

sent  $p$ ,  $R$ ,  $r$ ,  $S$ , respectivament, el semiperímetre, el radi de la circumferència circumscrita, el radi de la circumferència inscrita i l'àrea de  $T$ , i, anàlogament per a  $T'$ .

DG26. Si  $a$ ,  $b$ ,  $c$  són les longituds dels costats d'un triangle de semiperímetre  $p$  i àrea  $S$ , demostreu que

$$\left(\frac{p}{p-a}\right)^{\frac{p}{p-a}} + \left(\frac{p}{p-b}\right)^{\frac{p}{p-b}} + \left(\frac{p}{p-c}\right)^{\frac{p}{p-c}} \geq \frac{p^4}{S^2}.$$

DG27. Sigui  $M$  un punt interior del tetràedre  $A_1A_2A_3A_4$ . Les rectes  $A_1M$ ,  $A_2M$ ,  $A_3M$ ,  $A_4M$  intersequen les cares oposades respectivament en els punts  $A'_1$ ,  $A'_2$ ,  $A'_3$ ,  $A'_4$ . Demostreu que

$$\frac{MA'_1}{MA_1} + \frac{MA'_2}{MA_2} + \frac{MA'_3}{MA_3} + \frac{MA'_4}{MA_4} \geq \frac{4}{3}.$$

DG28. Sigui  $O$  el circumcentre d'un triangle acutangle  $ABC$  i  $R$  el radi de la seva circumferència circumscrita.

Si  $A'$  és el segon punt d'intersecció de la recta  $OA$  amb la circumferència circumscrita a  $\triangle BOC$ ,  $B'$  el segon punt d'intersecció de la recta  $BO$  amb la circumferència circumscrita a  $\triangle COA$  i  $C'$  el segon punt d'intersecció de la recta  $CO$  amb la circumferència circumscrita a  $\triangle AOB$ , demostreu que

$$OA' \cdot OB' \cdot OC' \geq 8R^3.$$

DG29. Demostreu que si  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$  són les longituds dels costats d'un quadrilàter i si  $P$  és el seu perímetre, llavors

$$\frac{abc}{d^2} + \frac{bcd}{a^2} + \frac{cda}{b^2} + \frac{dab}{c^2} > P,$$

llevat que  $a = b = c = d$ .

DG30. Si les mitjanes relatives als costats  $AB$  i  $AC$  d'un triangle  $ABC$  són perpendiculars, proveu que

$$\cot B + \cot C \geq \frac{2}{3}.$$

### Desigualtats geomètriques

**DG31.** Sigui  $P$  un punt interior a un triangle  $ABC$  de costats  $a, b, c$  i sigui  $A'$  el segon punt que la recta  $AP$  talla la circumferència per  $B, P, C$ . Definim  $B'$  i  $C'$  anàlogament. Proveu que el perímetre  $p$  de l'hexàgon  $AB'CA'BC'$  compleix

$$p \geq 2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}).$$

**DG32.** Sigui  $P$  un punt interior al triangle equilàter  $ABC$ . Si les rectes  $AP, BP, CP$  tallen els costats  $BC, CA, AB$  respectivament en els punts  $A_1, B_1, C_1$ , demostreu que

$$A_1B_1 \cdot B_1C_1 \cdot C_1A_1 \geq A_1B \cdot B_1C \cdot C_1A.$$

**DG33.** Siguin  $a, b, c$  els costats d'un triangle de semiperímetre  $p$  i àrea  $S$ . Demostreu que

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < \frac{p\sqrt{3}}{2S}.$$

**DG34.** Demostreu que la distància entre dos punts interiors qualssevol d'un triangle (respectivament tetràedre) està fitada superiorment per la longitud del major dels seus costats (respectivament arestes).

**DG35.** En un triangle  $ABC$ , de semiperímetre  $p$ , denotem per  $A', B', C'$ , respectivament, els peus de les bisectrius interiors traçades des dels vèrtexs  $A, B, C$  sobre els costats oposats. Demostreu que

$$\frac{bc \sin \frac{A}{2}}{B'C'} + \frac{ca \sin \frac{B}{2}}{C'A'} + \frac{ab \sin \frac{C}{2}}{A'B'} \leq 2p.$$

**DG36.** Demostreu que en tot triangle  $ABC$  es compleix

$$\cos^2 \frac{B-C}{2} \geq \frac{2r}{R},$$

essent  $R$  i  $r$ , respectivament, els radis de les circumferències circumscrita i inscrita del  $\triangle ABC$ . Quan val la igualtat?

DG37. Es prolonguen les bisectrius interiors dels angles  $A$ ,  $B$ ,  $C$  d'un triangle  $ABC$  fins que tallen la seva circumferència circumscrita en els punts  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ , respectivament, i es tracen les perpendiculars  $T_1H_1$ ,  $T_2H_2$ ,  $T_3H_3$  als costats  $CA$ ,  $AB$ ,  $BC$ . Demostreu que

$$T_1H_1 + T_2H_2 + T_3H_3 \leq 3R,$$

sent  $R$  el radi de la circumferència circumscrita a  $\triangle ABC$ .

DG38. En un triangle rectangle de catets  $a$ ,  $b$  i hipotenusa  $c$ , proveu que

$$4(ac + b^2) \leq 5c^2.$$

DG39. Construïm un triangle  $T_1$  que té per costats les mitjanes d'un triangle rectangle  $T$ . Si  $R$  i  $R_1$  són, respectivament, els radis de les circumferències circumscrites a  $T$  i a  $T_1$ , proveu que

$$R_1 \geq \frac{5R}{6}.$$

DG40. (IMO 1996) Sigui  $ABCDEF$  un hexàgon convex tal que  $AB$  és paral·lel a  $ED$ ,  $BC$  és paral·lel a  $FE$  i  $CD$  és paral·lel a  $AF$ . Siguin  $R_A$ ,  $R_C$  i  $R_E$  els radis de les circumferències circumscrites als triangles  $FAB$ ,  $BCD$  i  $DEF$ , respectivament; i sigui  $p$  el perímetre de l'hexàgon. Proveu que

$$R_A + R_B + R_C \geq \frac{p}{2}.$$

DG41. Sigui  $P$  un punt interior a un quadrilàter convex  $ABCD$  d'àrea  $S$ . Demostreu que

$$S \leq \frac{(PA + PC)BD + (PB + PD)AC}{4}.$$

DG42. Siguin  $A$ ,  $B$ ,  $C$  i  $D$  punts fixos arbitraris de l'espai euclidià  $\mathbb{R}^3$  i  $P$  un punt variable. Demostreu que la suma  $PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2$  és mínima quan  $P$  és el punt mitjà del segment que uneix els punts mitjans de  $AC$  i  $BD$ .

DG43. Demostreu que en un quadrilàter convex, la raó entre la suma dels quadrats de les diagonals i la suma d'aquestes és menor que el semiperímetre del quadrilàter.

### Desigualtats geomètriques

**DG44.** Demostreu que en un quadrilàter convex de costats  $a, b, c, d$  i àrea  $S$  es compleix la següent desigualtat

$$4S \leq a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

**DG45.** Si  $a, b, c, d$  són les longituds dels costats d'un quadrilàter convex i  $e, f$  les de les seves diagonals, proveu que

$$\max(a, b, c, d) \geq \frac{\sqrt{e^2 + f^2}}{2}.$$

**DG46.** Si  $A_1, A_2, A_3, A_4$  són els vèrtexs d'un tetràedre,  $r_i$  el radi de l'esfera excrita relativa a la cara oposada al vèrtex  $A_i$  i  $r$  el radi de l'esfera inscrita, demostreu que

$$\sum_{i=1}^4 \frac{r_i + r}{r_i - r} \geq 12.$$

Mostra de solucions.

#### Solució del problema DG5

Donat que  $\angle AB_1P = 90^\circ$  i  $\angle AC_1P = 90^\circ$ , els punts  $B_1$  i  $C_1$  estan sobre la circumferència de diàmetre  $PA$ . El teorema dels sinus aplicat al  $\triangle AB_1C_1$  dona

$$PA \cdot \sin A = B_1C_1.$$

Anàlogament, els punts  $A_1$  i  $C_1$  estan sobre la circumferència de diàmetre  $PB$ . Els angles  $\angle BPC_1$  i  $\angle BA_1C_1$  són iguals perquè són inscrits a aquesta circumferència i determinen el mateix arc; en conseqüència, si  $C_2$  és la projecció ortogonal de  $C_1$  sobre  $BC$ , els triangles  $PC_1B$  i  $A_1C_2C_1$  són semblants i per tant tenim

$$\frac{C_2A_1}{A_1C_1} = \frac{PC_1}{PB} \implies C_2A_1 = \frac{PC_1 \cdot A_1C_1}{PB} = PC_1 \cdot \sin B$$

on l'última igualtat s'obté en aplicar el teorema dels sinus al  $\triangle BA_1C_1$ .

El mateix raonament, aplicat als punts  $A_1$  i  $B_1$  sobre la circumferència de diàmetre  $PC$ , ens permet concloure que

$$A_1B_2 = PB_1 \cdot \sin C,$$



essent  $B_2$  la projecció ortogonal de  $B_1$  sobre  $BC$ .

Per tant

$$PA \cdot \sin A = B_1C_1 \geq \text{projecció de } B_1C_1 \text{ sobre } BC = C_2B_2 = \\ = C_2A_1 + A_1B_2 = PC_1 \cdot \sin B + PB_1 \cdot \sin C$$

o sigui,

$$PA \geq \frac{b}{a}PC_1 + \frac{c}{a}PB_1,$$

aquesta última s'obté aplicant el teorema dels sinus al  $\triangle ABC$  i de la qual resulten, per permutació circular, les dues següents

$$PB \geq \frac{c}{b}PA_1 + \frac{a}{b}PC_1, \quad PC \geq \frac{a}{c}PB_1 + \frac{b}{c}PA_1.$$


Així doncs

$$PA + PB + PC \geq \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right)PA_1 + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right)PB_1 + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)PC_1.$$

Cada un dels parèntesis és igual o major que 2 (vegeu l'exemple 3) i, per tant resulta immediatament que

$$PA + PB + PC \geq 2(PA_1 + PA_2 + PA_3).$$

Es compleix la igualtat si i només si el triangle  $ABC$  és equilàter i  $P$  és el seu centre.



### Desigualtats geomètriques

En particular, si  $P$  és l'incentre de  $\triangle ABC$  i  $r$  el radi de la seva circumferència inscrita

$$PA = r \operatorname{cosec} \frac{A}{2}, \quad PB = r \operatorname{cosec} \frac{B}{2}, \quad PC = r \operatorname{cosec} \frac{C}{2}, \quad PA_1 = PB_1 = PC_1 = r$$

i deduïm la següent desigualtat trigonomètrica

$$\operatorname{cosec} \frac{A}{2} + \operatorname{cosec} \frac{B}{2} + \operatorname{cosec} \frac{C}{2} \geq 6$$

vàlida per als angles  $A, B, C$  d'un triangle.

#### Solució del problema DG27

Sigui  $E$  i  $F$ , respectivament, els peus de les perpendiculars traçades per  $A_1$  i  $M$  a la cara de vèrtexs  $A_2, A_3, A_4$ .

Si denotem per  $V$  el volum del tetràedre donat i per  $V_1$  el del  $MA_2A_3A_4$ , tenim

$$\frac{MA'_1}{MA_1} = \frac{MA'_1}{A_1A'_1 - MA'_1} = \frac{1}{\frac{A_1A'_1}{MA'_1} - 1},$$

on

$$\frac{A_1A'_1}{MA'_1} = \frac{A_1E}{MF} = \frac{V}{V_1}$$

ja que els volums de dues piràmides de la mateixa base són proporcionals a les seves altures, resulta

$$\frac{MA'_1}{MA_1} = \frac{1}{\frac{V}{V_1} - 1} = \frac{V_1}{V - V_1}.$$

Anàlogament, i amb la notació corresponent,

$$\frac{MA'_2}{MA_2} = \frac{V_2}{V - V_2}, \quad \frac{MA'_3}{MA_3} = \frac{V_3}{V - V_3}, \quad \frac{MA'_4}{MA_4} = \frac{V_4}{V - V_4},$$

essent  $V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$ ,  $V_1 > 0$ ,  $V_2 > 0$ ,  $V_3 > 0$ ,  $V_4 > 0$ .

D'aquesta manera, la desigualtat proposada s'escriu equivalentment com

$$\frac{V_1}{V - V_1} + \frac{V_2}{V - V_2} + \frac{V_3}{V - V_3} + \frac{V_4}{V - V_4} \geq \frac{4}{3}$$

la validesa de la qual establim a continuació.

Aplicant la desigualtat MA-MG als nombres positius  $V - V_1, V - V_2, V - V_3, V - V_4$  i  $\frac{1}{V - V_1}, \frac{1}{V - V_2}, \frac{1}{V - V_3}, \frac{1}{V - V_4}$  resulta


$$\begin{aligned} & 3\left(\frac{V_1}{V - V_1} + \frac{V_2}{V - V_2} + \frac{V_3}{V - V_3} + \frac{V_4}{V - V_4} + 4\right) = \\ & = 3\left(\left(\frac{V_1}{V - V_1} + 1\right) + \left(\frac{V_2}{V - V_2} + 1\right) + \left(\frac{V_3}{V - V_3} + 1\right) + \left(\frac{V_4}{V - V_4} + 1\right)\right) = \\ & = 3V\left(\frac{1}{V - V_1} + \frac{1}{V - V_2} + \frac{1}{V - V_3} + \frac{1}{V - V_4}\right) = \\ & = ((V - V_1) + (V - V_2) + (V - V_3) + (V - V_4))\left(\frac{1}{V - V_1} + \frac{1}{V - V_2} + \frac{1}{V - V_3} + \frac{1}{V - V_4}\right) \geq \\ & \geq 4^2 = 16 \end{aligned}$$

És a dir,

$$3\left(\frac{V_1}{V - V_1} + \frac{V_2}{V - V_2} + \frac{V_3}{V - V_3} + \frac{V_4}{V - V_4} + 4\right) \geq 16$$

i per tant

$$\frac{V_1}{V - V_1} + \frac{V_2}{V - V_2} + \frac{V_3}{V - V_3} + \frac{V_4}{V - V_4} \geq \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}.$$



### Desigualtats geomètriques

#### Solució del problema DG45

Sigui  $ABCD$  el quadrilàter de l'enunciat i posem  $a = AB$ ,  $b = BC$ ,  $c = CD$ ,  $d = DA$ ,  $e = AC$  i  $f = BD$ .

Si  $M$  i  $N$  són, respectivament, els punts mitjans de les diagonals  $AC$  i  $BD$ , el teorema de la mitjana aplicat als triangles  $ABD$ ,  $BCD$  i  $ANC$  dóna

$$AN^2 = \frac{2a^2 + 2d^2 - f^2}{4}, \quad CN^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - f^2}{4},$$


$$MN^2 = \frac{2 \cdot AN^2 + 2 \cdot CN^2 - AC^2}{4} = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - e^2 - f^2).$$

Però  $MN^2 \geq 0$ , i en conseqüència  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq e^2 + f^2$  i, per tant,

$$4 \max(a^2, b^2, c^2, d^2) \geq e^2 + f^2$$

que és equivalent a la desigualtat proposada.

Es compleix la igualtat si i només si  $MN = 0$  i  $a = b = c = d$ , és a dir, si  $ABCD$  és un rombe.



# DISSECCIONS GEOMÈTRIQUES

Joan Trias i Pairó



## 1. L'art de comptar en Geometria

### 1.1 Introducció

En geometria podem considerar *configuracions geomètriques* formades per rectes, plans, rectangles, circumferències, esferes o altres objectes menys "regulars". Aquestes configuracions descomponen l'espai en parts produint el que anomenarem **disseccions geomètriques**, com es pot veure en algunes de les il·lustracions de la figura 1.




Figura 1. Disseccions geomètriques en el pla creades per rectes, circumferències i rectangles.

Aquestes configuracions generen disseccions geomètriques de l'espai, donen lloc a elements tals com *vèrtexs*, *cares* i *arestes*, i pot ser d'interès saber-los *comptar* o almenys avaluar-ne l'ordre de magnitud o tenir-ne alguna fita superior (vegeu figura 2).




Figura 2. Disseccions amb *vèrtexs*, *arestes*, *cares* (algunes les hem indicat gràficament omplint-les de negre), algunes fitades i d'altres no; en el cas que hi hagi un única cara no fitada la indicarem per  $C_\infty$ .

A la dissecció per rectes en el pla es formen *vèrtexs* (interseccions de rectes), "arestes" (segments i semirectes) i "cares", que poden ser fitades o no. A la dissecció per circumferències es formen *vèrtexs*, *arestes* (arcs de circumferència), totes fitades i "cares" (parts

## Disseccions Geomètriques

del pla limitades per arestes); en aquest tipus de dissecció hi ha una única cara no fitada; la resta són cares fitades.

Actualment aquest no és només un tema d'interès acadèmic o de curiositat intel·lectual, ja que aquestes estructures apareixen en aplicacions de *computació geomètrica*, com per exemple en *gràfics per ordinador* o *disseny geomètric assistit per ordinador*; per al disseny i anàlisi dels algorismes subjacents cal saber comptar o avaluar d'alguna manera el nombre d'elements geomètrics d'una estructura geomètrica.

Ens volem centrar en aquesta part de la publicació en problemes de disseccions geomètriques tant al pla com a l'espai i també en problemes que s'hi poden reduir, com són, per exemple, alguns problemes relatius a políedres; un dels avantatges és que sense requerir coneixements molt específics o amplis previs es poden formular enunciats ben entenedors, que es poden mantenir a un nivell elemental, enunciats prou interessants com perquè siguin atractius i al mateix temps, pel que fa al nivell, prou accessibles perquè siguin abordables.

En aquesta introducció veurem algunes tècniques, alguns resultats, i diversos exemples d'entrenament en el problema de comptar objectes geomètrics; seguirà al final una col·lecció d'enunciats per resoldre.

### 1.2 Les eines de l'ofici

Saber comptar és difícil: exigeix enginy, entrenament, experiència, és tot un art. Ara bé, també hi ha disponibles certes eines bàsiques que podem anomenar eines de l'ofici de comptar, que ens són útils tant per comptar elements en configuracions o disseccions geomètriques com en d'altres circumstàncies.

Dominar l'ofici exigeix l'ús de certes tècniques i disposar de resultats diversos; esementem el més elemental:

- Disponibilitat d'identitats aritmètiques de sumació tancada.
- La inducció matemàtica, en diverses variants.
- Eines i conceptes de combinatòria elemental (i avançada, però no en aquest context).
- Mètodes elementals de resolució de recurrències.
- Relacions especials, com per exemple, la fórmula d'Euler per a grafs planars i altres.

## 2. Eines elementals

Exposem en aquest apartat només les eines més elementals que ens poden ser útils per comptar elements en configuracions geomètriques (i en d'altres situacions).

### 2.1 Identitats aritmètiques de sumació tancada

Algunes identitats aritmètiques interessants són expressions "tancades" de sumes que es presenten amb relativa freqüència, com són per exemple, les següents:

$$1 + 2 + \dots + n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1 + 2^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Es poden provar de diverses maneres; una de les més usuals és aplicant el mètode d'inducció, com veurem a l'apartat següent.

En moltes ocasions aquestes identitats s'utilitzen de forma auxiliar per derivar-ne conclusions més complexes.

Cal tenir present que de vegades es presenten segons diverses variants, com per exemple  $1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1)$ ; s'aplica la mateixa fórmula, però en comptes de  $n$  escrivim  $n - 1$  i resulta, per tant,  $1 + \dots + (n - 1) = \frac{1}{2}(n - 1)((n - 1) + 1) = \frac{1}{2}(n - 1)n$ . O també es presenta en situacions en les que hem de sumar, per exemple,  $3 + 4 + \dots + n$ ; aleshores és  $3 + 4 + \dots + n = (\sum_{k=1}^n k) - 1 - 2 = \frac{1}{2}n(n + 1) - 3$ .

En certes ocasions algunes identitats d'aquests tipus les descobrireu a partir d'experiments modestos, possiblement comptant sobre diversos exemples concrets de configuracions; un cop hom està convençut de la certesa d'una identitat, pot intentar de provar-la per inducció.

## 2.2 La inducció matemàtica

La inducció matemàtica és un mètode de demostració que sol ser molt útil en problemes d'enumeració i de còmput del nombre d'elements de diversos tipus en configuracions geomètriques (i molts altres àmbits de la matemàtica); les situacions a les que hom pot aplicar aquest mètode són essencialment aquelles en les quals es tracta de demostrar una propietat  $P(n)$  que s'enuncia en termes dels nombres naturals  $n \in \mathbb{N}$ .

*Un primer exemple de demostració inductiva.* Vegem la demostració inductiva de la primera de les identitats, segons l'esquema:

$$\begin{aligned} P(1) \\ P(n) \Rightarrow P(n + 1), \end{aligned}$$

on  $P(n)$  és la propietat de ser certa la igualtat

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

*Pas 1.* En primer lloc s'ha d'establir la fórmula per al primer valor per al qual tingui sentit, que és en aquest cas  $n = 1$ ; ara bé, per a  $n = 1$  la prova és una comprovació rutinària de la coincidència dels dos membres de la igualtat a demostrar.


*Pas 2.* En segon lloc, hem de suposar que la identitat és certa per a  $n$  per *hipòtesi d'inducció* i provar que és certa per al valor  $n + 1$ ; aquest pas, juntament amb el primer,

## Disseccions Geomètriques

establirà la propietat per a tot  $n \geq 1$ . Suposant, doncs, que  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$  es compleix, podem escriure, aplicant la hipòtesi d'inducció:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left( \sum_{k=1}^n k \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

com volíem demostrar. Anàlogament provaríem d'altres identitats de sumació similars a aquesta.



*Inducció en geometria.* Considerem una descomposició del pla per  $n$  rectes en regions poligonals. Suposem que dues regions tenen frontera comuna si comparteixen una semirrecta o un segment de longitud no nul·la. Proveu que les regions es poden acolorir globalment amb 2 colors, de tal manera que les que tinguin frontera comuna siguin de colors diferents. El lector provarà de convencer-se que l'enunciat és correcte veient que és possible d'acolorir amb dos colors afegint rectes successives

a les disseccions que es van obtenint a partir de  $n = 1$ ; presentarem aquí la demostració formal inductiva, i farem la demostració per inducció sobre  $n$ ; suposem que els colors són "blanc" (B) i "negre" (N).

### *Demostració.*

*Pas 1.* Per a  $n = 1$  és cert trivialment assignant colors diferents als dos semiplans produïts per l'única recta.

*Pas 2.* Suposem que per hipòtesi d'inducció es poden 2-acolorir (segons el criteri de l'enunciat) totes les disseccions per  $n$  rectes; en afegir una  $(n+1)$ -èsima recta  $r$  arbitrària (figura 3) resulta una descomposició del pla en dos semiplans  $S_1$  i  $S_2$ .





Figura 3

Considerem les coloracions sobre  $S_1$  i  $S_2$  induïdes per la 2-coloració general corresponent a les  $n$  rectes: això no constitueix una 2-coloració de la dissecció produïda per les  $n+1$  rectes, ja que les cares noves que tenen per frontera comú segments o semirectes sobre  $r$  tenen la mateixa coloració. Vegem que podem obtenir una 2-coloració global (figura 4):



1. Mantenim la coloració sobre un dels semiplans, per exemple  $S_2$ ; això deixa establerta una 2-coloració sobre aquest semiplà.
2. Intercanviem els colors de totes les regions de l'altre semiplà,  $S_1$ , és a dir, els blancs passen a negres i els negres passen a blancs: això manté una 2-coloració sobre  $S_2$  i, per l'intercanvi del color de les zones fronteres amb  $S_1$ , obtenim la "compatibilitat" amb la 2-coloració de  $S_1$ ; per tant, globalment s'ha produït una 2-coloració.




Figura 4

### 2.3 Combinatòria elemental


Les eines de la combinatòria són molt útils per comptar elements de configuracions geomètriques; aquí no anirem més enllà de les més elementals. Recordem simplement que el *coeficient binomial* és

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!}, & \text{si } n \geq k \\ 0, & \text{en cas contrari,} \end{cases}$$

on

$$k! = \begin{cases} k(k-1) \cdots 2 \cdot 1, & \text{si } k > 0 \\ 1, & \text{si } k = 0 \end{cases}$$


Vegem dos exemples senzills:



*Exemple 1: Les diagonals d'un polígon.* Les diagonals d'un polígon són els segments determinats per parelles de vèrtexs no consecutius inclosos a l'interior del polígon; en el cas d'un polígon convex, qualsevol segment determinat per dos vèrtexs no adjacents està contingut en el polígon i n'és, per tant, una diagonal. Considerem un polígon convex de  $n$  vèrtexs; es tracta de calcular el nombre de diagonals del polígon: cada diagonal està determinada per una parella de vèrtexs, sense que importi l'ordre, i el nombre de parelles de vèrtexs que es poden escollir en un conjunt de  $n$  vèrtexs és  $\binom{n}{2}$ , però aquest no és el nombre de diagonals,

## Disseccions Geomètriques

ja que també hi són comptats en aquest còmput els costats del polígon, determinats per parelles de vèrtexs consecutius; atès que hi ha  $n$  costats, finalment el nombre de diagonals buscat serà  $d = \binom{n}{2} - n = \frac{1}{2}n(n-3)$ .



*Exemple 2: Disseccions planes per rectes.* Considerem una dissecció del pla determinada per  $n \geq 1$  rectes en posició general, cosa que significa que no n'hi ha dues de paral·leles ni tres que passin per un mateix punt; es tracta de calcular el nombre de vèrtexs, interseccions de rectes, que es produeixen. No pot ser més fàcil: atesa la condició de no haver-hi dues de paral·leles, dues rectes qualsevol determinen un d'aquests vèrtexs i, per l'altra condició, cada vèrtex és intersecció d'exactament dues rectes;

per tant, els vèrtexs són exactament les interseccions de totes les parelles de rectes que es poden formar i, en conseqüència, el nombre de vèrtexs buscat és simplement el nombre de maneres de formar parelles de rectes, és a dir,  $\binom{n}{2}$ .

### 2.4 Resolució de recurrències

Una successió recurrent  $a_n$  és una successió de la qual coneixem explícitament alguns dels primers termes i una relació que ens permet d'obtenir el terme general en funció dels anteriors,

$$a_n = f(a_1, \dots, a_{n-1}).$$

Per exemple, en seria una la següent:

$$a_1 = \sqrt{2}, a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}},$$

que és una possible descripció de la successió els primers termes de la qual serien


$$\sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}, \dots$$

Aquests tipus de successions apareixen molt sovint en còmput del nombre d'elements en configuracions geomètriques (nombre de cares, d'arestes i de vèrtexs) i també en processos de demostració inductiva; el que interessa és obtenir el terme general  $a_n$  expressat en forma tancada en funció de  $n$ ; per exemple, si tenim  $a_1 = 1$ ,  $a_n = a_{n-1} + 1$ , aleshores

$$a_n = a_{n-1} + 1 = (a_{n-2} + 1) + 1 = \dots = a_1 + 1 + \dots + 1 = 1 + \overset{n-1}{\dots} + 1 = 1 + \overset{n}{\dots} + 1 = n, \text{ tot i que no sempre és tan fàcil com en aquest exemple, realment trivial.}$$

De vegades hom pot experimentar i induir quina és l'expressió del terme general en forma tancada, i aleshores es pot intentar de provar-la per inducció; de fet, hi ha mètodes sistemàtics de resoldre el problema, però no els veurem en aquesta secció. En els exemples

geomètrics i en els problemes, només necessitarem aplicar les fórmules de sumació tancada abans esmentades a l'apartat d'identitats aritmètiques per a la resolució de les recurrències que es puguin presentar .



*Exemple geomètric de recurrències.* Sigui novament una dissecció del pla per  $n \geq 2$  rectes en posició general, és a dir se suposa que no hi ha dues rectes paral·leles ni n'hi ha tres que passin per un mateix punt, i es tracta de calcular el nombre d'arestes  $a_n$  de la dissecció (segments de recta i semirectes); considerem una dissecció de  $n$  rectes a l'esquema adjunt i considerem una nova  $(n + 1)$ -èsima recta, indicada amb gruix més gran.

Vegem quin és l'increment d'arestes degut a l'aparició d'una  $(n + 1)$ -èsima nova recta. La recta  $(n + 1)$ -èsima talla les  $n$  rectes per la condició de no paral·lelisme i produeix globalment  $n$  interseccions noves, ja que no pot tallar per la segona condició en un punt d'intersecció, ja preexistent, de dues rectes; la nova recta intercepta, doncs,  $n$  rectes que produeixen  $n + 1$  noves arestes sobre aquesta recta, travessa  $n$  arestes de les rectes que intercepta, una per cada recta, i les descompon en dues, amb la qual cosa l'increment net en el nombre d'arestes creades en aquesta operació és de  $n$ ; globalment, doncs, l'increment d'arestes és de  $(n + 1) + n = 2n + 1$  i, per tant,  $a_{n+1} = a_n + 2n + 1$ ; així, doncs, la successió recurrent a estudiar és

$$a_1 = 1, a_{k+1} = a_k + 2k + 1, k \geq 1.$$

Així podem escriure:

$$a_n = a_{n-1} + 2(n - 1) + 1,$$

$$a_{n-1} = a_{n-2} + 2(n - 2) + 1,$$

...

$$a_3 = a_2 + 2 \cdot 2 + 1,$$

$$a_2 = a_1 + 2 \cdot 1 + 1.$$

Sumant membre a membre, i utilitzant una identitat aritmètica vista anteriorment, s'obté


$$a_n = a_1 + 2((n - 1) + (n - 2) + \dots + 2 + 1) + (1 + \dots + 1) = a_1 + 2(\sum_{k=1}^{n-1} k) + (n - 1) = a_1 + 2 \frac{(n-1)n}{2} + (n - 1) = n^2.$$

Observeu que és absolutament sorprenent que aquest resultat (com molts altres de tipus similar) només depengui del nombre de rectes, però no de quines són, és a dir, de com estan situades.

### 3. La fórmula d'Euler per a disseccions planes

Una relació especialment fructífera per als nostres propòsits de comptar és l'anomenada fórmula d'Euler per a grafs planars poligonals, estructura combinatoria a la quals es poden assimilar certes configuracions geomètriques per tal d'obtenir-ne informació.

#### 3.1 Grafs planars poligonals



la figura 5.

Un graf és una estructura combinatoria que ens permet de representar i estudiar situacions en les quals hi ha una col·lecció d'objectes, que es representen per punts del pla o **vèrtexs**, entre els quals pot haver-hi determinades relacions, que es representen per un enllaç gràfic (segment o arc) o **aresta**; podeu veure adjunt un esquema d'aquestes característiques. En termes formals un **graf**  $G$  és un parell ordenat  $G = (V, A)$ , on  $V$  és el conjunt de vèrtexs i  $A$  és el conjunt d'arestes, és a dir, de parelles de vèrtexs. Segueixen uns quants exemples de grafs a





Figura 5

Un concepte interessant és el de *grau* d'un vèrtex, que és el nombre d'arestes que hi són incidents. Suposarem que els grafs amb els quals tractarem són tots d'"una sola peça" (tècnicament, connexos), és a dir que no hi ha cap desconexió i tots els vèrtexs són connectables amb tots els altres a través d'algun camí.



Com hem dit, un graf és una estructura combinatoria que pot tenir sentit sense necessitat de cap representació gràfica; ara bé, podem intentar de representar-la en el pla de manera que les arestes no es tallin (considerem que les arestes que són incidents a un vèrtex no s'hi tallen); no sempre és possible, com es pot veure (i provar) en el cas de graf adjunt, anomenat  $K_{3,3}$ , que és el clàssic graf dels "veïns enemistats i els tres subministraments"; per més manipulacions gràfiques

que es facin en el moment de la representació del graf és impossible d'evitar que al menys dues arestes es tallin.

Un graf és **planar** si n'existeix alguna representació en el pla en la qual no hi hagi arestes que es tallin, i en aquest cas tenim una representació planar del graf; a la figura 6 en tenim un exemple; apart dels vèrtexs i arestes, podem parlar de *cares* de la representació planar, entre les qual s'inclou l'única no fitada, que indiquem per  $C_\infty$ .

Suposarem que les cares ( $C_\infty$  inclosa) són *polígons* (de com a mínim tres costats), sense arestes ni estructures arbòries que hi penguin; aquests són els **grafs planars poligonals**. No




Figura 6. Observeu com la frontera de la cara no fitada  $C_\infty$  és també un polígon, concretament un pentàgon.

cal que les arestes siguin segments de recta: poden ser arcs de corba. Algunes disseccions geomètriques en el pla, com per exemple les determinades per  $n$  circumferències o per  $n$  rectangles són un cas particular de graf planar poligonal.




Figura 7. Exemples de grafs planars no poligonals; en el graf de la dreta la frontera de la cara  $C_\infty$  no és poligonal.

### 3.2 Fórmula d'Euler

En el context dels grafs planars poligonals connexos és vàlida l'anomenada **fórmula d'Euler**, que relaciona el nombre  $v$  de vèrtexs, el nombre  $a$  d'arestes i el nombre  $c$  de cares ( $c$  inclou la cara  $C_\infty$ ) d'un graf del tipus anterior; concretament podem enunciar el resultat següent:

**Teorema (fórmula d'Euler).** *Sigui  $G = (V, A)$  un graf planar poligonal connex,  $v$  el nombre de vèrtexs,  $a$  el nombre d'arestes i  $c$  el nombre de cares (comptant-hi la cara  $C_\infty$  no fitada). Aleshores es compleix:*

$$c + v = a + 2.$$

La demostració de la fórmula d'Euler en aquesta situació simplificada és molt senzilla i ens servirà com a un exercici addicional en el mètode d'inducció, en una situació lleugerament diferent respecte de l'exemple de la demostració per inducció de les identitats aritmètiques; es recomana al lector que s'ajudi dels esquemes corresponents.

**Demostració de la fórmula d'Euler.** Sigui  $G = (V, A)$  un graf planar poligonal connex; considerem-ne una representació planar. Suposem el nostre graf amb  $v$  vèrtexs,  $a$  arestes i  $c$  cares. Farem la demostració per inducció sobre el nombre de cares  $c$ .

## Disseccions Geomètriques



**Pas 1.** Suposem que  $c = 2$ , nombre mínim possible per a un graf planar poligonal; aleshores el graf està format per un polígon, les cares són  $C$  i  $C_\infty$  i resulta ser  $a = v$ ,  $c = 2$ , amb la qual cosa trivialment es comprova que es compleix la relació.



**Pas 2.** Sigui  $c \geq 3$  i suposem per hipòtesi d'inducció que la fórmula d'Euler es compleix per a tot graf planar poligonal de  $c'$  cares, amb  $c' < c$ ; es tracta de manipular el nostre graf per tal de passar a aquesta situació en la qual podem afirmar la validesa de la fórmula i deduir-ne conseqüències per al nostre graf. Considerem dues cares adjacents, és a dir que comparteixen arestes; concretament comparteixen una cadena de  $r$  arestes amb els corresponents  $r - 1$  vèrtexs; essent  $c \geq 3$ , si eliminem aquesta cadena, les dues cares es fonen en una i globalment en perdem una. Això és justament el que farem: considerem la cadena de les  $r$  arestes comunes a dues cares veïnes de  $G$  i eliminem-la; el graf resultant  $G'$  segueix essent planar poligonal i es compleix:  $v' = v - (r - 1) = v - r + 1$ ,  $a' = a - r$ ,  $c' = c - 1$ ; atès que  $c' < c$  podem aplicar la hipòtesi d'inducció a  $G'$  i afirmar, per tant,  $c' + v' = a' + 2$ . Finalment, substituint a l'última fórmula s'obté  $(c - 1) + (v - r + 1) = (a - r) + 2$ , d'on  $c + v = a + 2$ , com s'havia de veure.

Moltes disseccions planes són de fet grafs planars poligonals i els serà, per tant, aplicable la fórmula d'Euler; vegem-ne un exemple a continuació.




**Exemple d'aplicació de la fórmula d'Euler.** Es considera la figura adjunta formada per un cercle sobre el qual tracem  $n$  segments, amb els extrems situats sobre la circumferència corresponent, que poden o no intersecat-se, de tal manera que no comparteixen extrems sobre la circumferència, és a dir, que cada extrem ho és només d'un segment; suposem que es produeixen  $p$  interseccions dels segments a l'interior del cercle i que cada intersecció ho és d'exactament 2 segments diferents (és a dir, que no hi ha 3 segments que passin pel mateix punt). Es tracta de calcular el nombre de regions internes que es formen.


**Solució.** Calculem el nombre de vèrtexs  $v$ : hi ha  $p$  vèrtexs interiors a la circumferència, i  $2n$  sobre la circumferència; per tant,  $v = 2n + p$ . Pel que fa al nombre d'arestes  $a$  raonem de la manera següent:  $p$  vèrtexs interiors aporten 4 arestes cadascun i els  $2n$  vèrtexs perifèrics n'aportem 3 cadascun; ara bé, comptant d'acord amb aquesta idea comptem duplicadament totes les arestes, ja que cada aresta hi és comptada per cada un dels seus dos extrems, que són vèrtexs; per tant,  $4p + 3(2n) = 2a$ , d'on resulta  $a = 3n + 2p$ . Ara aplicarem la fórmula d'Euler  $c + v = a + 2$  i, per tant,  $c = (3n + 2p) + 2 - (2n + p) = n + p + 2$ . Finalment, el nombre de cares interiors  $c_i$  serà  $c_i = c - 1 = n + p + 1$ . Observem que també es pot calcular immediatament el nombre d'arestes interiors, ja que de perifèriques n'hi ha  $2n$  i, en conseqüència, d'interiors n'hi haurà  $a_i = a - 2n = n + 2p$ . Reviseu on hem fet servir les hipòtesis sobre la configuració.

## 4. Políedres i fórmula d'Euler

### 4.1 Políedres regulars i altres políedres



Un *políedre* és un objecte geomètric limitat per cares planes poligonals que és deformable (“homeomorf”) a esfera; en determinades ocasions quan parlem de políedres ens referirem només a aquesta superfície limitant, que serà una superfície polièdrica tancada. Un convex és un objecte que conté tots els segments determinats per parelles de punts del mateix objecte; existeixen molts de políedres que no són convexos, com per exemple els *estrellats*, com el que podem veure a la figura adjunta: el políedres estrellats es construeixen col·locant piràmides adequades sobre les cares d'un altre políedre convex. A la figura adjunta veiem un exemple de políedre estrellat, que és no convex.



Són ben coneguts els políedres clàssics, els *políedres regulars*, és a dir el tetràedre, cub, octàedre, dodecàedre i icosaèdre; a la figura 8 els podem veure i en aquest paràgraf es pot observar un altre políedre (anomenat icosaèdre truncat) que no és un políedre regular, tot i compleix també determinades condicions de regularitat: l'estructura d'aquest últim políedre és la que dona forma a la “pilota de futbol”.

En aquestes figures observem ben clarament elements geomètrics tals com els *vèrtexs*, les *arestes* i les *cares*. Aquest elements defineixen una estructura de connectivitat que depassa les relacions mètriques en les figures (és a dir, les interdistàncies entre els punts dels objectes) i que es manté si es realitzen determinades transformacions, com certes deformacions que no impliquin ni talls ni trencaments de l'estructura.

Direm que un políedre és “regular” si tots els vèrtexs són incidents al mateix nombre d'arestes i totes les cares són polígons del mateix tipus; aquest és un concepte topològic de políedre regular, on només interessa la forma de les cares i les connectivitats entre vèrtexs i, per tant, s'admet deformació. Si a més s'exigeix que les cares siguin polígons regulars del mateix tipus, aleshores estem fent intervenir aspectes mètrics i obtenim els políedres regulars en sentit clàssic, dels quals es pot demostrar que n'existeixen cinc i no més.

tetràedre



cub



octàedre



dodecàedre



icosaèdre




Figura 8. Els cinc políedres regulars

### 4.2 Políedres i disseccions geomètriques

Perquè parlar de políedres en un tema de disseccions geomètriques? A primera vista no és molta la relació entre políedres i disseccions geomètriques en el pla, però això només és aparent, ja que mitjançant la projecció adequada (tècnicament, una projecció possible és la *projecció estereogràfica*) podem traslladar l'estructura de connectivitat del políedre


## Disseccions Geomètriques

(vèrtexs, arestes i cares) al pla, formant així una dissecció plana i traslladant a propietats del políedre algunes propietats que es puguin obtenir a la dissecció; a la figura 9 podem veure un esquema relatiu al que s'ha esmentat.



**Figura 9.** Projecció estereogràfica. El pla de projecció és tangent a la superfície esfèrica per un punt que podem considerar "pol sud"; el centre de projecció és el punt diametralment oposat o "pol nord" N i la projecció de qualsevol punt  $P \neq N$  de l'esfera és la intersecció del pla amb la recta NP.

A les figures 10,11,12,13 i 14 es veuen projeccions planars o esquemes planars dels políedres regulars; aquestes projeccions poden obtenir-se per projecció estereogràfica, prèvia projecció del políedre sobre l'esfera (deixem molts de detalls tècnics sense precisar), projecció estereogràfica de pol de projecció situat a l'interior del que correspondria a una cara del políedre (el contorn o frontera d'aquesta cara és la que dona lloc a la frontera de l'única cara no fitada de la representació planar corresponent). La projecció estereogràfica és l'eina tècnica rigurosa per fer aquesta operació d'obtenir grafs planars combinatòriament equivalents als políedres, és a dir, amb els mateixos vèrtexs, cares i estructura de connectivitat, oblidant els aspectes mètrics, però de fet es poden obtenir en els casos més senzills aquests esquemes equivalents de forma intuïtiva; el lector es pot entretenir en dibuixar projeccions planars d'altres políedres, com per exemple del cub escapçat o en d'altres políedres més complexos.



**Figura 10.**  
El tetràedre

### 4.3 Fórmula d'Euler per a políedres

Una primera conseqüència és la validesa de la fórmula d'Euler per a políedres (suposem-los convexos, per simplificar, però aquesta restricció no és estrictament necessària), és a dir que es compleix:

$$C + V = A + 2,$$







Figura 11.

*El cub*





Figura 12.

*L'octàedre*





Figura 13.

*El dodecàedre*





Figura 14.

*L'icosàedre*

## Disseccions Geomètriques


on  $C$  el nombre de cares,  $V$  el nombre de vèrtexs i  $A$  el nombre d'arestes.

### 4.4 Exemples d'aplicació

Vegem tres situacions de dificultat progressiva en els quals s'utilitza la fórmula d'Euler per a políedres:




*Exemple 1.* Si ens diuen que l'icosàedre té 12 vèrtexs i 20 cares, el nombre d'arestes no pot ser altre que  $a = c + v - 2 = 30$ , i això també és vàlid per a qualsevol deformació "topològica" de la figura.



*Exemple 2.* Considerem un políedre convex de 10 vèrtexs tal que cada vèrtex és incident amb 3 arestes. Calculeu el nombre de cares i d'arestes. En efecte, considerem un graf planar poligonal associat, per al qual  $v = 10$ ; comptem el nombre d'arestes a partir de les que "aporta" cada vèrtex, que és precisament 3; ara bé, aquesta manera de comptar ens dóna el doble del nombre d'arestes, de manera que poden escriure  $3v = 2a$ , d'on  $a = 15$ . Ara apliquem la fórmula d'Euler per obtenir  $c = a + 2 - v = 7$ . Observeu que el cub

escapçat de la figura demostra que n'existeixen de políedres amb aquestes característiques; construïu diversos grafs planars poligonals associats al políedre.




*Exemple 3.* Considerem un políedre format per cares triangulars i hexagonals, de manera que cada vèrtex és incident amb 3 arestes. Demostreu que té exactament 4 cares triangulars. Obteniu també el nombre de vèrtexs i arestes en funció de les cares hexagonals. Observeu que existeixen políedres que s'ajusten a aquestes característiques, com el de la figura adjunta, que és un tetràedre truncat, obtingut per escapçat o truncament del tetràedre regular.

*Solució.* Siguin  $n_3$  el nombre de cares triangulars i  $n_6$  el nombre de cares hexagonals; òbviament és  $c = n_3 + n_6$ . Comptem el nombre d'arestes a partir de les que aporta cada vèrtex: cada vèrtex contribueix amb 3 al còmput global d'arestes, però com que cada aresta hi és comptada dues vegades, resulta la relació  $3v = 2a$ ; comptem-les ara a partir de les que aporta cada cara: les cares triangulars n'aporten 3, i les hexagonals, 6, però això significa comptar-les duplicadament, ja que totes les cares són polígons i, en conseqüència, tota aresta pertany a la frontera comuna d'exactament 2 cares; per tant, podem escriure  $3n_3 + 6n_6 = 2a$ . Finalment, utilitzant aquestes relacions i substituint a la fórmula d'Euler  $c + v = a + 2$ , s'obté una relació entre  $n_3$  i  $n_6$ , concretament  $(n_3 + n_6) + (n_3 + 2n_6) = \frac{3}{2}n_3 + 3n_6 + 2$ , d'on se'n deriva que  $n_3 = 4$ . Al mateix temps s'obté  $v = 4 + 2n_6$  i  $a = 6 + 3n_6$ .

## 5. Enunciats d'exercicis

Es recomanable d'intentar resoldre els problemes pel màxim de mètodes possibles dels que hom sigui capaç.



**DS1.**— *Amb dos colors n'hi ha prou (1).* Considereu una descomposició o dissecció del pla per  $n$  rectes en regions poligonals. Es considera que dues regions tenen frontera comuna si comparteixen una semirecta o un segment de longitud no nul·la. Formuleu una altra variant de demostració inductiva del resultat que afirma que una dissecció en el pla és 2-acolorible segons la idea següent: elimineu una recta de la dissecció de  $n$  rectes: d'aquesta operació en resulta una dissecció de  $n' = n - 1 < n$  rectes

que és 2-acolorible per hipòtesi d'inducció; continueu amb arguments similars als de la demostració donada.

**DS2.**— *Amb dos colors n'hi ha prou (2).* Es tenen  $n$  circumferències en el pla. Proveu que amb 2 colors n'hi ha prou per acolorir el mapa que determinen. Estudieu si és cert un resultat anàleg per a la dissecció determinada per  $n$  rectangles com els de la figura 15.





Figura 15

**DS3.**— *Disseccions per rectes.* Considereu una dissecció del pla per  $n \geq 1$  rectes en posició general, cosa que significa que no n'hi ha dues de paral·leles ni tres que es tallin en un punt. La dissecció produeix un nombre  $v_n$  de vèrtexs, un nombre  $a_n$  d'arestes (segments de longitud no nul·la o semirectes) i un nombre  $c_n$  de regions poligonals o cares.

a) Proveu que  $v_n = \binom{n}{2}$ ,  $a_n = n^2$  i  $c_n = \binom{n}{2} + n + 1$ .

b) Calculeu el nombre de cares o regions no fitades. Quin és el nombre de cares fitades?

**DS4.**— *Disseccions per plans.* Calculeu en quantes regions polièdriques divideixen l'espai  $n$  plans en posició general (és a dir, tres qualssevol es tallen i no n'hi ha quatre que tinguin un punt comú).

**DS5.**— *Disseccions per circumferències.* Considereu  $n$  circumferències en el pla en posició tal que es tallen dos a dos i no n'hi ha tres que es tallin en un mateix punt. Calculeu el nombre d'interseccions, d'arcs de circumferència i regions planes (limitades pels arcs) que es produeixen.

## Disseccions Geomètriques

**DS6.**— *Disseccions per esferes.*

- Calculeu en quantes regions divideixen l'esfera  $n$  circumferències sobre l'esfera que es tallen dues a dues.
- En quantes parts divideixen l'espai  $n$  esferes si dues qualssevol es tallen.

**DS7.**— *Mapes.* Proveu que si a cada vèrtex d'un mapa convergeix un mínim de 3 fronteres, aleshores hi ha un país que com a molt té cinc fronteres.

**DS8.**— Sigui  $P$  un polígon convex de  $n$  costats tal que no hi ha tres diagonals que es tallin en un punt.

- Calculeu el nombre de diagonals.
- Calculeu el nombre d'interseccions interiors de les diagonals.
- Calculeu el nombre d'arestes produïdes per les diagonals amb les seves interseccions mútues.
- Calculeu el nombre de regions poligonals interiors produïdes per les diagonals.

**DS9.**— Sigui  $P$  un políedre convex amb 12 vèrtexs i 30 arestes. Proveu que totes les cares són triangulars.

**DS10.**— Considereu un políedre convex format per cares triangulars i quadrangulars tal que cada vèrtex pertany a exactament 4 cares. Proveu que conté exactament 8 triangles.

**DS11.**— Considereu un políedre convex de 10 cares tal que tot vèrtex és incident amb 4 arestes exactament. Calculeu el nombre de vèrtexs i d'arestes.



**DS12.**— Considereu un políedre de  $n$  vèrtexs format per cares triangulars (n'existeixen, ja que per exemple l'icosàedre n'és un, entre d'altres possibles). Proveu que el nombre d'arestes és  $a = 3n - 6$  i que el nombre de cares és  $c = 2n - 4$ .

**DS13.**— Proveu que en un políedre de cares quadrangulars es compleix  $a = 2v - 4$  i  $c = v - 2$ .

**DS14.**— Proveu que per a un políedre de cares pentagonals es compleix  $c = \frac{2}{3}(v - 2)$  i  $a = \frac{5}{3}(v - 2)$ .

**DS15.**— Demostreu que si un políedre té totes les cares formades per un mateix tipus de polígon, aleshores només poden ser o triangles o quadrilàters o pentàgons.

**DS16.**— Considerem una dissecció planar poligonal del pla formada per quadrilàters excepte possiblement la cara no fitada. Demostreu que el nombre de vèrtexs de la cara no fitada és parell. Vegeu la versió en termes de políedres: si existeix un políedre amb totes les cares quadrangulars excepte possiblement una, proveu que aquesta hauria de tenir un nombre parell de costats.

DS17.— Demostreu que no existeixen políedres convexos tal que tots els vèrtexs siguin incidents amb sis o més arestes.



DS18.— *Fullerens o pilota de futbol*. Els fullerens són compostos químics de recent descobriment; constitueixen la tercera estructura a l'espai segons la qual es pot trobar el carboni; els àtoms de carboni ocupen els vèrtexs d'un políedre format per cares pentagonals o hexagonals i els enllaços dobles o simples constitueixen les arestes de l'estructura polièdrica, de manera que cada carboni s'enllaça exactament amb tres carbonis veïns. És la mateixa estructura, en un cas concret, que la de la pilota de futbol. Considereu un políedre convex tal que per a tot vèrtex hi ha exactament 3 arestes incidents i les cares són pentagonals o hexagonals. Proveu que ha de tenir exactament 12 cares pentagonals.

DS19.— *Buckminsterfullerè*. El buckminsterfullerè és un compost químic format per 60 àtoms de carboni enllaçats entre sí formant una estructura polièdrica convexa. Cada àtom està enllaçat a exactament 3 àtoms, i sabem que les cares són hexàgons o pentàgons.

- Calculeu el nombre d'hexàgons.
- Calculeu el nombre de pentàgons.
- Calculeu el nombre d'arestes.

DS20.— Demostreu que no existeix cap políedre format per cares hexagonals, pentagonals i amb tots els vèrtexs de grau 4, és a dir, incidents amb 4 arestes.

DS21.— Si un políedre és de cares pentagonals i tots els vèrtexs són incidents amb un mateix nombre  $g$  d'arestes, proveu que  $g = 3$ .



DS22.— *Triangulacions*. Considerem polígons de  $n \geq 3$  vèrtexs (no necessàriament convex) sense forats; una *diagonal interna* d'un polígon és un segment determinat per dos vèrtexs no consecutius, contingut al polígon. Una *triangulació* d'un polígon és una descomposició en reunió de triangles produïts afegint diagonals internes, de

tal manera que els solapaments entre triangles siguin d'àrea nul·la. La descomposició no és única, com es pot veure fàcilment. Demostreu:

- Un polígon sempre és triangulable. *Indicació*: demostreu l'existència d'alguna diagonal interna, utilitzeu-la per descompondre el polígon en dos polígons de nombres inferiors de costats respectivament i acabeu la demostració per inducció.
- Si tenim una triangulació d'un polígon mitjançant  $t$  triangles produïts afegint  $m$  diagonals internes, calculeu  $t$  i  $m$  en funció de  $n$ , demostrant així que són independents de la particular triangulació, i només depenen del nombre de vèrtexs. El resultat a provar és:  $t = n - 2$ ,  $m = n - 3$ .
- Demostreu com a conseqüència dels apartats anteriors que la suma dels angles interiors d'un polígon de  $n$  costats és  $\pi(n - 2)$ . Quina és la suma dels exteriors?

## Disseccions Geomètriques

d) Un vèrtex d'un polígon es diu *convex* si l'angle interior corresponent és menor estricte que  $\pi$ . Proveu que tot polígon té un mínim de 3 vèrtexs convexas.

**DS23.**— *Enunciat de la XXX Olimpíada Matemàtica, 26 de Febrer 1994 (generalitzat).*  
Un polígon de  $n$  costats es descompon en  $m$  triangles amb interiors disjunts, de manera que cada costat d'aquests  $m$  triangles ho és també d'alguns altre triangle contigu o del polígon donat.

a) Demostreu que  $m + n$  és parell.

b) Coneguts  $n, m$ , trobeu el nombre de costats diferents que queden a l'interior del polígon i el nombre de vèrtexs diferents que queden a aquest interior.

Indicació: podeu resoldre'l directament, utilitzant la fórmula d'Euler, o bé indirectament utilitzant els resultats del problema de triangulació. En el cas convex la resolució és més simple.

## EQUACIONS FUNCIONALS

Claudi Alsina i Català

El gran motor de les matemàtiques és la resolució de problemes, activitat en la qual es combinen enginy i coneixement, mètode científic i aventura intel·lectual. En aquest petit article us voldríem aproximar a la resolució d'unes equacions molt especials dites equacions funcionals.

La teoria d'equacions funcionals ha nascut aquest segle de la mà d'un gran matemàtic hongarès: el professor Janos Aczél. Els precedents històrics són moltes contribucions disperses de J. D'Alembert, L. Euler, L.A. Cauchy, A.M. Legendre, C.F. Gauss, etc., que a partir del naixement del concepte de funció estudiaren algunes equacions on les incògnites eren funcions. Avui hi ha uns 200 matemàtics al món dedicats a resoldre aquestes equacions les quals neixen o de la pròpia matemàtica o de molts camps d'aplicació com són l'economia, la computació, la física, l'estadística, etc.

Aquí farem una presentació senzilla d'equacions funcionals per tal que si teniu ocasió de participar en olimpíades matemàtiques, on sovint hi ha problemes amb aquestes equacions, sapiguen com atacar-los. Resoldre aquestes equacions és una activitat matemàtica apassionant a la que tots i totes hi esteu convidats ara i sempre.

Però... què és una equació funcional?

Amb llenguatge senzill podem dir que una *equació funcional* és una igualtat on l'incògnita és una funció (o diverses).

Observeu les següents igualtats:

$$(1) 2 + 2 = 4 \quad (2) 8x^2 + x - 1 = 0 \quad (3) f(x \cdot y) = f(x) + y$$

El cas (1) és una identitat aritmètica, el cas (2) és una equació algebraica de segon grau on l'incògnita  $x$  podrà ser aïllada mitjançant un procés que ens portarà als possibles valors numèrics solució. El cas (3) és una equació funcional: desitgem saber quines funcions  $f$  poden satisfer la relació donada en (3).

## Equacions Funcionals

Les següents expressions són equacions funcionals:

$$(4) f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$(5) f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$$

$$(6) f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$$

$$(7) f(x^2) = 2f(x)$$

$$(8) f(f(x)) = x$$

$$(9) f(x^2) + f(x) = \sin x$$

En els casos (4), (5) i (6) trobem equacions funcionals amb diverses variables ( $x, y$ ) mentre que en (7), (8) i (9) veiem equacions funcionals en una sola variable ( $x$ ). En tots aquests casos la funció incògnita  $f$  és d'una variable. També hi ha equacions amb diverses funcions incògnites i amb funcions de diverses variables.

### L'equació més emblemàtica

Per la seva llarga història, i per la seva constant presència en la resolució de moltes altres equacions, destaca amb llum pròpia l'equació funcional de Cauchy:

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

Fent  $x = y = 0$  resulta  $f(0) = 0$  i aleshores fent  $y = -x$  resulta  $f(-x) = -f(x)$ . En els nombres naturals hom obté:

$$f(n) = f(\underbrace{1+\dots+1}_n) = f(1) + \underbrace{\dots+f(1)}_n = f(1) \cdot n.$$

En els nombres enters, vist que  $f(+n) = f(1) \cdot (+n)$  en els positius,  $f(0) = 0$  i  $f(-n) = f((-1)n) = -f(n) = f(1)(-n)$  també resulta que  $f(x) = f(1) \cdot x$ . En els nombres racionals  $m/n$  amb  $m, n > 0$  serà

$$f(1) = f\left(\frac{n}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right) + \underbrace{\dots+f\left(\frac{1}{n}\right)}_n = f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot n,$$

o sigui  $f(1/n) = f(1)/n$  i per tant

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(m \cdot \frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n} + \underbrace{\dots+1}_{m-1} + \frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot m = f(1) \frac{m}{n}$$

i d'aquí  $f(x) = f(1) \cdot x$ .

En els nombres reals poden existir infinites solucions de l'equació de Cauchy diferents de  $f(x) = f(1) \cdot x$  si hom no suposa cap condició especial a  $f$ . Però si es suposa que  $f$  és



contínua en la recta real o  $f$  és contínua en un punt o  $f$  és creixent o decreixent, o  $f$  es positiva en un interval, etc. aleshores  $f(x) = f(1) \cdot x$  és l'única solució. La idea bàsica és que si  $f(x) = f(1)x$  en els racionals i suposem continuïtat, com que qualsevol real es pot aproximar per racionals aleshores passant al límit també serà  $f(x) = f(1)x$  per a qualsevol real  $x$ .

Equacions relacionades amb la de Cauchy i molt bàsiques són les següents:

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$$

que té com a solucions contínues  $f(x) \equiv 0$  i  $f(x) = e^{cx}$ . Si considerem l'equació

$$f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$$

vàlida per tot  $x, y > 0$  i  $f$  és contínua aleshores  $f(x) = c \ln|x|$ . Si

$$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$$

les solucions contínues són  $f(x) = |x|^c$  (  $| \quad |$  indica valor absolut),  $f(x) = 0$  i  $f(x) = |x|^c \cdot \text{signe}(x)$ . Si mirem l'equació de Jensen

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2},$$

les solucions contínues són rectes  $f(x) = ax + b$ . En el cas de l'equació de D'Alembert

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) \cdot f(y)$$

trobem les solucions contínues  $f(x) \equiv 0$ ,  $f(x) = \cos bx$ ,  $f(x) = \cosh bx$  (cosinus hiperbòlic).

Cal notar com apareixen solucions amb constants arbitràries però que hi ha casos en que les solucions poden dependre de funcions arbitràries. Això passa molt amb les equacions d'una sola variable. D'una equació o condició tal com  $f(-x) = f(x)$  el màxim que podríem dir es que la seva solució és

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & \text{si } x \leq 0, \\ g(-x), & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

on  $g$  és una funció arbitrària definida en els reals no positius.

## Equacions Funcionals

Que és el primer que cal mirar en una equació funcional?

Hi ha diverses informacions, explícites o implícites, que són importants d'observar en considerar una equació funcional:

(a) *Quin és el domini?*

Pot tractar-se de funcions definides en nombres naturals, enters, racionals, reals, complexos... o en un subconjunt d'aquests o en vectors, o matrius o d'altres funcions... Quins elements distingits hi ha en el domini i quina estructura hi coneixem? Això ajudarà a fer substitucions o a operar.

(b) *Quin és el conjunt de valors?*

Pot tractar-se de funcions que pren valors en el mateix domini o en un altre conjunt... i això pot delimitar les solucions possibles.

(c) *Quines funcions o operacions conegudes hi ha?*

Ben segur que a l'equació hi ha moltes vegades, junt a la funció incògnita, algunes funcions conegudes que ens seran d'ajut en fer càlculs.

(d) *Quines condicions satisfà la funció incògnita?*

A més de l'equació podem tenir condicions addicionals com continuïtat, creixement, positivitat,... etc. Aquestes condicions ens han de permetre fer determinades operacions i a la vegada ens delimitaran les solucions que cerquem.

**Problema.** Determineu les funcions  $f(x)$  definides en els enters i que prenen valors reals positius que són estrictament creixents i satisfan l'equació

$$f(x+y) = f(x) \cdot e^y.$$

Aquí tant  $x$  com  $y$  són enters;  $f(x+y)$  i  $f(x)$  són reals positius; en l'equació apareixen les funcions conegudes  $x+y$  (suma),  $a \cdot b$  (producte) i  $e^y$  (exponencial). Volem  $f$  estrictament creixent.

Per exemple, fent la substitució  $x = 0$  tindrem

$$f(y) = f(0+y) = f(0) \cdot e^y$$

que determina totalment  $f(y)$ , llevat d'una constant arbitrària  $f(0)$  que haurà de ser positiva. Noteu que si feu la substitució  $y = 0$  no sortiria res ( $f(x) = f(x)$ ) i que si no

s'hagués dit res sobre el creixement estricte de  $f$  hauria pogut sortir la solució  $f(y) \equiv 0$  (amb  $f(0) = 0$ ) o  $f(y) = f(0) \cdot e^y$  amb  $f(0)$  qualsevol valor. Si s'hagués dit que  $f$  prenia valors enters i res sobre creixement hauria sortit  $f(y) = f(0)e^y$  la qual cosa donaria valors enters sols en el cas  $f(0) = 0$ .

## Set bons consells que podeu fer vostres

Avui es coneixen bastants mètodes per a resoldre equacions funcionals. Alguns són senzills i ràpids. D'altres són sofisticats i lents. Però triar un bon mètode és, i serà sempre, un art. Cada equació és un repte que exigeix fer-hi feina i posar-hi imaginació. L'ofici matemàtic ens porta no sols a resoldre aquestes equacions sinó també a fer-ho de la manera més simple possible, la més elegant. Per ajudar-vos a resoldre equacions senzilles us oferim set consells que podeu tenir en compte.

*I. Una mateixa equació pot tenir solucions diferents en dominis diferents o en rangs diferents o en classes de funcions diferents.*

En efecte, considerem l'equació

$$(*) \quad f(xy) = f(x) + f(y).$$

Si suposem que el nombre zero pertany al domini de la funció podem fer  $x = y = 0$  en (\*) i surt  $f(0) = f(0) + f(0)$  o sigui  $f(0) = 0$  i fent ara la substitució  $y = 0$  en (\*) on deixarem la variable  $x$  arbitrària tindrem  $f(x \cdot 0) = f(x) + f(0)$ , és a dir,  $f(x) \equiv 0$ . Així sols la funció zero és solució de (\*) quan el nombre 0 és del domini de  $f$ . En canvi si el zero no pertany al domini l'equació (\*) pot tenir altres solucions com  $f(x) = \log|x|$ . Seguint explotant (\*) podem notar que si l'imatge de  $f$  estés situada en els nombres reals positius aleshores  $\log|x|$  no seria solució i si volguéssim veure solucions  $f$  de (\*) estrictament creixents de  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  en  $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ , en ser  $f(y) > 0$  i tenir  $f(x) < f(x) + f(y) = f(xy)$  aleshores per  $0 < x, y < 1$  seria  $xy < x$  i  $f(x) < f(xy) < f(x)$  contradicció que ens diu la no existència de solucions estrictament creixents.

*II. Feu substitucions de les variables per valors numèrics i intenteu treure el màxim profit*

## Equacions Funcionals

del coneixement de la funció en certs valors... jugant amb la pròpia equació i estenent les solucions d'uns dominis a d'altres més amplis.

D'acord amb el domini de les funcions incògnites és recomanable fer substitucions de les variables per valors especialment rellevants per al domini i per a l'equació. Per exemple,  $x = 0$ ,  $x = 1$ ,  $x = 2^k$ ,  $x = -1$ ,... anar mirant com es comporta la funció en punts concrets o en subconjunts interessants del domini (nombres naturals, potències de dos, nombres primers, nombres enters, nombres racionals,...).

**Problema (CMO 75).** Sigui  $f$  una funció dotada de les següents propietats:

- (1)  $f(n)$  està definida per qualsevol enter positiu  $n$ ;
- (2)  $f(n)$  és un nombre enter;
- (3)  $f(2) = 2$ ;
- (4)  $f(m \cdot n) = f(m) \cdot f(n)$  per a tots els enters positius  $n$  i  $m$ ;
- (5)  $f(m) > f(n)$  sempre que  $m > n$ .

Demostreu que  $f(n) = n$  per a tot enter positiu.

*Solució.* Combinant (3) i (4) resulta  $f(2^k) = 2^k$  per tot  $k = 0, 1, 2, \dots$ . Tenint en compte que

$$2^k < 2^k + 1 < 2^k + 2 < \dots < 2^k + 2^k - 1 < 2^{k+1},$$

resultarà per als valors de  $f$ :

$$2^k = f(2^k) < f(2^k + 1) < \dots < f(2^{k+1} - 1) < f(2^{k+1}) = 2^{k+1},$$

la qual cosa diu que entre  $2^k$  i  $2^{k+1}$  hi ha  $2^{k+1} - 2^k - 1 = 2^k - 1$  enters diferents. Per tant  $f(2^k + j) = 2^k + j$ , i  $f(n) = n$  per a tot  $n$ .

**Problema (AMO 95)** Determineu totes les funcions que prenen valors reals i definides en el conjunt dels nombres reals positius tals que:

- (1)  $f(xy) = f(x)f\left(\frac{3}{y}\right) + f(y)f\left(\frac{3}{x}\right)$  per a  $x, y$  reals positius;
- (2)  $f(1) = \frac{1}{2}$ .

*Solució:* Usant (2) i (1) amb  $x = y = 1$  resulta  $f(3) = 1/2$  i fent  $y = 1$  en (1) tindrem aleshores  $f(x) = f(x)f(3) + f(1)f\left(\frac{3}{x}\right)$ , és a dir,  $f(3/x) = f(x)$ . Aquesta descoberta ens

permet reescriure (1) en la forma  $f(xy) = 2f(x)f(y)$  i fent  $x = y$  tindrem

$$\begin{aligned} 2f(x)^2 &= f(x^2) = f(x) \cdot f\left(\frac{3}{x}\right) + f(x)f\left(\frac{3}{x}\right) \\ &= f\left(x \cdot \frac{3}{x}\right) = f(3) = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

és a dir,  $f(x)^2 = 1/4$  i per tant

$$f(x) = f(\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}) = 2f(\sqrt{x})f\left(\frac{3}{\sqrt{x}}\right) = 2f(\sqrt{x})^2 = \frac{1}{2}.$$

**Problema (TELECOM 93 AMO)** Per a cada funció definida en tots els reals i satisfent:

- (i)  $f(x \cdot y) = x \cdot f(y) + f(x) \cdot y$ ;  
 (ii)  $f(x + y) = f(x^{1993}) + f(y^{1993})$ ; determineu el valor  $f(\sqrt{5753})$ .

**Solució.** Fent  $x = y = 1$  en (i) resulta  $f(1) = 0$  i fent  $x = y = 0$  en (ii) surt  $f(0) = 0$ . Si aleshores fem  $y = 0$  en (ii) serà  $f(x) = f(x + 0) = f(x^{1993}) + f(0) = f(x^{1993})$ , és a dir,  $f(x + y) = f(x) + f(y)$  i per tant en els naturals serà  $f(n) = f(1) \cdot n = 0$ . Usant ara (i) serà per a  $x = y = \sqrt{5753}$ ,  $2\sqrt{5753}f(\sqrt{5753}) = f(5753) = 0$  o sigui  $f(\sqrt{5753}) = 0$ .

**III. Feu canvis de variables o substitucions que lliguin les variables entre sí i estudeu les equacions que resulten en aquests dominis restringits**

Si en una equació amb dues variables  $x, y$  feu  $y = x$  us quedarà una equació d'una sola variable per analitzar. També podeu fer proves de l'estil  $y = tx$ ,  $y = x^2$ , ... podeu combinar perfectament aquestes "noves" equacions amb les de partida.

**Problema (AMO 91)** Demostreu que hi ha exactament una funció  $f$  definida en tots els reals no nuls que satisfà

- (i)  $f(x) = xf(1/x)$ , per tot real  $x$  no nul;  
 (ii)  $f(x) + f(y) = 1 + f(x+y)$ , per a tota parella  $(x, y)$  de reals no nuls i tals que  $x \neq -y$ .

**Solució.** Fent la substitució  $x = y = t/2$  en (i) i (ii) resulta

$$f\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{t}{2}f\left(\frac{2}{t}\right) \quad \text{i} \quad 2f\left(\frac{t}{2}\right) = 1 + f(t),$$

i combinant ambdues expressions tenim

$$\frac{1 + f(t)}{t} = \frac{2}{t}f\left(\frac{t}{2}\right) = f\left(\frac{2}{t}\right) = 2f\left(\frac{1}{t}\right) - 1 = \frac{2}{t}f(t) - 1,$$

## Equacions Funcionals

és a dir,  $f(t) = 1 + t$ . És immediat verificar que  $1 + t$  satisfà les condicions inicials.

IV. Observeu l'equació funcional amb detall i esbrineu si coneixeu d'entrada alguna solució. Aquesta informació pot ser molt útil per a resoldre-la.

En efecte si  $f_0(x)$  és una solució particular que es veu a ull podeu, per exemple, introduir una nova funció  $h(x) = f(x) - f_0(x)$  i intentar veure si l'equació satisfeta per  $h(x)$  porta a  $h(x) \equiv 0$ . També podríem introduir  $h(x) = f(x)/f_0(x)$  si  $f_0$  mai no s'anul·lés i intentar veure si  $h(x) \equiv 1$ .

**Problema** (TELECOM 94 AMO) Determineu totes les funcions  $f$ , definides en tots els nombres racionals i amb valors reals, tals que

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy.$$

*Solució.* Mirant l'equació amb ulls atents descobrim que sabem veure almenys la solució  $f(x) = x^2$  ja que  $(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$ . Introduïm aleshores la funció  $h(x) = f(x) - x^2$  i mirem quina equació satisfarà:

$$h(x+y) + (x+y)^2 = f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$$

$$h(x) + x^2 + h(y) + y^2 + 2xy,$$

i simplificant resulta  $h(x+y) = h(x) + h(y)$ . Així amb gran alegria retrobem l'equació de Cauchy i ja sabem que  $h(x) = c \cdot x$  en els  $x$  racionals. Per tant, haurà de ser  $f(x) = h(x) + x^2 = cx + x^2$ . Però hem de comprovar si realment aquesta funció és solució per a qualsevol valor de  $c$ :

$$f(x+y) = c(x+y) + (x+y)^2 = cx + x^2 + cy + y^2 + 2xy = f(x) + f(y) + 2xy.$$

Feina ben feta! Finalment s'ha resolt totalment el problema.

V. Intenteu introduir canvis funcionals que us permetin passar de l'equació donada a un altre ja coneguda... i torneu endarrera desfent el canvi.

Això ho fem sempre resolent problemes de matemàtiques: aprofitar problemes coneguts per a resoldre'n d'altres.

**Problema.** Trobeu les funcions  $f$  definides en els nombres racionals i amb valors reals positius que satisfan l'equació

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y),$$

per a qualssevol  $x, y$  reals.

**Solució.** Coneixent la funció logaritme neperià i aplicant-la als dos membres de l'equació (la qual cosa té sentit ja que suposem  $f(x)$  estrictament positiva):

$$\ln f(x+y) = \ln f(x) + \ln f(y),$$

Així la nova funció  $g(x) = \ln f(x)$  satisfà l'equació de Cauchy en els racionals i per tant serà  $g(x) = g(1)x$ , és a dir,  $\ln f(x) = \ln f(1) \cdot x$ , o sigui,  $f(x) = e^{\ln f(1) \cdot x}$ , essent  $\ln f(1) = k$  una constant. És fàcil veure que la funció  $e^{kx}$  satisfà l'equació qualsevol que sigui  $k$ . Noteu que per  $k = 0$  tenim la solució constant  $f(x) \equiv 1$ .

VI. Tenint en compte la pròpia equació funcional i les condicions requerides a la funció incògnita podeu deduir noves condicions de la funció... que a la seva vegada poden ajudar a resoldre l'equació.

Sovint trobareu equacions i condicions sobre les funcions incògnites tals com ser creixent, decreixent, positiva, continua, derivable, bijectiva,... aleshores mireu si l'equació us permet deduir alguna condició més.

**Problema.** Una funció  $f$  definida en els nombres reals i a valors reals positius satisfà l'equació  $f(x+y) = f(x) + f(y)$ . Proveu que  $f$  es estrictament creixent.

**Solució.** Com que  $f(z) > 0$  per a tot real  $z$  aleshores si  $x < y$  serà  $f(y) = f(x+(y-x)) = f(x) + f(y-x) > f(x)$  i per tant  $f$  és estrictament creixent.

**Problema (AMOC 95).** Sigui  $f$  una funció, definida en tots els nombres reals i prenent valors reals no nuls, tal que

$$f(x+2) = f(x-1)f(x+5)$$

per a tot  $x$ . Proveu que  $f$  és periòdica, és a dir, existeix un nombre positiu  $P$  tal que  $f(x+P) = f(x)$  per a tots els nombres reals  $x$ .

## Equacions Funcionals

*Solució.* Caldrà manipular directament l'equació donada fins a fer aparèixer la condició de periodicitat:

$$\begin{aligned}f(x+6) &= f(x+4+2) = f(x+4-1)f(x+4+5) \\ &= f(x+3)f(x+9) = f(x+1+2)f(x+9) \\ &= f(x) \cdot f(x+6) \cdot f(x+9),\end{aligned}$$

i essent  $f$  mai nul·la, resulta  $f(x+9) = 1/f(x)$  d'on  $f(x+18) = f(x+9+9) = \frac{1}{f(x+9)} = f(x)$ . Vet aquí que el període buscat és  $P = 18$  (o un dels seus múltiples!).

*VII. Cal verificar sempre si les funcions obtingudes resolent una equació funcional són realment solucions de l'equació de partida.*

Com que en resoldre una equació fem substitucions, igualtats o relacions entre variables, etc., pot ser que surti una funció que essent solució d'una de les equacions intermèdies no ho sigui de l'equació inicial. I també pot succeir que en verificar si una "aparent" solució ho és realment ens veiem forçats a restringir la classe de solucions.

*Problema.* Trobeu les funcions  $f$ , definides en els nombres reals i a valors reals, que satisfan l'equació funcional

$$f(x^2 + y) = f(x) + y^2,$$

per a tots els  $x, y$  reals.

*Solució.* Fent la substitució  $x = 0$  resulta  $f(y) = f(0) + y^2$ , però en verificar si aquesta funció satisfà l'equació de partida ens trobem que hauria de ser

$$f(0) + (x^2 + y)^2 = f(0) + x^2 + y^2,$$

que és impossible. Per tant l'equació donada no té solució.

*Problema (CMO 68).* Sigui  $k$  un enter positiu. Trobeu tots els polinomis  $P(x)$  amb coeficients reals satisfent l'equació  $P(P(x)) = P(x)^k$ .

*Solució.* Sigui  $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$  de grau  $n$ . Si  $P(x)$  ha de satisfer  $P(P(x)) = P(x)^k$ , haurà de ser: grau  $P(P(x)) = n^2 =$  grau  $P(x)^k = n \cdot k$ , o sigui,  $n^2 = nk$ , la qual cosa porta als casos  $n = 0$  o  $n = k$ . Si  $n = 0$  serà  $P(x) = a_0$  constant i en satisfer-se  $a_0^k = a_0$  resultarà que si  $k = 1$ ,  $a_0$  es qualsevol constant però si  $k \neq 1$  necessàriament  $a_0 = 0$  o  $a_0 = 1$ . Si  $n = k$  i  $a_k \neq 0$ , mirant els coeficients de  $x^{k^2}$  en la



igualtat  $P(P(x)) = P(x)^k$  resulta  $a_k^{k+1} = a_k^k$  d'on  $a_k = 1$ . Aleshores (feu-ho!) surt també  $a_{k-1} = a_{k-2} = \dots = a_1 = a_0 = 0$  resultant en aquest cas  $P(x) = x^k$ .

### Problemes.

Els següents problemes han sortit en l'Olimpíada Matemàtica Internacional (IMO) o en l'Austriana (AMO). Són vint reptes que podeu intentar resoldre. En l'apartat final d'indicacions podrem confirmar les solucions trobades o si aneu perduts veure com podríeu començar.

EF1. (IMO 68). Sigui  $f$  una funció real definida per a tots els nombres reals  $x$  i tal que, per alguna constant positiva  $a$ ,  $f$  satisfà l'equació  $f(x+a) = \frac{1}{2} + (f(x) - [f(x)]^2)^{1/2}$ , per a tot  $x$ . Demostreu que la funció  $f$  és periòdica (és a dir, existeix un nombre positiu  $b$  tal que  $f(x+b) = f(x)$  per a tot  $x$ ). Per  $a = 1$ , doneu un exemple d'una funció no constant que satisfaci les propietats esmentades anteriorment.

EF2. (IMO 72). Siguin  $f$  i  $g$  funcions reals definides per a tots els valors reals  $x, y$  i satisfent l'equació  $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)g(y)$ , per tots els  $x, y$ . Demostreu que si  $f(x)$  no és idènticament zero i si  $|f(x)| \leq 1$  per a tot  $x$ , aleshores  $|g(y)| \leq 1$ , per a tot  $y$ .

EF3. (IMO 75). Trobeu tots els polinomis  $P$  de dues variables que satisfan les següents condicions:

- (i) Per a un enter positiu  $n$  i per a tots els reals  $t, x, y$  és  $P(tx, ty) = t^n P(x, y)$ ; és a dir,  $P$  es homogeni de grau  $n$ .
- (ii) Per a tots els reals  $a, b, c$ , és

$$P(b+c, a) + P(c+a, b) + P(a+b, c) = 0,$$

- (iii)  $P(1, 0) = 1$ .

EF4. (IMO 77). Sigui  $f(n)$  una funció definida en el conjunt de tots els enters positius i amb valors en el mateix conjunt. Demostreu que si  $f(n+1) > f(f(n))$  per a qualsevol enter positiu  $n$ , aleshores  $f(n) = n$ , per a tot  $n$ .

### Equacions Funcionals

**EF5.** (IMO 78). El conjunt de tots els enters positius és la unió de dos subconjunts disjunts  $\{f(1), f(2), \dots, f(n), \dots\}$  i  $\{g(1), g(2), \dots, g(n), \dots\}$ , ón  $f(1) < f(2) < \dots < f(n) < \dots$ ,  $g(1) < g(2) < \dots < g(n) < \dots$  i  $g(n) = f(f(n)) + 1$  per a qualsevol  $n \geq 1$ . Determineu  $f(240)$ .

**EF6.** (IMO 81). La funció  $f(x, y)$  satisfà les equacions:

(1)  $f(0, y) = y + 1$ , (2)  $f(x + 1, 0) = f(x, 1)$ , (3)  $f(x + 1, y + 1) = f(x, f(x + 1, y))$ ,  
per a tots els enters no-negatius  $x, y$ . Determineu  $f(4, 1981)$ .

**EF7.** (IMO 82). La funció  $f(n)$  està definida per a tots els enters positius  $n$  i pren valors enters no negatius. Ademès, per a tot  $m, n$  és  $f(m + n) - f(m) - f(n) = 0$  o  $1$ ,  $f(2) = 0$ ,  $f(3) > 0$  i  $f(9999) = 3333$ . Determineu  $f(1982)$ .

**EF8.** (IMO 83). Trobeu totes les funcions  $f$  definides en el conjunt dels nombres reals positius prenent valors reals positius i satisfent les condicions:  $f(x \cdot f(y)) = yf(x)$  per a tots els positius  $x, y$ ;  $f(x) \rightarrow 0$  quan  $x \rightarrow \infty$ .

**EF9.** (IMO 84). Determineu totes les funcions contínues  $f$  tals que, per a tots els valors reals  $x, y$ ,  $f(x + y) \cdot f(x - y) = \{f(x) \cdot f(y)\}^2$ .

**EF10.** (IMO 86). Trobeu totes les funcions  $f$ , definides en els nombres reals no negatius i prenent valors reals no negatius, tals que

(i)  $f(x \cdot f(y)) \cdot f(y) = f(x + y)$  per tot  $x, y \geq 0$ ;

(ii)  $f(2) = 0$ ;

(iii)  $f(x) \neq 0$  si  $0 \leq x < 2$ .

**EF11.** (IMO 87). Demostreu que no pot existir una funció  $f$  del conjunt dels enters no negatius en ell mateix tal que  $f(f(n)) = n + 1987$  per a tot  $n$ .

**EF12.** (AMO 87). Una funció  $f(m, n)$  està definida, per a tots els enters positius  $m \geq n$ ,

per:

(i)  $f(m, n) = \sqrt{n + f(m, n + 1)}$ , si  $m > n$ ;

(ii)  $f(n, n) = \sqrt{n}$ ; per a tot  $n$ .

Proveu que  $f(1988, 1) < 2$ .

**EF13.** (IMO 88). Una funció  $f$  està definida en els enters positius per  $f(1) = 1$ ;  $f(3) = 3$ ;  $f(2n) = f(n)$ ;  $f(4n + 1) = 2f(2n + 1) - f(n)$ ;  $f(4n + 3) = 3f(2n + 1) - 2f(n)$ ; per a tots els enters positius  $n$ . Determineu el nombre d'enters positius  $n$ , menors o iguals que 1988, per als quals  $f(n) = n$ .

**EF14.** (AMO 88). Una funció  $f$  satisfà les següents condicions

(i) Per a cada nombre racional  $x$ ,  $f(x)$  és un nombre real;

(ii)  $f(1988) \neq f(1987)$ ;

(iii)  $f(x + y) = f(x) \cdot f(y) - f(xy) + 1$ , per tots els racionals  $x, y$ .

Demostreu que  $f(-1987/1988) = 1/1988$ .

**EF15.** (AMO 89). Sigui  $f(n)$  definida per a tots els enters positius  $n$ . Se sap que

(i)  $f(f(n)) = 4n + 9$ , per a tot enter positiu  $n$ ;

(ii)  $f(2^k) = 2^{k+1} + 3$ , per a tot enter no negatiu  $k$ .

Determineu  $f(1789)$ .

**EF16.** (IMO 90). Sigui  $\mathbb{Q}^+$  el conjunt de nombres racionals positius. Construïu una funció  $f : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$  tal que  $f(xf(y)) = f(x)/y$ , per a tots  $x, y$  en  $\mathbb{Q}^+$ .

**EF17.** (AMO 90). Sigui  $f$  una funció definida en tots els nombres reals i amb valors reals. Suposem que, per a tots els reals  $x, y$ , la funció  $f$  satisfà

(1)  $f(2x) = f\left(\sin\left(\frac{\pi x}{2} + \frac{\pi y}{2}\right)\right) + f\left(\sin\left(\frac{\pi x}{2} - \frac{\pi y}{2}\right)\right)$ ;

(2)  $f(x^2 - y^2) = (x + y)f(x - y) + (x - y)f(x + y)$ .

Demostreu que aquestes condicions determinen unívocament  $f(1990 + 1990^{1/2} + 1990^{1/3})$  i doneu el seu valor.

### Equacions Funcionals

**EF18.** (IMO 92). Sigui  $\mathbb{R}$  el conjunt dels nombres reals. Trobeu totes les funcions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tals que  $f(x^2 + f(y)) = y + f(x)^2$ , per a tot  $x, y$  en  $\mathbb{R}$ .

**EF19.** (IMO 93). Sigui  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ . Determineu si pot existir una funció  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que  $f(1) = 2$ ,  $f(f(n)) = f(n) + n$  per a tot  $n$  en  $\mathbb{N}$  i  $f(n) < f(n+1)$ , per tot  $n$  en  $\mathbb{N}$ .

**EF20.** (IMO 94). Sigui  $S$  el conjunt de nombres reals estrictament més grans que  $-1$ . Trobeu totes les funcions  $f : S \rightarrow S$  satisfent les dues condicions:

(a)  $f(x + f(y) + xf(y)) = y + f(x) + yf(x)$ , per a tot  $x, y$  en  $S$ ;

(b)  $f(x)/x$  és estrictament creixent en cada un dels intervals  $-1 < x < 0$  i  $0 < x$ .

Indicacions per a llegir... si cal.

**EF1.** Fixeu l'atenció en el període  $b = 2a$ . Considereu l'exemple  $(1 + |\sin \frac{\pi}{2}x|)/2$ .

**EF2.** Supposeu que existís un punt  $y_0$  on fos  $|g(y_0)| > 1$  i per ser  $|f(x)|$  fitada considereu  $M$  la menor fita superior. Emprant l'equació obtindreu una contradicció.

**EF3.** Fent les substitucions  $b = 1 - a$ ,  $c = 0$  i  $c = 1 - a - b$  podreu verificar que  $f(x) = P(x, 1 - x) + 2$  satisfà l'equació bàsica de Cauchy. D'ací i usant (i) arribareu a  $P(x, y) = (x + y)^{n-1}(x - 2y)$ .

**EF4.** Raoneu perquè  $1 \leq f(1) < f(2) < f(3) < \dots$  i que passaria si existís un enter positiu  $k$  tal que  $f(k) > k$ .

**EF5.** Com sigui que  $g(1) = f(f(1)) + 1 > 1$ ,  $f(1) = 1$  i  $g(1) = 2$ . Demostreu aleshores que si  $f(n) = k$  necessàriament és  $f(k) = k + n - 1$ ,  $g(n) = k + n$  i  $f(k+1) = k + n + 1$ . Emprant aquestes relacions provareu que  $f(240) = 388$ .

**EF6.** A partir de les equacions determineu que  $f(1, y) = y + 2$ ,  $f(2, y) = 2y + 3$ ,  $f(3, y) = 2^{y+3} - 3$  i finalment  $f(4, y) = 2^{2^{y+3}} - 3$  (on hi han  $y + 3$  dosos en el primer terme).

- EF7. Demostrareu que  $f(n \cdot 3) \geq n$  i  $f(3 \cdot n) = n$  si  $n \leq 3333$ . Usant  $f(m+n) \geq f(m) + f(n)$  establireu que  $1982 \geq 3f(1982)$  i  $f(1982) \geq 660$  o sigui  $f(1982) = 660$ .
- EF8. Estudieu els possibles punts fixos de  $f$ . Provareu que  $f(x) = 1/x$ .
- EF9. Demostreu que  $f(-x) = f(x)$ ,  $f(x) > 0$  i per inducció  $f(n, x) = [f(x)]^{n^2}$ . D'aquí provareu que  $f\left(\frac{m}{n}\right) = (f(1))^{m^2/n^2}$  i per continuïtat  $f(x) = f(1)^{x^2}$ .
- EF10. Observeu que  $f(x) = 0$  si  $x \geq 2$  i  $f(y) = 2/(2-y)$  si  $0 \leq y < 2$ .
- EF11. Si existís una funció  $f$  satisfent la condició donada seria  $f(n+1987) = f(n)+1987$ ;  $g(n) = f(n) - 1987$  seria inversa de  $f$  i  $\{n \mid 0 \leq n \leq 1986, f(n) < 1987\}$  conjuntament amb  $\{n \mid 0 \leq n \leq 1986, f(n) \geq 1987\}$  serien conjunts d'igual cardinal formant partició de  $\{0, 1, \dots, 1986\}$ .
- EF12. Feu inducció per a verificar que  $f(m, n) < n + 1$  per tot  $n \leq m$ .
- EF13. Cal verificar per inducció que  $f(n)$  es el nombre obtingut capgirant el desenvolupament binari de  $n$ . Resulta que el nombre buscat és 92.
- EF14. Proveu que necessàriament  $f(0) = 1$ ,  $f(-1) = 0$ ,  $f(-2) = -1$  i que  $f(x) = x + 1$ , per tot  $x$  racional.
- EF15. Observeu que  $4n + 9 = 2(2n + 3) + 3$  i  $1789 = 2 \times 893 + 3 \dots$  fins a veure que  $f(1789) = 3581$ .
- EF16. Demostreu que l'equació és equivalent a l'equació multiplicativa de Cauchy  $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$ , la qual en  $\mathbb{Q}^+$  té infinites solucions (arbitraris en els primers).
- EF17. Podeu veure que  $f(x) = 0$  per tot  $x$ , tot establint primer que  $f$  és parella, o sigui  $f(-z) = f(z)$ .
- EF18. Proveu que  $f(0) = 0$  i  $f(f(x)) = x$ , deduint d'aquest fet que necessàriament  $f(x) = x$ , per tot  $x$ , la qual cosa podeu provar mirant que passaria si  $f(x) > x$  o  $f(x) < x$ .
- EF19. Un exemple curiós és  $f(n) = [n(1 + \sqrt{5})/2 + 1/2]$ , on  $[z]$  denota la part entera de  $z$ .
- EF20. Proveu que  $f(x) \neq x$  si  $-1 < x < 0$  o  $0 < x$ . Deduiu d'aquí que  $x + f(x) + xf(x) \equiv 0$  o sigui  $f(x) = -x/(1+x)$ .

## Referències

Si voleu saber moltes coses d'equacions funcionals podeu consultar algun dels set llibres següents però s'us recomana molt especialment el primer per ser el llibre més important del tema.

- [1] ACZÉL, J., *Lectures on Functional Equations and Their Applications*. Academic Press, New York-London, 1966.
- [2] ACZÉL, J., *A Short Course on Functional Equations*. Reidel, Dordrecht, 1987.
- [3] ACZÉL, J. i DHOMBRES, J., *Functional Equations in Several Variables*. Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- [4] KUCZMA, M., *Functional Equations in a Single Variable*. Polish Scientific Publishers, Warszawa, 1968.
- [5] KUCZMA, M., *An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities. Cauchy's Equation and Jensen's Inequality*. P.W.N. Univ. Slaski, Warszawa-Krakow-Katowice, 1985.
- [6] KUCZMA, M., CHOCZEWSKI, B i GER, R., *Iterative Functional Equations*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications. Cambridge University Press. Cambridge, 1988.
- [7] SMITAL, J., *On Functions and Functional Equations*, Adam Hilger, Bristol, 1988.

## JOCS I INVARIANTS

*Sergi Elizalde i Torrent*

En aquest capítol veurem algunes idees per resoldre problemes on es demana si és possible guanyar un cert joc seguint una estratègia apropiada, o bé si és possible, partint d'una certa situació inicial i seguint unes regles fixades, arribar a alguna altra situació determinada. Per cap d'aquests problemes sol ser necessari tenir gaires coneixements teòrics de matemàtiques, però alguns requereixen bastant enginy.

### Jocs de tauler

Vegem un exemple senzill del primer tipus de problema.

**Problema 1.** Dos jugadors juguen en una taula rectangular. Per torn, col·loquen sobre la taula monedes de 100 pessetes de manera que no es superposin. Perd el jugador que no pot trobar lloc per la seva moneda a la taula. És possible que el jugador que fa el primer moviment guanyi el joc independentment de la mida de la taula (sempre i quan hi càpiga almenys la primera moneda)?

La resposta és que sí és possible. Una manera de provar que alguna cosa és possible és donar un algorisme general per fer-ho, que és el que farem.

El primer moviment del primer jugador consistirà en posar una moneda en el centre de la taula. Naturalment, els moviments del segon jugador són arbitraris, però hem de donar una estratègia pel primer jugador de manera que guanyi independentment del que faci el segon. Suposem que cada jugador ha fet  $k$  moviments. Llavors, el moviment  $k+1$ -èsim del primer jugador serà posar la seva moneda en el lloc simètric respecte el centre del lloc on ha posat el segon jugador la seva  $k$ -èsima moneda. La raó per la que aquest moviment sempre és possible és perquè en tot moment, després de moure el primer jugador, la configuració de monedes és simètrica. Si el segon jugador pot col·locar la seva moneda,

el lloc simètric també estarà buit, i per tant el primer jugador també pot moure sempre. En algun moment, per tant, serà el segon jugador el que es quedi sense lloc, així que el primer guanya.

## Invariants

En molts d'aquests problemes pot ser molt útil trobar el que s'anomena un *invariant*, que és un valor que es manté constant al llarg del joc. Vegem-ne un exemple.

**Problema 2.** Sobre la taula hi ha dues caixes de galetes, una amb 17 galetes i una altra amb 16. Dos jugadors fan els seus moviments per torn. Cada jugador, en un moviment, pot optar per fer una de les següents coses:

1. Menjar-se dues galetes d'una qualsevol de les caixes (les dues de la mateixa), o bé
2. Passar una galeta de la segona caixa a la primera.

Perd el jugador que no pot fer el seu moviment. Quin jugador guanya?

Si intentes aquest joc amb un amic diverses vegades, apart de quedar-te ben tip de galetes, observaràs que sempre guanya el segon jugador. Quina és la raó? Si et fixes bé en com funciona el joc, notaràs que, en cada moviment, la diferència entre el nombre de galetes de la primera i la segona caixa augmenta o disminueix en 2. Anomenem  $d$  a aquest valor. Augmenta en 2 si mengem 2 galetes de la segona caixa o si en passem una de la segona a la primera; disminueix en 2 si mengem 2 galetes de la primera caixa. Per tant, en cada ronda de moviments (un de cada jugador)  $d$  varia en 4, 0 o -4. Com que al principi  $d = 1$ , això implica que sempre serà  $d \equiv 1 \pmod{4}$  (recorda que això vol dir que  $d - 1$  és múltiple de 4) quan li toqui moure al primer jugador, i sempre  $d \equiv 3 \pmod{4}$  quan hagi de moure el segon.

Però ens quins casos  $d \equiv 3 \pmod{4}$ ? Pot ser que hi hagi més galetes a la segona caixa que a la primera ( $d < 0$ ), i en aquest cas el segon jugador segur que pot moure, perquè pot passar una galeta de la segona a la primera caixa. Si, en canvi, hi ha més galetes a la primera caixa que a la segona ( $d > 0$ ), llavors el fet que  $d \equiv 3 \pmod{4}$  assegura que com a mínim hi ha 3 galetes a la primera caixa, i per tant el segon jugador també pot fer el seu moviment, menjant-se'n dos. Així veiem que el segon jugador sempre pot moure, i per tant és el primer el que perd.



Alguns problemes pregunten si és possible passar d'una situació inicial a una altra fent unes determinades transformacions. Per demostrar que sí és possible, hauríem de donar els passos que hem de seguir per passar de la situació inicial a la final. En canvi, per demostrar que no és possible (que és el que s'ha de fer en gran part dels problemes), els invariants són l'eina més poderosa. La tècnica consisteix en trobar una funció (l'invariant) que compleixi les dues propietats següents:

1. En fer cada una de les transformacions permeses, el valor de la funció no varia.
2. El seu valor a la situació inicial és diferent del valor que pren a la situació a la que es pretén arribar.

Si aconseguim trobar-la, llavors hauréu demostrat que és impossible arribar a la situació que es demana. Vegem-ne uns quants exemples.

**Problema 3.** Tres granotes estan jugant a saltar unes per damunt de les altres. Cada granota pot saltar per sobre de qualsevol altra, sempre anant a parar a l'altre costat a la mateixa distància d'ella que abans (és a dir, al punt simètric al de partida respecte a la granota que s'ha saltat). Inicialment, les granotes ocupen posicions en tres vèrtexs d'un quadrat. És possible que, durant el joc, una d'elles aparegui al quart vèrtex del quadrat?

Podríem provar de donar una successió de moviments fins situar una granota al quart vèrtex. Veient que no ens en sortim, pensem que la resposta deu ser negativa, i per demostrar-ho hem de recórrer a un invariant.

Escollim coordenades al pla de manera que les posicions inicials de les granotes siguin  $A = (0, 1)$ ,  $B = (0, 0)$  i  $C = (1, 0)$ . Hem de decidir si una granota pot o no apareixer en  $D = (1, 1)$ . Primer busquem les coordenades  $(a', b')$  d'una granota després de saltar des del punt  $(a, b)$  per sobre d'una que està en  $(c, d)$ . Com que  $\frac{a+a'}{2} = c$  i  $\frac{b+b'}{2} = d$ , tenim que

$$a' = 2c - a, \quad b' = 2d - b$$

La primera conclusió trivial és que, després de cada salt, les coordenades segueixen sent enteres. La segona, que és el punt clau del raonament, és que les paritats de les dues coordenades d'una granota no canvien quan fa un salt. Així doncs, les granotes que han començat en  $A$  i en  $C$  sempre tindran una coordenada parell i una altra senar, mentre que la que ha començat en  $B$  tindrà les dues parells. En qualsevol cas, cap granota pot apareixer en  $D$ .

Amb això ara potser sabràs resoldre el següent problema, que és molt similar.

**Problema 4.** Quan el capità James Cook va visitar una petita illa prop de Nova Zelanda va observar que només hi vivien camaleons, que podien canviar de color si volien. En total n'hi havia 20 de blaus, 19 de grisos i 18 de violetes. Cook va notar que quan es trobaven dos camaleons de colors diferents, immediatament tots dos canviaven els seus colors al tercer (d'entre els 3 colors possibles), i que no canviaven de color en cap altre cas. És possible que tots els camaleons siguin ara del mateix color?

Aquí, per trobar l'invariant, observem el nombre de camaleons de cada color mòdul 3. Si en algun moment hi ha  $k$  camaleons blaus,  $l$  grisos i  $m$  violetes, i es troben, per exemple, un camaleó blau i un de gris, el nombre de camaleons de cada color passa a ser  $k - 1$ ,  $l - 1$  i  $m + 2$  respectivament. Però  $m + 2 \equiv m - 1 \pmod{3}$ , i així veiem que els tres nombres mòdul 3 canvien de forma concordant (és a dir,  $k - l \pmod{3}$  i  $k - m \pmod{3}$  són invariants). En particular, com que els residus mòdul 3 al principi eren diferents (2, 1 i 0 respectivament), sempre ho seran, i mai podran ser tots els camaleons del mateix color, ja que en aquest cas els tres residus haurien de ser 0.

---

El problema que ve a continuació es pot resoldre molt ràpidament amb un invariant.

**Problema 5.** En els 6 vèrtexs d'un hexàgon regular hi escrivim els nombres 1, 0, 1, 0, 0, 0 (en sentit antihorari, per exemple). Podem augmentar en 1 dos nombres contigus sempre que vulguem. És possible aconseguir que els 6 nombres siguin iguals fent només passos d'aquesta mena?

Suposem que  $a_1, \dots, a_6$  són els nombres que hi ha en els vèrtexs en un moment determinat. Llavors,  $I = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6$  és un invariant, ja que sumant 1 a dos nombres contigus no queda afectat. Com que al principi  $I = 2$ , no podem arribar mai a la situació que ens demanen, amb  $I = 0$ .

---

La dificultat d'aquests problemes és trobar l'invariant adequat. Observa com d'elegant és la solució del següent:

**Problema 6.** Partint de la taula de la figura 1, podem fer les següents transformacions:

1. Canviar els signes d'una fila.
2. Canviar els signes d'una columna.
3. Canviar els signes d'una paralela a una diagonal (en particular, podem canviar el signe de les caselles dels extrems).

Demostreu que sempre quedarà algun  $-1$  a la taula.

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	-1	1	1

"Només" cal observar que el producte dels nombres de les 8 caselles de la vora que no són els 4 extrems sempre és  $-1$ . És invariant per totes les transformacions, ja que cada una d'aquestes, o bé canvia de signe exactament 2 de les 8 caselles, o bé no en canvia cap. Per tant, no posem arribar mai a la situació en què no hi ha cap  $-1$ .

---

Una altra tècnica que moltes vegades s'utilitza combinada amb els invariants és la de començar amb la situació a la que volem arribar i anar tirant enrere. Vegem un exemple bastant senzill on aquesta tècnica és útil.

**Problema 7.** S'escriuen al voltant d'un cercle 5 uns i 4 zeros en qualsevol ordre. A cada pas, entre dues xifres iguals s'hi posa un 0 i entre dues xifres diferents, un 1, i s'esborren els 9 nombres originals. Proveu que repetint aquest procés indefinidament no podem arribar mai a tenir 9 zeros.

Suposem el contrari, és a dir, que sí que podem arribar a tenir 9 zeros. La situació immediatament anterior a la primera vegada que surten els 9 zeros ha de ser la de tenir 9 uns. Llavors l'anterior a aquesta hauria de ser alternant  $1, 0, 1, 0, \dots$ , ja que dues xifres de costat haurien de ser diferents. Però això és impossible, ja que 9 és senar.

## Funcions comptadores

No existeix cap successió infinita d'enters positius estrictament decreixent. Això ho podem usar per provar que un algorisme acaba en un nombre finit de passos. Només cal trobar una funció, que anomenarem *funció comptadora*, que prengui valors naturals i que decreixi estrictament a cada pas de l'algorisme.

**Problema 8.** En una reunió de  $2n$  ambaixadors, cada un té com a molt  $n - 1$  enemics. És possible assegurar els ambaixadors al voltant d'una taula rodona de manera que no quedin dos enemics de costat?

Resoldrem aquest problema usant una funció comptadora. Primer asseiem els  $2n$  ambaixadors de qualsevol manera, i anomenem  $H$  al nombre de parelles d'ambaixadors enemics que han quedat assegudes de costat. Si  $H$  fos 0 ja hauríem acabat. El que farem serà, suposant que  $H > 0$ , canviar alguns ambaixadors de lloc de manera que el nou nombre  $H'$  de parelles d'enemics asseguts de costat disminueixi estrictament, és a dir,  $H' < H$ . Provant que podem fer això haurem resolt el problema, ja que aplicant el procés repetidament un nombre finit de vegades, necessàriament hem d'acabar amb una  $H = 0$ .

El procés per reduir la  $H$  quan és més gran que 0 és com segueix. Suposem que  $n > 1$ , ja que en el cas  $n = 1$  no hi ha enemics i és trivial. Sigui  $A$  i  $B$  dos ambaixadors enemics que han quedat de costat (suposem  $B$  a la dreta de  $A$ ). Si trobem dos altres ambaixadors  $A'$  i  $B'$ , asseguts  $B'$  a la dreta de  $A'$ , i de manera que  $A'$  és amic de  $A$  i  $B'$  és amic de  $B$ , aleshores girant l'arc format pels ambaixadors asseguts entre  $B$  i  $A'$  (ambdós inclosos, és a dir, els ambaixadors que trobem partint de  $B$  cap a la dreta fins que arribem a  $A'$ ), aconseguirem reduir estrictament el nombre de parelles d'enemics assegudes de costat. Efectivament, s'ha destruït la parella d'enemics  $AB$ , i les noves parelles que s'han format són  $AA'$  i  $BB'$ , que són d'amics, o sigui que no ha aparegut cap nova parella d'enemics.

Falta veure que podem trobar  $A'$  i  $B'$ . Com que  $A$  té com a molt  $n - 1$  enemics, i un d'ells és  $B$ , tindrà almenys  $n$  amics entre els  $2n - 2$  ambaixadors restants. Considerem ara els ambaixadors asseguts a la dreta d'aquests amics de  $A$ . Com que són almenys  $n$ , no poden ser tots ells enemics de  $B$ , i per tant n'hi haurà algun que serà amic de  $B$ . Prenem com a  $B'$  algun d'ells, és a dir, un amic de  $B$  assegut a la dreta d'un amic de  $A$ , i prenem com a  $A'$  l'amic de  $A$  assegut a l'esquerra de  $B'$ . Això resol el problema.

En el següent problema, que va aparèixer a la IMO de 1986, es dona un algorisme i ens demanen demostrar que acaba en un nombre finit de passos.

**Problema 9.** En els vèrtexs d'un pentàgon s'hi escriuen 5 nombres reals  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ , amb suma positiva  $s = \sum_{i=1}^5 x_i > 0$ . Si hi ha alguna terna  $(x, y, z)$  de nombres corresponents a vèrtexs consecutius tal que  $y < 0$ , llavors es substitueix per  $(x + y, -y, z + y)$ . Aquest procés es repeteix mentre algun dels 5 nombres sigui negatiu. Decideix si l'algorisme sempre acaba.

La resposta és que sí que acaba, és a dir, després d'un nombre finit d'iteracions els 5 nombres són positius. Resoldrem aquest problema donant una funció comptadora que prengui valors enters positius i que decreixi estrictament a cada pas. No és gens fàcil trobar-la. Una possible funció és la següent:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_1 - x_3)^2 + (x_2 - x_4)^2 + (x_3 - x_5)^2 + (x_4 - x_1)^2 + (x_5 - x_2)^2$$

Ara només cal comprovar que compleix el que volíem. D'una banda, el fet que  $f$  sigui suma de quadrats assegura que  $f \geq 0$ , i també és clar que pren valors enters. D'altra banda, suposem ara que algun dels nombres  $x_i$  és negatiu. Per simetria, podem suposar que és  $x_4 < 0$ . En aquest cas, és un simple càlcul comprovar que la variació de la funció comptadora és  $f_{\text{nova}} - f_{\text{vella}} = f(x_1, x_2, x_3 + x_4, -x_4, x_5 + x_4) - f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 2sx_4 < 0$ . Aquest valor és negatiu ja que  $s > 0$  i  $x_4 < 0$ , i així doncs  $f$  decreix estrictament a cada pas. Per tant, en algun moment tots 5 nombres seran positius, perquè de no ser així, els valors de  $f$  donarien una successió infinita estrictament decreixent d'enters positius, que és impossible.

## Acoloriments

Una altra tècnica molt útil per demostrar que una cosa és impossible consisteix en acolorir els elements que estem tractant (equivalentment, en dividir el conjunt en un nombre finit de subconjunts, cada un corresponent a un color). L'exemple següent, molt típic, usa dos colors.

## Jocs i invariants

**Problema 10.** Considerem una quadrícula  $6 \times 6$  d'on traiem els quadradets superior esquerre i inferior dret. És possible cobrir la figura resultant amb *dòmimos* (rectangles  $2 \times 1$ ) sense que es superposin ni surtin fora de la figura?


Si intentes cobrir l'àrea veuràs que no te'n surts, però, com demostrem que és impossible? Aquí la idea és imaginar-se la quadrícula amb els quadradets  $1 \times 1$  pintats de blanc i negre alternativament, com un tauler d'escacs. Una idea aparentment tan simple resulta aquí ser clau. Ara la solució és òbvia si ens adonem que cada peça de dòmino cobreix un quadrat blanc i un de negre, i que per tant qualsevol àrea que es pugui cobrir amb dòminos ha de tenir tants quadrats blancs com negres. En canvi, la nostra figura no és així, ja que a la quadrícula inicial li hem tret dos quadrats del mateix color.

---

No sempre la manera d'acolorir és tan senzilla. En el problema següent no funciona l'acoloriment com un tauler d'escacs.

**Problema 11.** Un terra rectangular és cobert amb rajoles  $2 \times 2$  i  $1 \times 4$ . Quan ja ha estat cobert, una rajola es trenca, i no en queden més del mateix tipus que la trencada, però sí una de l'altra classe. Proveu que no és possible tornar a cobrir el terra recollocant les rajoles.

Tindríem el problema resolt si aconseguíssim acolorir els quadrats del terra (imaginant-lo com una quadrícula de quadrats  $1 \times 1$ ) de manera que els coberts per una rajola de tipus  $2 \times 2$  tinguessin sempre colors diferents dels coberts per una rajola  $4 \times 1$ . Desafortunadament, acolorint com un tauler d'escacs, tant una rajola com l'altra cobreixen 2 quadrats de cada color. La manera d'acolorir aquí és la del dibuix següent:



És a dir, donant dues coordenades a cada quadrat de la manera natural, pintem de negre els quadrats que tenen les dues coordenades parells, i de blanc la resta. Llavors, una rajola  $4 \times 1$  cobreix 0 o 2 quadrats negres, i en canvi una  $2 \times 2$  cobreix sempre exactament 1 quadrat negre. Així doncs, no podem substituir cap rajola per una de l'altre tipus si volem cobrir el mateix terra.

---

De vegades es requereixen més de 2 colors. En alguns problemes no està clar ni tan sols què hem d'acolorir. Vegem ara un problema clàssic, anomenat *Problema de la Galeria d'Art*.

**Problema 12.** Una galeria d'art té la forma d'un polígon de  $n$  costats. Troba el nombre mínim de vigilants necessaris per controlar tota la galeria, qualsevol que sigui la forma del polígon. (Suposem que cada vigilant se situa en un punt i controla el que es pot veure des d'aquell punt en totes les direccions.)


Aquest problema no és trivial. En alguns casos, com per exemple quan el polígon és regular (més en general, quan és estrellat), amb un vigilant n'hi ha prou. Ens demanen, però, un nombre de vigilants que serveixi per qualsevol  $n$ -àgon. Amb  $n$  vigilants, posant-ne un a cada vèrtex, controlem qualsevol galeria, però en realitat mai són necessaris tants. Quin és, doncs, el mínim nombre de vigilants que es necessiten?

Triangulem el polígon usant diagonals que no s'intersequin, de manera que totes les regions del polígon triangulat són triangles. Es pot provar per inducció que sempre existeix una triangulació així, però no ho veurem aquí. Ara, acolorim els vèrtexs usant 3 colors, de manera que cada triangle tingui els 3 vèrtexs de diferent color. Vegem tot seguit que això ho podem fer, per inducció sobre el nombre de vèrtexs. Per 3 vèrtexs és trivial, només cal pintar-ne un de cada color. Per  $n > 3$ , traient un vèrtex que pertanyi només a un triangle, el que queda és una triangulació d'un polígon de  $n - 1$  costats, que per hipòtesi d'inducció podem acolorir. Llavors, només cal pintar el vèrtex que havíem tret del color que no coincideix amb cap dels colors dels seus 2 veïns.

Finalment, escollim el color menys usat, i posem un vigilant en cada un dels vèrtexs pintats d'aquest color. D'aquesta manera, com que cada triangle tindrà un vigilant en exactament un vèrtex, estarà vigilat, i en conseqüència els guàrdies cobriran tot el polígon. El nombre de vigilants que necessitem és doncs com a molt  $\lceil n/3 \rceil$ .

## Jocs i invariants

Amb això hem trobat una fita superior pel nombre mínim de vigilants. Però encara no estem segurs que sigui òptima. Per confirmar-ho, hem de trobar un polígon de  $n$  costats en el que amb menys de  $\lceil n/3 \rceil$  vigilants no n'hi hagi prou. La galeria de la figura demostra que en alguns casos són necessaris  $\lceil n/3 \rceil$  guàrdies, ja que cada punxa l'ha de vigilar un guàrdia diferent.



## Altres jocs i estratègies

A continuació veurem un joc bastant conegut on l'estratègia guanyadora és força més complicada.

**Problema 13.** Es posen pedres distribuïdes en files de la següent manera: 1 a la primera fila, 3 a la segona, 5 a la tercera i 7 a la quarta. Dos jugadors, alternativament, poden a cada tirada agafar les pedres que vulguin d'una mateixa fila (n'han d'agafar almenys una). Guanya el jugador que agafa l'última pedra.

Aquesta distribució inicial de les pedres és només un exemple, el joc es pot fer de moltes maneres. Prefereixes ser el primer jugador o el segon? Per aquesta posició inicial, és el segon jugador qui pot tenir una estratègia guanyadora. Si penses una mica en com ha de ser aquesta estratègia, t'adonaràs que no és tan senzilla com pot semblar en un principi. És interessant observar que si el segon jugador aconsegueix arribar a una configuració on les files es puguin aparellar, cada una amb una altra amb el mateix nombre de pedres (per exemple, si els nombres de pedres a les 4 files fossin 1, 3, 3, 1), llavors està clar que té la partida guanyada. En efecte, a partir d'aquí només cal que imiti els moviments del primer jugador, agafant el mateix nombre de pedres que aquest, però de la fila aparellada. Seguint aquesta estratègia, el segon jugador sempre agafarà l'última pedra.

Desgraciadament, la configuració inicial no es pot aparellar d'aquesta manera. Ara veurem



que no cal exigir-li tant. El truc està en representar el nombre de pedres de cada fila en base 2. En el nostre cas (1, 3, 5, 7), tenim, respectivament, 1, 11, 101 i 111. Si ara sumem les xifres de les unitats d'aquests 4 nombres, dóna  $1 + 1 + 1 + 1 = 4$ ; sumant les xifres de les "desenes", obtenim  $1 + 0 + 1 = 2$ ; i sumant les de les "centenes",  $1 + 1 = 2$ . Els tres resultats són parells, i això serà precisament el que el segon jugador haurà de mantenir després de cada tirada seva per guanyar la partida.

Vegem primer que si ho aconsegueix mantenir, guanya. En efecte, excepte en el cas que les tres sumes són 0, que vol dir que ell (el segon jugador) acaba d'agafar l'última pedra i per tant ha guanyat, quan alguna de les tres sumes no és 0, el fet que sigui parell implica que hi ha d'haver en aquella posició almenys dos 1's (no n'hi pot haver un sol), i això es tradueix en que almenys 2 files són no buides. Així doncs, quan mogui el primer jugador, mai podrà guanyar en aquella tirada perquè només pot agafar pedres d'una fila. El primer jugador no agafa mai l'última pedra, i per tant, seguint així, serà el segon qui l'agafarà.

Falta veure encara que el segon jugador pot restablir en cada tirada seva el fet que les tres sumes de xifres de les expressions en base 2 siguin parells. Notem primer que quan, sent aquestes sumes parells, mou el primer jugador, necessàriament ho torna a "espatllar", ja que de la fila on agafa les pedres segur que en canvia alguna xifra, i llavors la suma corresponent passa a ser senar. Imaginem que ara ha de moure el segon jugador. Com que alguna suma és senar, considerem, d'entre les sumes senars, la de xifres de més a l'esquerra. Sigui  $f$  una fila que tingui un 1 en aquesta posició, que anomenarem  $p$ . Es tracta de canviar el nombre de pedres en  $f$  de manera que la seva expressió en base 2 tingui un 0 en la posició  $p$  i a més es canviïn exactament les xifres a la dreta de  $p$  per les quals la suma era senar. Així aconseguim que totes les sumes siguin parells. Això ho podem fer agafant pedres, gràcies a que el nou nombre que volem posar a  $f$  és més petit que el que hi havia, ja que la xifra de més a l'esquerra de les que canviem és la de  $p$ , que passa de 1 a 0.

Hem demostrat doncs que el segon jugador té una estratègia guanyadora. Si hi jugues amb els teus amics, observa que si fas de primer jugador però el segon no juga segons l'estratègia descrita, llavors podràs fer tu una tirada que deixi les tres sumes parells, i a partir d'aquí aplicar l'estratègia per guanyar tu el joc.

Si la configuració inicial no satisfà la condició de tenir totes les sumes parells, llavors és el primer jugador qui té l'estratègia guanyadora. Simplement, en la primera tirada, ha de fer que es passi a complir la condició.

Per acabar, el següent problema sembla més aviat un passatemps, però fa pensar una estona i pot donar idees interessants.

**Problema 14.** Hi ha 30 presoners en fila índia (els suposem ordenats de l'1 al 30). A cada un li posen un barret, de color blanc o negre, però de manera que cada un només veu els barrets dels presoners que estan davant seu, no el seu ni els de darrera. De darrera cap endavant, començant pel presoner 30, cada un diu un color, "blanc" o "negre". Si encerta el color del seu barret, es salva; si falla, és executat. El color que diu és l'única informació que un presoner pot donar als altres una vegada porten els barrets posats. Quina estratègia (planificada prèviament) poden seguir els 30 presoners per tal de salvar-se'n el màxim nombre possible? (És a dir, a cada presoner li importa més el nombre total de persones salvades que no pas el fet de salvar-se a sí mateix.)

Hi ha algunes estratègies elementals que permeten salvar almenys la meitat dels presoners. Per exemple, si el primer a parlar diu el color que predomina en els 29 barrets que ell veu, i tots els altres simplement repeteixen aquest color, se salvaran en el pitjor dels casos 15 presoners. També garantim això si el presoner 30 diu el color del barret del presoner 29, i aquest el repeteix, salvant-se doncs; el presoner 28 diu el color del 27, i aquest diu el mateix, salvant-se; i així successivament. D'aquesta manera es salven com a mínim els presoners de les posicions senars. Però hi ha maneres molt millors de fer-ho.

És convenient assignar 0 i 1 als colors (per exemple, "blanc"=0, "negre"=1). Observa que la informació que pot transmetre cada presoner als seu companys de davant és un bit, 0 o 1. Cada presoner té la informació que li han transmès els que han parlat abans que ell, i a més la informació dels colors del barrets que veu. En les estratègies anteriors veiem que aquesta informació no és aprofitada al màxim. En el primer cas, cada presoner usa només la informació que li ha donat el 30, i res més. En el segon cas, el presoner 29 no usa la informació dels barrets que veu, de manera que el presoner 28 no rep cap informació que li serveixi. L'estratègia òptima és la següent.

El primer a parlar (el presoner 30) diu el color corresponent a la suma (a  $\mathbb{Z}_2$ , és a dir, considerant  $1 + 1 = 0$ ) dels colors dels 29 presoners de davant. Ara, el presoner 29 pot sumar els colors dels barrets de davant seu i, restant-ho (que en aquest cas és el mateix que sumar-ho) del que havia dit el presoner 30, pot deduir quin és el seu color, dir-lo i salvar-se. El presoner 28 ha sentit quant sumen els dels 29 primers presoners, i el color del presoner 29, i per tant pot deduir-ne la suma dels 28 primers. A partir d'això, sumant els 27 presoners que veu, pot conèixer quin és el seu color, i salvar-se. Així, successivament, es

salven tots els presoners des del 29 fins l'1. L'únic que ha de fer el presoner  $i$  ( $1 \leq i \leq 29$ ) és restar, del que ha dit el presoner 30 (la suma dels 29 primers), el que ha dit cada un dels altres presoners que ja han parlat (el seu respectiu color), i també la suma del colors dels barrets que ell veu davant seu. El que quedi és el color del seu barret.

Clarament aquesta estratègia és la millor possible, ja que salva almenys 29 dels 30 presoners. Naturalment no hi ha cap tàctica que garanteixi que el presoner 30 es salvarà, ja que no pot deduir cap informació sobre el color del seu barret.

## Problemes

J11. Dos jugadors estan jugant sobre una banda de  $1 \times n$  caselles quadrades. Els moviments són alternatius, i en cada un es pot tatxar o bé una casella qualsevol o bé un parell de caselles contigües. Perd el jugador que no pot fer un moviment. Prefereixes ser el primer o el segon jugador?

J12. Dos jugadors  $A$  i  $B$  juguen al següent joc. Parteixen del polinomi  $x^3 + \square x^2 + \square x + \square$ , on  $\square$  indica que hi falta el coeficient.  $A$  comença posant un enter no nul qualsevol en qualsevol dels llocs buits. A continuació,  $B$  posa un enter arbitrari en un dels dos llocs restants i finalment  $A$  acaba posant un enter qualsevol al forat que queda. Demostreu que  $A$  pot jugar de manera que les 3 arrels del polinomi resultant siguin enteres.

J13. Un llop es troba en el centre d'un camp quadrat, i 4 gossos estan als vèrtexs. El llop es pot moure en qualsevol direcció, mentre que els gossos només es mouen pels costats del quadrat. La velocitat de cada gos és l'5 vegades la del llop. El llop pot matar a cada gos per separat, però quan es troba dos gossos junts, el maten a ell. Demostreu que els gossos sempre poden matar el llop si aquest intenta sortir del quadrat.

J14. S'escullen  $n$  caselles arbitràries d'una quadrícula. Proveu que com a mínim n'hi ha  $\lfloor \frac{n}{4} \rfloor$  que no es toquen (ni per un vèrtex).

J15. Hi ha una fitxa a la casella superior esquerra d'una quadrícula  $n \times n$ . Dos jugadors mouen alternativament la fitxa cap a una de les caselles que tenen una aresta comú amb

### Jocs i invariants

la que ocupa la fitxa. No es permet moure la fitxa a una casella on ja hi hagi estat anteriorment. Perd el jugador que no pot fer el seu següent moviment. Proveu que, si  $n$  és parell, el primer jugador té estratègia guanyadora, i si  $n$  és senar, és el segon qui la té.

**J16.** Tenim escrit  $x^{10} + \square x^9 + \square x^8 + \dots + \square x^2 + \square x + 1$ , on  $\square$  indica que hi falta el coeficient. Dos jugadors, alternativament, escullen un nombre real arbitrari i l'escriuen en qualsevol dels llocs que queden buits en aquell moment. Si el polinomi resultant no té arrels reals, guanya el primer jugador; si com a mínim té una arrel real, guanya el segon. Té alguna manera el segon jugador de guanyar sempre?

**J17.** En el vèrtex  $A_1$  del dodecàgon regular  $A_1 A_2 \dots A_{12}$  s'hi escriu un  $-1$ , i en cada un dels altres vèrtexs s'hi escriu un  $1$ . Es permet canviar els signes de qualsevol grup de 6 vèrtexs consecutius. Demostreu que és impossible obtenir un  $-1$  en  $A_2$  i un  $1$  en tots els altres vèrtexs. Considereu el mateix problema pels casos de 4 i 3 vèrtexs consecutius.

**J18.** Tres màquines poden llegir i imprimir targes amb un parell d'enters positius. La primera, quan llegeix la tarja  $(a, b)$ , imprimeix una nova tarja  $(a+1, b+1)$ . La segona, si llegeix  $(a, b)$  i tots dos són parells, imprimeix  $(\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$ . La tercera llegeix dues targes  $(a, b)$  i  $(c, d)$  i, si  $b = c$ , imprimeix una tarja  $(a, d)$ . Les targes llegides poden ser reutilitzades tantes vegades com calgui. Inicialment només tenim la tarja  $(5, 19)$ . És possible arribar a imprimir les targes  $(1, 50)$  o  $(1, 100)$ ?

**J19.** Els *tetròminos* són les cinc peces del joc del *Tetris*, és a dir, totes les figures que es poden formar amb 4 quadrats iguals ajuntant-los entre ells per un costat comú. És possible formar un rectangle amb els cinc tetròminos?

**J110.** Una quadrícula  $6 \times 6$  es cobreix amb dòminos  $2 \times 1$ . Proveu que sempre hi ha almenys una recta que travessa el rectangle sense tallar cap dòmino.

## Algunes idees per a les solucions

**Solució del problema JI1**

Pensa en una estratègia semblant a la del problema de posar monedes en un tauler. Com ho pot fer el primer jugador per a que, després de tirar ell, la configuració de caselles marcades sigui sempre simètrica?

**Solució del problema JI2**

A pot començar posant un  $-1$  al terme de la  $x$ .

Faci el que faci ara  $B$ , en l'últim moviment  $A$  en té prou posant al lloc buit l'enter oposat al que  $B$  havia escrit. Això és degut a que el polinomi obtingut té la forma  $x^3 - ax^2 - x + a$ , amb  $a$  enter, i per tant les seves arrels són  $-1, 1, a$ .

**Solució del problema JI3**

Al principi, les dues diagonals del quadrat es tallen al centre, on es troba el llop. Quan el llop es mou, considera les dues rectes que passen per la seva posició i que són paral·leles a les diagonals. En general, les interseccions d'aquestes rectes amb el quadrat són quatre punts.

La situació inicial és que els gossos es troben en aquests quatre punts, que coincideixen amb els vèrtexs. Ara, per qualsevol moviment que faci el llop, aquests quatre punts es mouen sempre a una velocitat inferior a 1.5 vegades la del llop, així que els gossos es poden desplaçar situant-se sempre sobre aquests punts. Si ho fan així, quan el llop arribi a la frontera del quadrat, sempre es trobarà amb dos gossos alhora, i el mataran.

**Solució del problema JI5**

Si  $n$  és parell, es pot cobrir fàcilment la quadrícula  $n \times n$  amb dòminos (per exemple, posant  $\frac{n}{2}$  dòminos verticals a cada columna).

Al principi de la partida, la fitxa ocupa un dels 2 quadrats d'un cert dòmino. El primer jugador la pot moure a l'altre quadrat del dòmino. D'aquesta manera, quan mogui el segon jugador posarà la fitxa en un dòmino per on la fitxa no ha passat, i el primer jugador sempre podrà moure-la a l'altre quadrat del mateix dòmino. Quan hagi passat per tots els dòminos, el segon jugador no podrà moure.

Si  $n$  és senar, la quadrícula  $n \times n$  no es pot cobrir amb dòminos, perquè té un nombre senar de quadradets. El que sí es pot cobrir és la figura que resulta de suprimir-ne el quadratet superior esquerre on es troba la fitxa inicialment (per exemple, omplint la fila

## Jocs i invariants

superior amb  $\frac{n-1}{2}$  dòminos horitzontals, i la quadrícula  $(n-1) \times n$  restant amb  $\frac{n-1}{2}$  dòminos verticals a cada columna). Ara és el primer jugador el que enceta un nou dòmino en cada moviment, i el segon sempre pot moure la fitxa completant el dòmino, així que en aquest cas serà el primer el que es quedarà sense poder moure.

### Solució del problema JI7

Identificant cada  $A_i$  amb el nombre que hi ha escrit, el producte  $A_2 \cdot A_3 \cdot A_8 \cdot A_9$  és invariant. Com que al principi val 1, mai podrà donar  $-1$ .

En el cas en què es pot canviar el signe de 4 vèrtexs consecutius,  $A_2 \cdot A_3 \cdot A_6 \cdot A_7 \cdot A_{10} \cdot A_{11}$  és invariant.

En el cas de 3 vèrtexs, el producte  $A_2 \cdot A_3 \cdot A_5 \cdot A_6 \cdot A_8 \cdot A_9 \cdot A_{11} \cdot A_{12}$  no varia.

### Solució del problema JI8

Observa que si existeix un cert natural senar  $m$  tal que totes les targes que tens són de la forma  $(a, b)$  amb  $a \equiv b \pmod{m}$ , llavors totes les targes que en puguis obtenir seran d'aquesta forma. La condició de  $m$  senar és necessària per assegurar que si  $a$  i  $b$  són parells i  $a \equiv b \pmod{m}$ , llavors  $\frac{a}{2} \equiv \frac{b}{2} \pmod{m}$ .

Amb la observació anterior, prenent  $m = 7$  veiem que no es pot arribar a imprimir  $(1, 100)$ , ja que  $5 \equiv 19 \pmod{7}$  i en canvi  $1 \not\equiv 100 \equiv 2 \pmod{7}$ .

Pensa com construir targes de la forma  $(5, 5 + 14k)$ , amb  $k \geq 1$ , usant la primera i la tercera màquina diverses vegades. Amb això pots arribar a  $(8, 8 + 14 \cdot 28)$ , i per tant, amb la segona màquina tres vegades, a  $(1, 50)$ .

### Solució del problema JI9

En cas que es pogués formar un rectangle, seria de 20 quadrats, i el podríem acolorir com un tauler d'escacs amb 10 quadrats blancs i 10 de negres.

El tetròmino amb forma de T cobriria 3 quadrats d'un color i un de l'altre, mentre que tots els altres cobririen 2 quadrats de cada color. Per tant, no és possible.

### Solució del problema JI10

Per simplificar, anomenarem *línia neta* a qualsevol recta que travessi el rectangle sense tallar cap dòmino.

Fes la demostració per reducció a l'absurd. Suposa que tinguéssim la quadrícula coberta sense que existissin línies netes. Intenta arribar a contradicció comptant quantes línies netes poden tallar un dòmino i, recíprocament, quin és el nombre mínim de dòminos que pot tallar una línia no neta.

Cada dòmino impedeix la possible existència d'exactament una línia neta. D'altra banda, és impossible que una línia no neta talli només un dòmino, perquè llavors el que queda a cada costat de la línia són rectangles  $6 \times t$  i  $6 \times (6 - t)$  (per certa  $t$ ), on un quadrat correspon al dòmino tallat, i per tant la resta de cada un dels rectangles té àrea senar, així que no pot ser cobert per dòminos.

Com que cada línia no neta ha de tallar almenys 2 dòminos, i cada dòmino només pot ser tallat per una línia, almenys hauríem de tenir 20 dòminos. Però l'àrea de la quadrícula  $6 \times 6$  és 36, així que només hi ha 18 dòminos. Hem arribat a contradicció.

## Referències

BELLOT, F. *Apunts sobre una lliçó d'Arkadii Sliinko*, Universitat d'Auckland.

ENGEL, A., *Problem Solving Strategies*. Springer.





## EL PODER DE LA GEOMETRIA ANALÍTICA

Francisco Bellot Rosado

### 1. Introducció


En general, a l'Olimpíada Internacional no se solen proposar problemes de Geometria Analítica en el sentit més estricte; fins i tot es procura que els que proposen de Geometria no tinguin una solució analítica fàcilment visible. De fet, des de 1959 fins 1987, només quatre problemes (que s'inclouen al final sense solució) eren susceptibles d'aquest tractament. Però, malgrat tot, i des de 1988, tal com veurem als exemples següents, força vegades l'elecció adequada d'un sistema de referència permet resoldre, amb un bagatge teòric mínim, problemes que resolts sintèticament exigeixen un gran nombre de resultats clàssics, absolutament desconeguts per bona part dels nostres estudiants (i tal vegada, també, de bastants professors).

**Problema 1.** (núm. 5, IMO 1988, proposat per Grècia.)  $ABC$  és un triangle rectangle en  $A$ , i  $D$  és el peu de l'altura des de  $A$ . La recta que uneix els incentres dels triangles  $ABD$  i  $ACD$  talla  $AB$  en  $K$  i  $AC$  en  $L$ . Si  $S$  és l'àrea de  $ABC$ , i  $T$  la de  $AKL$ , demostreu que  $S \geq 2T$ .

**Solució 1.** Posem l'origen de coordenades en  $A$ , i suposem que  $B(c, 0)$ ,  $C(0, b)$ . L'equació de  $BC$  és  $bx + cy = bc$ , i la de  $AD$  és  $by = cx$ . Tenim en compte que  $a^2 = b^2 + c^2$ , es calculen sense dificultat les coordenades dels incentres de  $ABD$  i  $ACD$

$$\text{Incentre de } ABD : O_1 \left( \frac{cb(a+b)}{a(a+b+c)}, \frac{c^2b}{a(a+b+c)} \right)$$

$$\text{Incentre de } ACD : O_2 \left( \frac{b^2c}{a(a+b+c)}, \frac{bc(a+c)}{a(a+b+c)} \right)$$



que podem escriure-les més reduïdes utilitzant  $2p = a + b + c$ ,

$$O_1 \left( \frac{cb(a+b)}{2ap}, \frac{c^2b}{2ap} \right),$$

$$O_2 \left( \frac{b^2c}{2ap}, \frac{bc(a+c)}{2ap} \right).$$

L'equació de la recta que passa per  $O_1O_2$  és  $2apy - c^2b = cb(a+b) - 2apx$  i calculant-ne les interseccions amb els eixos de coordenades, s'obté

$$K \left( \frac{cb}{a}, 0 \right) \quad L \left( 0, \frac{cb}{a} \right).$$

Per tant, el triangle  $AKL$  és isòsceles (aquest és un resultat que va donar molts maldecaps a més d'un concursant que en va voler donar una justificació per la via de la geometria sintètica).

Llavors, les àrees de  $AKL$  i de  $ABC$  són, respectivament,

$$T = \frac{1}{2} \frac{b^2c^2}{a^2} \quad S = \frac{1}{2}bc.$$

Hem de demostrar que

$$\frac{1}{2}bc \geq \frac{b^2c^2}{a^2} \iff a^2 \geq 2bc \iff b^2 + c^2 \geq 2bc$$

i, aquesta darrera desigualtat evidentment és certa.

*Solució 2.* Anomenem  $r_1$  i  $r_2$  els radis de les dues circumferències del problema, de centres respectius  $O_1$  i  $O_2$ . Com que es pretén comparar les àrees de  $AKL$  i  $ABC$ , fóra convenient

expressar les longituds de  $AK$  i  $AL$  en funció de certs elements del triangle  $ABC$ . Amb el mateix sistema de referència de la solució anterior, anomenem  $h = AD$ .

La primera coordenada de  $O_1$  és, evidentment,  $r_1$  i la segona de  $O_2$  és  $r_2$ . D'acord amb les notacions de la figura 1, es veu immediatament que la segona coordenada de  $O_1$  és  $AE = AF = h - r_1$  i que la primera de  $O_2$  és, per la mateixa raó,  $h - r_2$ . Així doncs,

$$O_1(r_1, h - r_1), \quad O_2(h - r_2, r_2).$$

Aleshores el pendent de la recta  $O_1O_2$  és

$$m = \frac{r_2 - (h - r_1)}{h - r_2 - r_1} = -1,$$

per tant els triangles  $O_2NK$  i  $O_1EL$  són isòsceles i

$$AK = h - r_2 + r_2 = h$$

$$AL = h - r_1 + r_1 = h$$

i  $AKL$  és isòsceles,  $K(h, 0)$  i  $L(0, h)$ .

Però de la semblança entre els triangles  $ACD$  i  $ABC$  deduïm que

$$\frac{b}{a} = \frac{h}{c} = \frac{CD}{b} \implies h = \frac{cb}{a},$$

I a partir d'aquí es continua com a la solució 1.


**Problema 2.** (núm. 1, IMO 1988, proposat per Luxemburg.) Es consideren dues circumferències coplanàries i concèntriques, de radis  $R$  i  $r$  ( $R > r$ ). Sigui  $P$  un punt fix de la circumferència petita i  $B$  un punt variable de la gran. La recta  $BP$  talla un altre cop la circumferència gran en  $C$ . La perpendicular  $l$  a  $BP$  per  $P$  torna a tallar la circumferència petita en  $A$  (si és tangent a la circumferència en  $P$ , llavors  $A = P$ ).

a) Calculeu el conjunt de valors de  $BC^2 + CA^2 + AB^2$ .

b) Calculeu el lloc geomètric del punt mitjà de  $AB$ .

**Solució.** Escollim un sistema de referència amb origen en el centre de les dues circumferències, de manera que

$$B(x_2, y), P(x_1, y), C(-x_2, y), A(x_1, -y).$$



Llavors tenim

$$x_1^2 + y^2 = r^2, \quad x_2^2 + y^2 = R^2,$$

i la suma buscada val

$$\begin{aligned} BC^2 + CA^2 + AB^2 &= 4x_2^2 + [(x_1 - x_2)^2 + 4y^2] + [(x_1 + x_2)^2 + 4y^2] = \\ &= 2x_1^2 + 6x_2^2 + 2y^2 + 6y^2 = 2r^2 + 6R^2, \end{aligned}$$

que és independent de la posició de  $B$ ; per tant, l'únic valor que pren la suma en qüestió és  $2r^2 + 6R^2$ .

Sigui  $M$  l'origen i  $F$  el punt mitjà de  $PM$ . Llavors,  $F\left(\frac{x_1}{2}, \frac{y}{2}\right)$  i el punt mitjà  $Q$  de  $AB$  té coordenades  $Q\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, 0\right)$ .

Aleshores es té que

$$QF^2 = \frac{x_2^2}{4} + \frac{y^2}{4} = \left(\frac{R}{2}\right)^2,$$

la qual cosa ens diu que el punt mitjà de  $AB$  pertany a la circumferència de radi  $R/2$ , amb centre en el punt mitjà de  $PM$ .

Considerant els casos en que  $M$ ,  $A$  i  $B$  estan alineats es veu que els punts diametralment oposats d'aquesta circumferència formen part del conjunt de solucions. Per continuïtat s'obté el semicercle complet, i per simetria, el cercle complet.

**Problema 3.** (núm. 2, IMO 1994, proposat per Austràlia i Armènia.)  $ABC$  és un triangle isòsceles, amb  $AB = AC$ , que compleix:


a)  $M$  és el punt mitjà de  $BC$ , i  $O$  és el punt de la recta  $AM$  tal que  $OB$  és perpendicular al segment  $AB$ .

- b)  $Q$  és un punt qualsevol del segment  $BC$ , diferent de  $B$  i de  $C$ .  
 c)  $E$  és a la recta  $AB$  i  $F$  a  $AC$ , de tal manera que  $E$ ,  $Q$  i  $F$  són diferents i estan alineats.

Demostreu que  $OQ$  és perpendicular a  $EF$  si i només si  $QE = QF$ .

Solució. Prenem  $BC$  com a eix de les  $x$ , amb origen  $M$ ; i suposem que

$$B(-1, 0), C(1, 0), A(0, a), Q(t, 0) \text{ amb } -1 < t < 1.$$



En aquesta referència el punt  $O$  té coordenades  $(0, -\frac{1}{a})$ .

L'equació de  $EF$  és  $y = m(x - t)$ , i les coordenades de  $E$  i  $F$  són

$$E\left(\frac{a + mt}{m - a}, \frac{am(1 + t)}{m - a}\right), \quad F\left(\frac{a + mt}{a + m}, \frac{am(1 - t)}{a + m}\right).$$

L'equació de  $OQ$  és

$$\frac{x}{t} - ay = 1,$$

així que la condició de perpendicularitat amb  $EF$  serà l'anul·lació del producte escalar dels seus respectius vectors normals  $(1, -at)$  i  $(m, -1)$ . És a dir,  $m + at = 0$ .

Per altra banda,  $QE = QF$  significa que  $Q$  és el punt mitjà de  $EF$ , que es tradueix en les següents igualtats en coordenades

$$a(m + at) = 0, \quad 2m + 2at = 0,$$


i per ser  $a \neq 0$ , ambdues equivalen a  $m + at = 0$ .

## Geometria Analítica

L'equivalència de les dues proposicions és evident.

**Problema 4.** (núm. 4, IMO 1992, proposat per França.) En el pla es consideren, una circumferència  $\gamma$ , una recta  $s$  tangent a  $\gamma$ , i un punt  $M$  de  $s$ . Determineu el conjunt dels punts  $P$  del pla que tenen la propietat següent: Existeixen dos punts  $Q$  i  $R$  en  $s$ , tals que  $M$  és el punt mitjà del segment  $QR$  i  $\gamma$  és el cercle inscrit en el triangle  $PQR$ .

*Solució.* Sigui  $I$  el centre de la circumferència; escollim el sistema de referència: la recta  $s$  com a eix d'abscisses, el punt de tangència  $T$  de  $s$  i  $\gamma$  com a origen i la recta  $IT$  com a eix d'ordenades.



En aquest sistema,  $I(0, r)$  és fix;  $M(m, 0)$  i  $F(0, 2r)$  també ho són. Per tant, la recta  $IM$ , que té pendent  $-r/m$ , és igualment fixa. L'equació de  $\gamma$  és

$$x^2 + y^2 - 2ry = 0.$$

Sigui  $P(u, v)$  el punt del qual es busca el lloc geomètric; si imposem les condicions del problema i si  $Q(q, 0)$  i  $R(p, 0)$ , el fet que  $M$  hagi de ser el punt mitjà de  $QR$  es tradueix en

$$(1) \quad 2m = p + q.$$

L'equació de  $PQ$  és  $vx + (q - u)y = qv$ ; i la condició de tangència amb  $\gamma$  s'escriu

$$(2) \quad 2rq(q - u) = (q + r)(q - r)v;$$

anàlogament, la condició de tangència de  $PR$  amb  $\gamma$  és

$$(3) \quad 2rp(p - u) = (p + r)(p - r)v.$$

Per tant, el problema rau a eliminar entre (1), (2) i (3) els paràmetres variables  $p$  i  $q$ . Les igualtats (2) i (3) es poden escriure com

$$(2') \quad r^2v = q^2(v - 2r) + 2rqu$$

$$(3') \quad r^2v = p^2(v - 2r) + 2rpu$$

i igualant i simplificant resulta

$$(q + p)(q - p)(v - 2r) = 2ru(p - q),$$

que tenint present (1) es converteix en

$$2m(q - p)(v - 2r) = 2ru(p - q);$$

com que  $P$  i  $Q$  són clarament diferents,  $p \neq q$ , i la igualtat anterior és equivalent a

$$m(v - 2r) = -ru,$$

que és l'equació d'una recta que passa pel punt  $(0, 2r)$  i té pendent  $-r/m$ . Les coordenades d'un punt variable sobre la recta són  $u, v$ , és a dir, les coordenades de  $P$ . En conclusió,  $P$  ha d'estar situat en el semiplà determinat per la recta  $s'$ , paral·lela a  $s$  que passa per  $F$  i que no conté  $T$ ; així el lloc geomètric demanat és la semirecta d'origen  $F$  paral·lela a  $IM$ .

**Problema 5.** (núm.1, IMO 1995, proposar per Bulgària.) Siguin  $A, B, C$  i  $D$  quatre punts diferents sobre una recta, en aquest ordre. Les circumferències de diàmetres  $AC$  i  $BD$  es tallen en els punts  $X$  i  $Y$ . La recta  $XY$  talla  $BC$  en el punt  $Z$ . Sigui  $P$  un punt de la recta  $XY$ , diferent de  $Z$ . La recta  $CP$  talla la circumferència de diàmetre  $AC$  en els punts  $C$  i  $M$ , i la recta  $BP$  talla la circumferència de diàmetre  $BD$  en els punts  $B$  i  $N$ . Demostreu que les rectes  $AM, DN$  i  $XY$  són concurrents.


*Solució (de Claude Deschamps, cap de la delegació francesa).* Prenguem com a eix d'abscisses la recta que conté els quatre punts; com a eix d'ordenades la recta  $XY$ , l'origen a  $Z$ , i siguin els quatre punts

$$A(a, 0), B(b, 0), C(c, 0), D(d, 0).$$

## Geometria Analítica

Es compleix la relació

$$ac = bd = p$$



on  $p$  és la potència de  $Z$  respecte de cada una de les dues circumferències. Llavors l'equació de la circumferència de diàmetre  $AC$  és

$$x^2 + y^2 - (a + c)x + p = 0.$$

Sigui  $P(0, \lambda)$ , amb  $\lambda \neq 0$ . Les equacions paramètriques de la recta  $CP$  són

$$\begin{cases} x = c(1 - t) \\ y = t\lambda \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R};$$

i les coordenades de  $M$  són

$$t = \frac{c(c - a)}{c^2 + \lambda^2} \Rightarrow \begin{cases} x = c \frac{\lambda^2 + ac}{c^2 + \lambda^2} \\ y = c\lambda \frac{c - a}{c^2 + \lambda^2}, \end{cases}$$

d'on l'equació de  $AM$  s'escriu

$$\begin{vmatrix} x & a & c \frac{\lambda^2 + ac}{c^2 + \lambda^2} \\ y & 0 & c\lambda \frac{c - a}{c^2 + \lambda^2} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

La intersecció d'aquesta recta amb l'eix  $XY$  s'obté posant  $x = 0$ , d'on resulta  $y = -ac/\lambda$ , és a dir, només depèn de  $p$  i la concurrència està assegurada.




**Problema 6.** (núm. 2, IMO 1997, proposat per Anglaterra.) L'angle  $A$  és el menor dels angles del triangle  $ABC$ . Els punts  $B$  i  $C$  divideixen la circumferència circumscrita del triangle en dos arcs. Sigui  $U$  un punt interior de l'arc  $BC$  (el que no conté  $A$ ).

Les mediatriss de  $AB$  i  $AC$  tallen la recta  $AU$  en  $V$  i  $W$ , respectivament. Les rectes  $BV$  i  $CW$  es tallen a  $T$ .

Demostreu que  $AU = TB + TC$ .

*Solució (dels coordinadors del problema, esquemàtica).* Prenem el sistema de referència de tal manera que  $A(0,1)$ ,  $U(0,-1)$ ,  $O(-\alpha,0)$ , amb  $\alpha > 0$ , essent  $O$  el centre de la circumferència. L'equació d'aquesta és  $x^2 + y^2 + 2\alpha x - 1 = 0$ .



Equacions de les rectes que intervenen en el problema:

$$OV : y = mx + \alpha,$$

$$AB : y = -\frac{1}{m}x + 1,$$

$$OW : y = n(x + \alpha),$$

$$AC : y = -\frac{1}{n}x + 1.$$

$$\text{Coordenades de } B : \left( \frac{2m(1 - \alpha n)}{m^2 + 1}, \frac{2\alpha m + m^2 - 1}{m^2 + 1} \right).$$

$$\text{Coordenades de } C : \left( \frac{2n(1 - \alpha n)}{n^2 + 1}, \frac{2\alpha n + n^2 - 1}{n^2 + 1} \right).$$

$$\text{Equació de } BV : y = \frac{x(m^2 - 1) + 2\alpha n^2}{2m}.$$

$$\text{Equació de } CW : y = \frac{x(n^2 - 1) + 2\alpha n^2}{2n}.$$

### Geometria Analítica

Coordenades de  $T$ :  $\left( \frac{-2\alpha mn}{mn+1}, \frac{\alpha(m+n)}{mn+1} \right)$ .

Distància  $BT$ :  $\left| \frac{\alpha(m-n) - mn - 1}{mn+1} \right|$ .

Distància  $CT$ :  $\left| \frac{\alpha(m-n) + mn + 1}{mn+1} \right|$ .

Sumant adequadament totes dues distàncies i observant que en ser  $T$  interior al cercle els sentits de  $BT$  i  $CT$  són oposats, resulta  $BT + CT = 2$ .

**Problema 7.** (núm. 1, IMO 1998, proposat per Luxemburg.) En el quadrilàter convex  $ABCD$ , les diagonals  $AC$  i  $BD$  són perpendiculars i els costats oposats  $AB$  i  $CD$  no són paral·lels. Suposem que  $P$ , punt d'intersecció de les mediatrïus de  $AB$  i  $DC$ , és interior al quadrilàter. Demostreu que  $ABCD$  és cíclic (inscriuïble) si i només si  $ABP$  i  $CDP$  tenen la mateixa àrea.


*Solució (una de les oficials).* Prenem com a referència les diagonals perpendiculars; suposem que

$$A(-a, 0), B(0, b), C(c, 0), D(0, -d)$$

amb  $a, b, c, d$  estrictament positius. Siguin  $E$  i  $F$  els punts mitjans de  $AB$  i  $DC$ , respectivament,

$$E\left(-\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right), \quad F\left(\frac{c}{2}, -\frac{d}{2}\right);$$

els pendents de les rectes  $AB$  i  $DC$  són  $b/a$  i  $d/c$ , d'on les equacions de les mediatrïus dels segments corresponents són:



Mediatriu de  $AB$  :  $2(ax + by) = b^2 - a^2$ ,

Mediatriu de  $DC$  :  $2(cx + dy) = c^2 - d^2$ .

Llavors, resolent el sistema format per les dues equacions anteriors, obtenim les coordenades del punt d'intersecció  $P(x_0, y_0)$ ,

$$x_0 = \frac{d(b^2 - a^2) - b(c^2 - d^2)}{2(ad - bc)},$$

$$y_0 = \frac{a(c^2 - d^2) - c(b^2 - a^2)}{2(ad - bc)}.$$

Com que els triangles  $PBA$  i  $PDC$  tenen la mateixa orientació, la igualtat d'àrees s'escriu (mitjançant determinants, per exemple)

$$\begin{vmatrix} x_0 & y_0 & 1 \\ 0 & b & 1 \\ -a & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_0 & y_0 & 1 \\ 0 & -d & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

que es transforma en

$$(b + d)x_0 - (a + c)y_0 = cd - ab$$

i substituint els valors de  $x_0$  i  $y_0$  i fent operacions resulta finalment

$$(ac - bd)[(a + c)^2 + (b + d)^2] = 0$$

així que les àrees són iguals si i només si  $ac = bd$ , que és precisament la condició perquè  $ABCD$  sigui cíclic.

**Problema 8.** (núm. 5, IMO 1998, proposat per Ucraïna.) Sigui  $I$  l'incentre del triangle  $ABC$ . La circumferència inscrita és tangent a  $BC$ ,  $CA$  i  $AB$  en  $K$ ,  $L$  i  $M$ , respectivament. La parallela per  $B$  a  $MK$  talla  $LM$  i  $LK$  en  $R$  i  $S$ , respectivament. Demostreu que  $\widehat{RIS}$  és un angle agut.

*Solució* (de Mircea Becheanu, cap de la Delegació de Romania). Observem en primer lloc que la condició de l'enunciat es pot escriure com

$$\widehat{RIS} \text{ agut} \iff RI^2 + IS^2 - RS^2 > 0$$

pel teorema del cosinus en el triangle  $RIS$ . Però com que  $RS = RB + BS$ , la desigualtat anterior equival a

$$RI^2 + IS^2 - RB^2 - SB^2 - 2RB \cdot SB > 0.$$

### Geometria Analítica


Com que  $BI$  és perpendicular a  $KM$ , resulta que  $BI$  és perpendicular a  $RS$  i d'aquí que

$$IR^2 - RB^2 = IB^2, \quad IS^2 - BS^2 = IB^2,$$

per tant,

$$\widehat{RIS} \text{ agut} \iff IB^2 > RB \cdot SB.$$

Passem, ara, a demostrar la proposició del problema utilitzant coordenades.



Considerem el cercle inscrit amb centre en l'origen  $I(0,0)$ , i radi 1, i un sistema de coordenades en el qual  $M(a,b)$  i  $K(a,-b)$  pertanyin al cercle. Llavors  $a^2 + b^2 = 1$ .

Les equacions de les tangents al cercle en  $M$  i en  $K$  són, respectivament,

$$(1) \quad xa + yb = 1,$$

$$(2) \quad xa - yb = 1.$$

La intersecció de (1) amb  $OX$  dóna el punt  $B(1/a, 0)$ . Sigui  $L(a_1, b_1)$  un punt arbitrari del cercle,  $a_1^2 + b_1^2 = 1$ .

L'equació de la recta  $LM$  és

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & b & 1 \\ a_1 & b_1 & 1 \end{vmatrix} = 0;$$

fent  $x = 1/a$  es calcula l'ordenada de  $R$

$$y_R = \frac{1}{(a - a_1)} \left[ \frac{1}{a}(b - b_1) + (ab_1 - a_1b) \right].$$

Anàlogament, fent  $x = 1/a$  en l'equació de  $LK$  es calcula l'ordenada de  $S$

$$y_S = \frac{1}{(a - a_1)} \left[ \frac{1}{a}(b - b_1) + (ab_1 + a_1b) \right].$$

Per l'observació inicial, hem de demostrar que  $IB^2 > RB \cdot SB$ , és a dir, que

$$(3) \quad \frac{1}{a^2} > |y_R \cdot y_S|$$

i això s'escriu com

$$\frac{1}{a^2} > \frac{b^2}{a^2(a - a_1)^2} |(1 - aa_1)^2 - b^2b_1^2|$$

és a dir,

$$(a - a_1)^2 > b^2 |(1 - aa_1)^2 - (1 - a^2)(1 - a_1^2)|$$


$$(a - a_1)^2 > b^2 |1 - 2aa_1 + a^2a_1^2 - 1 + a^2 + a_1^2 - a^2a_1^2|$$

$$(a - a_1)^2 > b^2(a - a_1)^2$$

que és tant com dir  $1 > b^2$ , que efectivament és certa.

**Problema 9.** (núm. 5, IMO 1999, proposat per Rússia.) Dues circumferències  $\gamma_1$  i  $\gamma_2$ , estan contingudes en l'interior de la circumferència  $\gamma$ , i són tangents a  $\gamma$  en  $M$  i  $N$ , respectivament.  $\gamma_1$  passa pel centre de  $\gamma_2$ . La recta que passa pels dos punts d'intersecció de  $\gamma_1$  i  $\gamma_2$  talla  $\gamma$  en  $A$  i  $B$ .  $MA$  i  $MB$  tallen  $\gamma_1$  en  $C$  i  $D$ , respectivament. Demostreu que  $CD$  és tangent a  $\gamma_2$ .

*Solució.* Prenem com a origen de coordenades el punt  $M$ , eix d'abscisses  $MO_1$ , i eix d'ordenades la tangent a  $\gamma$  en  $M$ .



### Geometria Analítica

Les coordenades de  $O_1$  són  $(r_1, 0)$ , i l'equació de  $\gamma_1$  és  $(x-r_1)^2 + y^2 = r_1^2$ ; les coordenades de  $O_2$  són, anomenant  $t = \widehat{OO_1O_2}$ ,  $(r_1 + r_1 \cos t, r_1 \sin t)$ , així que l'equació de  $\gamma_2$  serà  $(x - r_1 - r_1 \cos t)^2 + (y - r_1 \sin t)^2 = r_2^2$ .

L'equació de  $AB$  és la de l'eix radical de  $\gamma_1$  i  $\gamma_2$ , que obtenim restant les equacions de les dues circumferències

$$2xr_1 \cos t + 2yr_1 \sin t = 2r_1^2 - r_2^2 + 2r_1^2 \cos t.$$

L'homotècia de centre en  $M$  que transforma  $\gamma$  en  $\gamma_1$  té raó  $r/r_1$ ; per tant, l'equació de  $CD$ , transformada de  $AB$  per aquesta homotècia, s'obté simplement multiplicant el coeficient de  $x$  i el de  $y$  per la raó

$$2rx \cos t + 2ry \sin t = 2r_1^2 - r_2^2 + 2r_1^2 \cos t.$$

Ara bé, el teorema del cosinus en el triangle  $OO_1O_2$  permet escriure

$$\cos t = \frac{O_1O_2^2 + O_1O_2^2 - OO_2^2}{2O_1O_1 \cdot O_1O_2} = \frac{2r_1^2 - 2rr_1 + 2rr_2 - r_2^2}{2(r - r_1)r_1}$$

i llavors la distància de  $O_2$  a la recta  $CD$  es calcula en funció dels radis

$$d(O_2, CD) = \frac{1}{2r} \left| (2rr_1 - 2r_1^2) \cos t + 2rr_1 - 2r_1^2 + r_2^2 \right| = \frac{1}{2r} |2rr_2| = r_2$$

d'on, efectivament,  $CD$  és tangent a  $\gamma_2$ .

**Problema 10.** (núm. 3, 36 OME, 2000.) Dues circumferències fixes  $\gamma_1$  i  $\gamma_2$  es tallen en els punts  $A$  i  $B$ . Una recta variable que passa per  $B$  talla novament la primera circumferència en  $P_r$  i la segona en  $Q_r$ . Demostreu que les mediatris dels segments  $P_rQ_r$  passen per un punt fix.

*Solució.* Prendrem com a eix d'abscisses la recta que uneix els centres de les dues circumferències, i com a eix d'ordenades, la recta  $AB$  (que és l'eix radical de les dues). Llavors les equacions de les circumferències i dels punts rellevants en el problema són

$$A(a, 0), \quad B(0, -a)$$

$$\gamma_1 : (x - p)^2 + y^2 = r_1^2$$

$$\gamma_2 : (x - q)^2 + y^2 = r_2^2$$

i l'equació de la recta variable per  $B$  és  $y + a = mx$ .

Les relacions entre  $a$ ,  $p$ ,  $q$  i els radis són

$$p^2 + a^2 = r_1^2, \quad q^2 + a^2 = r_2^2.$$

Les coordenades de  $P_r$  i  $Q_r$  són

$$P_r : \left( \frac{2(p+ma)}{1+m^2}, \frac{2mp+a(m^2-1)}{1+m^2} \right),$$

$$Q_r : \left( \frac{2(q+ma)}{1+m^2}, \frac{2mq+a(m^2-1)}{1+m^2} \right).$$

D'aquí s'obté l'equació de la mediatriu de  $P_r Q_r$

$$y - \frac{m(p+q) + a(m^2-1)}{1+m^2} = -\frac{1}{m} \left( x - \frac{p+q+2ma}{1+m^2} \right)$$

que es transforma, en fer operacions, en

$$(m^2+1)(p+q) + am(m^2+1) - m(1+m^2)y - (1+m^2)x = 0,$$

és a dir, en

$$(p+q-x) + m(a-y) = 0$$

i aquest feix de rectes dependents del paràmetre  $m$ , passa pel punt d'intersecció de les rectes  $x = p+q$ ,  $y = a$  i aquest punt  $M(p+q, a)$  és fix, ja que  $p$ ,  $q$ ,  $a$  depenen dels radis de les dues circumferències.

## Problemes

(Per a resoldre amb geometria analítica.)

**GA1.** (núm. 5, IMO 1959, proposat per Romania.) S'escull un punt arbitrari  $M$  a l'interior d'un segment  $AB$ . Els quadrats  $AMCD$  i  $MBEF$  es construeixen al mateix costat de  $AB$ , sent  $AM$  i  $MB$  les bases respectives. Els cercles circumscrits a aquests quadrats, de centres  $P$  i  $Q$ , es tallen en  $M$  i en un altre punt  $N$ . Sigui  $N'$  el punt d'intersecció de les rectes  $AF$  i  $BC$ .

a) Proveu que  $N$  i  $N'$  coincideixen.

b) Proveu que les rectes  $MN$  passen per un fix  $S$ , independent de l'elecció de  $M$ .

c) Trobeu el lloc geomètric dels punts mitjans dels segments  $PQ$  quan  $M$  varia entre  $A$  i  $B$ .

**GA2.** (núm. 6, IMO 1961, proposat per Romania.) Es considera un pla  $\pi$  i tres punts no alineats  $A, B, C$  a un mateix costat de  $\pi$ ; suposem que el pla determinat pels tres punts no és paral·lel a  $\pi$ . Al pla  $\pi$  es prenen tres punts arbitraris  $A', B', C'$ . Siguin  $L, M, N$  els punts mitjans dels segments  $AA', BB'$  i  $CC'$ . Sigui  $G$  el baricentre del triangle  $LMN$ . (No es consideren posicions de  $A', B', C'$  tals que  $L, M$  i  $N$  no formin triangle). Quin és el lloc geomètric de  $G$  quan  $A', B', C'$  varien independentment sobre  $\pi$ ?

**GA3.** (núm. 1, IMO 1997, proposat per Holanda.) Es construeixen, a l'interior del quadrat  $ABCD$ , els triangles equilàters  $ABK, BCL, CDM$  i  $DAN$ . Demostreu que els punts mitjans dels quatre segments  $KL, LM, MN, NK$ , i els punts mitjans dels vuit segments  $AK, BK, BL, CL, CM, DM, DN, AN$ , són els vèrtexs d'un dodecàgon regular.

**GA4.** (núm. 2, IMO 1978, proposat pels Estats Units.) Sigui  $P$  un punt donat a l'interior d'una esfera donada. Tres raigs mútuament perpendiculars que surten de  $P$  tallen l'esfera en els punts  $U, V$  i  $W$ ; el punt  $Q$  és el vèrtex diagonalment oposat a  $P$  en el paral·lelepípede determinat per  $PU, PV$  i  $PW$ . Trobeu el lloc geomètric de  $Q$  per totes les ternes de raigs mútuament perpendiculars i d'origen  $P$ .

**GA5.** (Olimpíada del Canadà, 1994.) El triangle  $ABC$  és acutangle. Sigui  $AD$  l'altura des de  $A$ , i  $H$  un punt qualsevol interior a  $AD$ . La recta  $BH$  talla el segment  $AC$  al punt  $E$  i la recta  $CH$  talla el segment  $AB$  al punt  $F$ . Demostreu que  $\widehat{EDH} = \widehat{HDF}$ .

**GA6.** (Olimpíada Matemàtica Espanyola, 1995.) Al triangle  $ABC$ , rectangle a  $A$ , els punts  $M$  i  $N$  són els peus de les bisectrius interiors dels angles  $B$  i  $C$ , respectivament; i  $D$  és el peu de l'altura des de  $A$ . Si  $O$  és el punt d'intersecció de  $AD$  i  $MN$ , demostreu que  $AO = r$ , el radi del cercle inscrit a  $ABC$ .



## Alguns comentaris finals

1.- El problema 2 havia estat proposat a la revista suïssa *Elemente der Mathematik*, vol 2, n 3, 1947, p 68, per E. Voellmy. Entre les cinc persones que el van resoldre en aquella època, hi havia el veterà Cap de la Delegació de Luxemburg a la IMO d'Austràlia. Realment, era molt improbable que entre els membres del Jurat presents a Austràlia, n'hi hagués cap que recordés un problema publicat 40 anys abans en una revista en llengua alemanya.

2.- Potser ens sorprengui que un problema sigui proposat per dos països, com el cas del problema 3. En realitat, cada país havia proposat només una meitat de la doble implicació de l'enunciat. El Comitè de problemes de Hong Kong (on es va celebrar la IMO de 1994), presidit per Andy Liu, va refondre els dos enunciats en un de sol.

3.- Del problema 6, original del britànic Christopher Bradley, no se'n va conèixer cap solució analítica fins que l'equip de coordinadors d'aquest problema a Mar del Plata, que comandava Angelo Barone Netto, del Brasil, la va fer conèixer als Caps de Delegació. Es va sospitar que algun concursant intentaria fer-lo d'aquesta forma, i van decidir d'arribar fins al final, per tal de poder adjudicar punts a les solucions analítiques parcials.

4.- La solució del problema 8 és similar a l'obtinguda durant la IMO 1998 a Taiwan per Jaime Vinuesa del Río, que aconseguí una medalla de bronze.

5.- El problema 9 admet solucions sintètiques molt boniques; si s'intenta trobar les coordenades dels quatre punts  $A$ ,  $B$ ,  $C$  i  $D$ , els càlculs es compliquen en excés.

6.- El problema 10 va ser un dels que van marcar diferències a la fase nacional de l'Olimpíada Matemàtica Espanyola de 2000, celebrada a Palma de Mallorca; altres sistemes de referència elegits condueixen a situacions més complicades.

7.- En el problema GA5, proposat sense solució, si  $H$  és l'ortocentre s'obté un resultat conegut (temo que per poca gent): les altures d'un triangle acutangle són les bisectrius del triangle òrtic.



## PROBLEMES DIVERSOS

Francisco Bellot Rosado

En aquest capítol es recull un conjunt relativament heterogeni de problemes. Alguns d'ells han estat proposats a les Olimpíades Internacionals (IMO) i podrien encaixar dins d'un grup de "problemes de difícil classificació", bé perquè a la solució hi intervenen tècniques mixtes, bé perquè, en apariència, a la solució no hi ha un substrat teòric suficientment elemental que pugui exposar-se prèviament a estudiants de Batxillerat. D'altres problemes no van ser seleccionats per a la prova de la IMO, encara que tenien, en la meua opinió, mèrits semblants o fins i tot més grans per a haver estat elegits. En algunes ocasions s'inclouen comentaris que, tal vegada, il·lustren el context de l'elecció d'un problema per part d'un Jurat format per 80 persones de diferents països.

Crec que tots tenen un elevat nivell de dificultat; això no ens hauria d'estranyar ja que els problemes de l'Olimpíada Internacional són, en general, molt difícils.

---

El primer exemple és original de Ioan Tomescu, es va publicar (sense solució) a la revista romanesa *Gazeta Matematica* el 1991 i la solució que presentem és d'Álvaro Begué Aguado, medalla de bronze a la IMO de 1993.

**Problema 1.** Es considera un conjunt  $M$  de  $n$  persones, tal que:

- Tota persona de  $M$  coneix altres  $k$  persones de  $M$ .
- Tot parell de persones de  $M$  que es coneixen, coneixen  $h$  persones de  $M$ .
- Tot parell de persones de  $M$  que no es coneixen, tenen exactament  $m$  coneguts comuns a  $M$ .

Demostreu que  $m(n - k) - k(k - h) + k - m = 0$ .

**Solució.** Suposem que si  $A$  coneix  $B$ , llavors  $B$  coneix  $A$ .

Associarem un graf al problema de la manera següent: cada persona és un vèrtex; dos

### Problemes diversos

vèrtexs units per una aresta representarà a dues persones que es coneixen. A l'estructura formada per tres vèrtexs units per dues arestes l'anomenarem *quasi triangle*. Anem a comptar de dues maneres diferents el nombre de quasi triangles del graf associat al problema.

El nombre de vèrtexs és  $n$ ; el grau de cada vèrtex es  $k$ ; el nombre d'arestes és  $nk/2$ ; i el nombre de no arestes és

$$\frac{n(n-1) - nk}{2} = \frac{n(n-k-1)}{2}.$$

El nombre de quasi triangles que contenen una certa aresta és  $2(k-h-1)$ , de manera que de quasi triangles n'hi haurà

$$(1) \quad \frac{nk(k-h-1)}{2}.$$

D'altra banda, el nombre de parells de punts no units per una aresta és

$$\frac{n(n-k-1)}{2};$$

el nombre de quasi triangles que contenen una certa no aresta es  $m$ , i per tant hi ha

$$(2) \quad \frac{mn(n-k-1)}{2}$$

quasi triangles.

Escrivint (1) = (2) i fent operacions s'obté precisament la igualtat de l'enunciat.

---

L'exemple següent va ser proposat al Torneig Internacional de les Ciutats de 1986 (diguem de passada, per als alumnes més joves).

#### Problema 2. (El mite de Sísif)

Hi ha 1001 graons, amb roques en alguns d'ells (no més d'una a cada graó). Sísif ha d'agafar una roca i pujar-la, un o més graons, fins el primer graó que trobi buit. Aleshores Hades, el seu oponent, agafa una roca i la baixa un graó, sempre que aquest estigui buit. Inicialment hi ha 500 roques als primers 500 graons. Sísif i Hades mouen les roques alternativament, i Sísif fa el moviment inicial.

Sísif ha de col·locar una roca a l'últim graó. Ho pot impedir Hades?

*Solució (oficial).* Sí, pot impedir-ho. Sempre que Sísif creï una vacant movent una roca, el graó de dalt d'aquesta vacant ha d'estar ocupat. Si no estava ocupat abans, Sísif ha de traslladar allà la seva roca. Per tant, Hades sempre pot omplir aquesta vacant immediatament, baixant la roca del graó superior. Demostrarem que aquesta estratègia basta per a impedir que Sísif aconseguixi el seu objectiu.

Observem que el primer graó està inicialment ocupat; l'estratègia d'Hades garanteix que sempre estarà ocupat després que Hades mogui. Ademés, inicialment no existeixen dues vacants adjacents per sota de la roca més alta. Per tal que Sísif pugui crear aquestes dues vacants, la inferior ha d'existir prèviament. Però, tan bon punt hagi creat la superior, Hades la ocupa. Per la forma que mou Hades, mai crearà dues vacants adjacents per sota de la roca més alta. Perquè això passi, la vacant superior ha d'existir prèviament, de manera que la roca en el següent graó per sota no hagi estat moguda allà. Si existís una vacant per sota d'aquest graó, no ha estat creada immediatament abans. Per tant Hades no mourà la roca en qüestió. Es dedueix d'això que sempre que sigui el torn de Sísif, el primer graó estarà ocupat i no existeixen dues vacants adjacents per sota de la roca més alta. Per tant, aquesta no pot pujar més enllà del graó 999, així que Sísif no pot situar la roca al 1001.

---

L'exemple següent resultà polèmic: fou proposat el 1992 a la Olimpíada de la Comunitat d'Estats Independents, i el cas particular amb  $m = n$  fou proposat per Finlàndia l'any següent a la IMO d'Estambul, on va ser elegit i es va convertir en el més difícil del primer dia. Ningú no va dir res; el cas es va descobrir al final, perquè la solució havia estat publicada a la revista russa *Kvant*. La sessió del Jurat Internacional de la IMO on es va mostrar la pàgina de *Kvant* amb el problema va ser molt desagradable. Però el problema és molt bonic, i la solució és elemental, de gran brillantor.

**Problema 3.** (*Olimpíada de la Comunitat d'Estats Independents, 1992.*) En un escaquer hi ha fitxes, formant un rectangle de dimensions  $m \times n$ ,  $m \geq 2, n \geq 2$ . El tauler és infinit, en totes direccions. Només hi ha un tipus de moviment permès: una fitxa salta sobre una altra fitxa situada en una casella contigua, anant a parar a una casella que estigui buida, i es menja la fitxa sobre la que salta. Això es pot fer horitzontalment o verticalment, però no en diagonal.

Quin és el menor nombre de fitxes que pot quedar a l'escaquer?

### Problemes diversos

*Solució.* Podem pensar en els casos que  $m$  i  $n$  no són excessivament grans, ja que sempre serà més fàcil que si comencem amb un rectangle  $1537 \times 2000 \dots$


Si el rectangle té dimensions  $2 \times 1$ , l'anàlisi acaba aviat: només queda una fitxa al tauler.

Si és  $3 \times 1$ , queden dues fitxes, ja que inicialment solament es pot moure la central, menjant-se una de les altres dues, i les que queden després estan massa separades per a continuar el joc.

El cas  $2 \times 2$  es redueix fàcilment al  $2 \times 1$  (queda una fitxa), i el  $3 \times 2$  es redueix al  $3 \times 1$  (queden dues fitxes).

De seguida es comprèn que l'estratègia que utilitzem en casos més complexos ha de ser tal que mantingui les fitxes el més agrupades possible. La seqüència de moviments que veurem a continuació ens permetrà, no solament això, sinó també eliminar files completes de les fitxes del rectangle.

Si en alguna part del rectangle hi ha quatre fitxes en la posició de la figura




es fàcil trobar una sèrie de moviments permesos per mitjà dels quals s'eliminen les tres fitxes horitzontals i la quarta es queda, al final, en la mateixa posició que té al principi. (Els alumnes troben aquesta sèrie de seguida).

Veurem a continuació com eliminar files completes de tres en tres, utilitzant aquest procediment. Considerem el rectangle  $m \times n$ , representat a la figura (hi ha punts suspensius per a indicar les columnes intermèdies)

Començant per la columna de l'esquerra, anem eliminant grups de tres fitxes, en columna, d'esquerra a dreta, fins que quedin les tres últimes columnes de la dreta; i les últimes 9


fitxes s'eliminen en grups de tres fitxes horitzontals, de dalt a baix.



Així podem eliminar les tres files completes, passant, per tant, d'un rectangle  $m \times n$  a un rectangle  $(m - 3) \times n$ .

Naturalment, el que hem dit arran de les files ho podríem repetir per a les columnes. Això significa que per mitjà del procediment anterior bastarà considerar només valors petits de  $m$  i  $n$ .

A més a més dels que ja hem vist al principi, és instructiu veure com en el cas  $4 \times 4$  es pot aconseguir que quedi una única fitxa al tauler; la següent figura mostra com fer-ho:



Deixarem la fitxa de la cantonada superior esquerra, eliminant les altres així: primer les tres fitxes que té per sota (en vertical); després les tres fitxes horitzontals de la fila inferior; i després, de dreta a esquerra, les que estan en grups de tres, verticals.

En aquest punt, ens podem preguntar, quan quedaran dues fitxes i quan en quedarà només una. Com que les files (o columnes) del rectangle es van eliminant de tres en tres, la resposta del problema sembla ser

### Problemes diversos

DUES, si el producte  $mn$  es múltiple de tres; UNA, en cas contrari

No obstant, el problema no està encara completament resolt; és clar que la nostra estratègia funciona bé quan queda una sola fitxa al tauler (no en poden quedar menys); però hem de demostrar que en els altres casos (quan el producte es múltiple de tres), no poden quedar menys de dues fitxes.

Analizarem els casos  $4 \times 3$  i  $5 \times 3$ . Abans de començar el joc, acolorim les caselles de l'escaquer amb tres colors, A, B i C, tal com indica la figura (que només representa el rectangle  $4 \times 3$ , però se suposa que totes les caselles del tauler estan acolorides de la mateixa manera):

A	B	C	A
B	C	A	B
C	A	B	C

Com es pot observar, les caselles del mateix color estan en diagonals. Posem ara les fitxes al rectangle  $4 \times 3$ . Abans de començar a jugar, hi ha quatre fitxes a les caselles de color A, quatre a les de color B i quatre a les de color C. Anem a veure quin és l'efecte del moviment del joc sobre el nombre de fitxes que hi ha a les caselles de cada color. Per fixar idees, suposem que la fitxa situada a la casella de color A, del vèrtex superior dret, és menjada per la de la seva esquerra, que era a la casella de color C, i que en saltar sobre ella ocupa una casella de color B (no representada a la figura). Fent aquest moviment, hi ha tres fitxes a les caselles de color A, cinc a les de color B i tres a les de color C.

En altres paraules, el nombre de fitxes a les caselles d'un color augmenta en 1, i el nombre de fitxes a les caselles dels altres dos colors disminueix en 1. Inicialment, els nombres de fitxes a les caselles de cada color eren *parells*, i després del moviment del joc són *senars*. Si el rectangle fos  $5 \times 3$ , la situació s'invertiria: abans de jugar, el nombre de fitxes a les caselles de cada color és *senar*, i després del moviment del joc, és *parell*.

Aquesta situació pot expressar-se dient que, en aquest joc, és *invariant* la igualtat de les paritats del nombre de fitxes que hi ha a les caselles de cada color.

Doncs bé, això és suficient per a garantir que, en el cas que ens ocupa ( $mn$  es múltiple de 3), *no poden quedar menys de dues fitxes*. Perquè si passés això, quedaria una sola fitxa



al tauler, és a dir, cap fitxa a les caselles de dos dels colors, i una a la casella del tercer color. Però els nombres 0, 1, 0 no tenen la mateixa paritat, i per tant és impossible arribar a aquesta situació.

El quart exemple és un problema que havia de ser proposat a la IMO de 1991, a Sigtuna (Suècia). El va presentar Bulgària, y, tal com va dir el representant del Brasil, és igualment difícil per un estudiant xinès que per un de Trinidad-Tobago.

Malgrat tot, no va ser elegit. Presentem la solució obtinguda per Daniel Lasasosa Medarde l'estiu de 1991, durant la preparació de l'Olimpíada Iberoamericana d'aquell any. (La solució oficial figura publicada a [1]).

**Problema 4.** Dos estudiants,  $A$  i  $B$ , juguen de la següent manera: cada un d'ells escriu en un paper un nombre enter positiu i el dona a l'àrbitre. Aquest, escriu a la pissarra dos enters, un dels quals és la suma dels nombres escrits pels dos jugadors. L'àrbitre pregunta a l'estudiant  $A$ : *Pots saber el nombre escrit per l'altre jugador?*. Si  $A$  contesta "No", l'àrbitre fa la mateixa pregunta al jugador  $B$ . Si  $B$  contesta "No", torna a fer-li la pregunta a  $A$ , etc.

Se suposa que  $A$  i  $B$  són intel·ligents i diuen la veritat.

Demostreu que, en un nombre finit d'etapes, algun dels estudiants contesta "Sí".

*Solució.*  $A$  coneix el seu nombre  $a$ , i  $B$  el seu  $b$ .  $A$  més a més, tots dos coneixen els nombres donats per l'àrbitre ( $c, d$  on suposarem  $c < d$ ). Podem menysprear el cas  $c = d$ , ja que guanyaria directament  $A$ , ja que

$$b + a = c = d \implies b = c - a = d - a.$$

•  $A$  només pot estar segur de conèixer la suma si  $a \geq c$ ; en aquest cas,  $a + b > c$ , i com que  $a + b = c$  o  $a + b = d$ , deduïm que  $a + b = d$  d'on  $b = d - a$ .

• En el cas que  $A$  no conegui la suma,  $B$  sap que  $c > a$  (si no,  $A$  hauria guanyat). Per tant  $a + b < c + b$ ; si  $d \geq c + b$ ,  $d > a + b$ , d'on  $a + b = c$ ,  $a = c - b$  i guanyaria  $B$ .

• Si  $B$  no guanya,  $A$  ja sap que  $c + b > d$ , per tant  $b > d - c$ ;  $a + b > a + d - c$ ; si  $a + d - c \geq c$ ,  $A$  guanya ja que  $a + b > c$ ,  $a + b = d$ . Si no,  $B$  ja sap que  $a + d - c < c$ ,  $a < 2c - d$ ,  $a + b < 2c - d + b = c + b - (d - c)$ ; si  $d \geq c + b - (d - c)$ ,  $a + b < d$ ,  $a + b = c$  i  $B$  guanya, etc.

Les fites obtingudes per  $A$  han estat  $a \geq c$ ,  $a \geq 2c - d = c - (d - c)$ .

### Problemes diversos

Les obtingudes per  $B$  han estat  $d - c \geq b, 2(d - c) \geq b$ .

Vegem que les fites de  $A$  són de la forma  $a \geq c - n(d - c)$  i les de  $B$ ,  $n(d - c) \geq b$ .

Segui  $K$  una fita de  $A$ ,  $a \geq K$ . Si  $A$  no encerta,  $B$  sap que  $a < K$ , d'on  $a + b < K + b$ ; si  $d \geq K + b$ , llavors  $a + b < d$  i  $B$  guanya. Si no,  $A$  sap que  $K + b > d$ ,  $b > d - K$ ,  $a + b > d - K + a$ ; si  $d - K + a \geq c$ ,  $a + b > c$ , i  $A$  guanya. La nova fita ha estat

$$a \geq K + c - d = K - (d - c).$$

Això val per a tot  $K$ , de manera que les successives fites de  $A$  són

$$c, c - (d - c), c - 2(d - c), \dots, c - n(d - c).$$

El mateix tipus de raonament permet obtenir les fites de  $B$

$$d - c, 2(d - c), 3(d - c), \dots$$

De  $a \geq c - n(d - c)$  obtenim  $n \geq \frac{c-a}{d-c}$ ; aleshores si prenem  $n = \left\lceil \frac{c-a}{d-c} \right\rceil + 1$  segur que es complirà l'anterior desigualtat; per tant si  $A$  o  $B$  no han guanyat abans,  $A$  guanya ara; és en el torn  $\left( \left\lceil \frac{c-a}{d-c} \right\rceil + 1 \right)$ -èsim de  $A$ .

Finalment, observem que en guanyar,  $A$  descobreix que  $a + b = d$ . Si guanya  $B$ , descobreix que  $a + b = c$ . Per tant, si l'àrbitre elegeix el segon nombre més gran que la suma, guanya  $B$ ; i si no, guanya  $A$ .

El següent exemple fou presentat per Bulgària en la IMO de 1985, però no resultà elegit. És un cas lleugerament més general d'altres problemes similars.

**Problema 5.** Siguin  $a$  i  $b$  nombres enters, i  $n$  un enter positiu. Demostreu que

$$\frac{b^{n-1}a(a+b)(a+2b) \cdots (a+(n-1)b)}{n!}$$

és un nombre enter.

*Solució (oficial).* És ben conegut que si  $p < n$  es primer, l'exponent més gran  $\alpha$  tal que  $p^\alpha$  divideix  $n!$  és

$$\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots$$

Aquesta suma (finita, ja que si  $p^x > n$  els sumands són nuls) és menor o igual que

$$\left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{2^2}\right] + \left[\frac{n}{2^3}\right] + \dots + m$$

i aquesta suma és menor o igual que  $n$ . Per tant, ha de ser

$$n - 1 \geq \alpha.$$

Si  $p$  divideix  $b$ , aleshores es pot simplificar  $p$  del quocient. Si  $p$  no divideix  $b$ , aleshores ha de dividir un dels factors

$$a, a + b, a + 2b, \dots, a + (p - 1)b.$$

En total hi haurà al menys  $\lceil n/p \rceil$  factors divisibles per  $p$ . De la mateixa manera, hi haurà al menys  $\lceil n/p^2 \rceil$  factors divisibles per  $p^2$ , i així successivament. En total, el producte

$$a(a + b)(a + 2b) \dots (a + (n - 1)b)$$

té  $p$  com a factor al menys  $\alpha$  vegades, i hem acabat.

Els dos exemples següents són d'equacions funcionals. El primer va ser, probablement, un dels més difícils de l'Olimpíada de 1996 de Bombay. No s'havia proposat mai en la IMO una equació funcional amb domini en els enters que admetés a més de les solucions trivials, una família infinita de solucions, gens fàcil de construir.

**Problema 6.** (Proposat per Romania.) Sobre el conjunt dels enters més grans o iguals que zero, es demana que determineu totes les funcions  $f$  d'aquest conjunt en ell mateix, tals que

$$f(m + f(n)) = f(f(m)) + f(n),$$

qualssevol que siguin els elements  $m, n$  de l'esmentat conjunt. (Problema original de Mircea Becheanu).

*Solució (de l'autor).* Designem per  $\mathbb{N}$  el conjunt dels enters més grans o iguals que zero. En primer lloc provem alguns valors particulars de les variables:

Si  $m = n = 0$ , aleshores  $f(0) = 0$ .

Si  $m = 0$ , aleshores  $f(f(n)) = f(n)$  per a tot  $n \in \mathbb{N}$  (\*).

### Problemes diversos

Per tant, passant aquest resultat a l'equació funcional, aquesta es pot escriure en la forma

$$f(m + f(n)) = f(m) + f(n), \quad \forall m, n \in \mathbb{N}.$$

La funció nul·la és una solució de l'equació. Suposem que  $f$  no és la funció nul·la. Aleshores té punts fixos no nuls, ja que es compleix (\*). Sigui  $P \subset \mathbb{N}$  el conjunt dels punts fixos no nuls de la funció. És evident que  $P \cup \{0\} = f(\mathbb{N})$ . Sigui  $a$  el menor punt fix no nul. Si  $a = 1$ , aleshores  $f(2) = 2$  i es comprova per inducció que  $f(n) = n$ , qualsevol que sigui  $n$ . Suposem ara que  $a > 1$ . Per inducció es demostra que  $f(ka) = ka$ ,  $\forall k \geq 1$ . D'aquí surt que

$$a\mathbb{N} \subset P \cup \{0\}.$$

Anem a demostrar que  $a\mathbb{N} = P \cup \{0\}$ . Observem primer que la suma de dos punts fixos és un punt fix. Sigui  $b$  un punt fix arbitrari. D'acord amb la divisió entera

$$b = aq + r, \quad 0 \leq r < a.$$

tenim

$$b = f(b) = f(aq + r) = f(r + f(aq)) = f(r) + f(aq) = f(r) + aq.$$

Resulta que  $f(r) = r$ , i per tal que  $r < a$ , ha de ser  $r = 0$ . En conclusió,  $f(\mathbb{N}) = a\mathbb{N} = P \cup \{0\}$ .

En particular, per a tot  $i$ ,  $0 \leq i \leq a - 1$ , es té

$$f(i) = a n_i, \text{ amb } n_i \in \mathbb{N} \text{ i } n_0 = 0.$$

Sigui ara  $n \in \mathbb{N}$  arbitrari. Dividint per  $a$ ,

$$n = ka + i, \quad 0 \leq i < a.$$

Resulta aleshores que

$$f(n) = f(i + ka) = f(i + f(ka)) = f(i) + ka = n_i a + ka = \left( \left[ \frac{n}{a} \right] + n_i \right) a.$$

Comprovem que aquestes funcions compleixen l'equació funcional. Siguin  $m = ka + i$ ,  $n = ha + j$ ,  $0 \leq i, j < a$ . Llavors

$$\begin{aligned} f(m + f(n)) &= f(ka + i + f(ha + j)) = f(ka + i + (h + n_j)a) \\ &= f(k + h + n_j)a + i = (k + h + n_j + n_i)a \\ &= (k + n_i)a + (h + n_j)a = f(m) + f(n). \end{aligned}$$

Per tant, si  $f$  no és la funció nul·la, té la forma general següent:

Sigui  $a \in \mathbb{N}$  i  $n_0, n_1, \dots, n_{a-1}$ , nombres naturals arbitraris, amb  $n_0 = 0$ . Aleshores

$$f(n) = \left( \left[ \frac{n}{a} \right] + n_i \right) a,$$

on  $i$  es el residu de la divisió de  $n$  per  $a$ .

La funció identitat és d'aquesta forma, amb  $a = 1$ .

L'exemple següent va ser el problema 6 de la IMO de 1998 a Taiwan. La revista francesa *Quadrature*, núm. 34, Oct-Nov-Des. 98, pàgs. 47-48, va publicar una anàlisi excel·lent d'aquest problema, a càrrec de Roger Cuculière. S'hi descobreix, entre d'altres coses, que la funció completament multiplicativa i involutiva s'ha utilitzat en tres ocasions a les IMO: el 1983 (Problema 1), el 1994 (Problema 5) i el 1998 (Problema 6). I, curiosament, si mirem la solució del problema de 1983, inevitablement ens recorda la solució de l'exemple precedent ...

També és molt instructiu l'anàlisi que del problema de 1994 fan J.P.Boudine, F.Lo Jacomo, i R.Cuculière a l'excel·lent publicació francesa *Olympiades Internationales de Mathématiques: énoncés et solutions détaillées (1988-1997)*, Editions du Choix, 1998.

**Problema 7.** Determineu el menor valor possible de  $f(1998)$ , si  $f$  és una funció del conjunt  $\mathbb{N}$  dels enters positius en ell mateix, tal que, per a tots els  $m, n \in \mathbb{N}$ ,

$$f(n^2 f(m)) = m(f(n))^2.$$

*Solució (oficial).* Anomenem  $S$  al conjunt de funcions considerades, sigui  $f$  una qualsevol d'elles, i posem  $f(1) = a$ .

Fent separatament  $n = 1, m = 1$ , obtenim

$$f(f(m)) = a^2 m; \quad f(an^2) = [f(n)]^2 \quad \text{per a tot } m, n \in \mathbb{N}.$$

Aquestes relacions, junt amb l'equació funcional original, donen

$$\begin{aligned} [f(m)f(n)]^2 &= [f(m)]^2 f(an^2) = f\left(m^2 f(f(an^2))\right) = \\ &= f(m^2 a^2 an^2) = f(a(amn)^2) \\ &= [f(amn)]^2. \end{aligned}$$

Problemes diversos

En deduïm que  $f(amn) = f(m)f(n)$ , qualssevol que siguin  $m, n$ ; en particular,  $f(am) = af(m)$ , i aleshores

$$(1) \quad af(mn) = f(m)f(n) \quad \text{per a tots els } m, n \in \mathbb{N}.$$

Ara provarem que  $f(n)$  és divisible per  $a$  per a cada  $n \in \mathbb{N}$ .

Per un cert primer donat  $p$ , siguin  $p^\alpha, p^\beta$  les potències més grans de  $p$  que divideixen, respectivament,  $a$  i  $f(n)$ . Per inducció, i utilitzant (1), es demostra que

$$[f(n)]^k = a^{k-1}f(n^k) \quad \text{per a tot } k \in \mathbb{N}.$$

La potència més gran de  $p$  que divideix  $[f(n)]^k$  és  $p^{k\beta}$ ; la potència més gran de  $p$  que divideix  $a^{k-1}$  és  $p^{(k-1)\alpha}$ . Per tant,

$$k\beta \geq (k-1)\alpha \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

que només és possible si  $\beta \geq \alpha$ . La conclusió es compleix per a qualsevol primer  $p$ , de manera que  $a$  divideix  $f(n)$ . Per tant, podem posar  $g(n) = f(n)/a$ , i obtenim una nova funció  $g$  de  $\mathbb{N}$  en ell mateix. Els resultats provats abans demostren que

$$(2) \quad g(a) = a, \quad g(mn) = g(m)g(n), \quad g(g(m)) = m$$

qualssevol que siguin  $m, n \in \mathbb{N}$ . En efecte,  $g(mn) = g(m)g(n)$  és equivalent a (1), i la propietat involutiva  $g(g(m)) = m$  es dedueix de

$$\begin{aligned} ag(g(m)) &= g(a)g(g(m)) = g(ag(m)) = g(f(m)) = \\ &= \frac{f(f(m))}{a} = \frac{a^2m}{a} = am. \end{aligned}$$

Es fàcil (?) deduir de (2) que

$$g(n^2g(m)) = g(n^2)g(g(m)) = m[g(n)]^2 \quad \forall m, n \in \mathbb{N}.$$

Per tant,  $g$  es també una funció de  $S$  i els seus valors no excedeixen dels corresponents de  $f$ . Així podem limitar l'atenció a les funcions  $g$  que compleixen (2). El fet essencial és que cada funció d'aquest tipus transforma primers en primers.

En efecte, sigui  $p$  un primer, i posem  $g(p) = uv$  per certs enters positius  $u, v$ . Per (2),

$$p = g(g(p)) = g(uv) = g(u)g(v),$$

d'on, un d'aquests factors, diguem  $g(u)$ , ha de ser 1. Llavors  $u = g(g(u)) = g(1) = 1$ , de manera que  $g(p)$  es primer.

Per tal de determinar el mínim valor buscat, sigui  $g$  qualsevol funció que satisfaci (2). Es injectiva, perquè

$$g(m) = g(n) \implies m = g(g(m)) = g(g(n)) = n,$$

així que transforma primers diferents en primers diferents. Per tant una fita inferior per

$$g(1998) = g(2 \cdot 3^3 \cdot 37) = g(2)[g(3)]^3 g(37)$$

s'obté quan  $g(2), g(3), g(37)$  són els tres primers més petits, 2, 3, 5, amb  $g(3) = 2$ . Això dóna  $g(1998) \geq 3 \cdot 2^3 \cdot 5 = 120$  per a cada funció  $g \in S$ .

Vegem, finalment, que hi ha una funció a  $S$  que abasta aquesta fita: Posem  $g(1) = 1$ , i definim  $g$  sobre els nombres primers de la següent manera:

$$g(2) = 3, \quad g(3) = 2, \quad g(5) = 37, \quad g(37) = 5;$$

$$g(p) = p \text{ per als altres primers}$$

La definició s'estén aleshores a qualsevol nombre

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k} \in \mathbb{N}$$

posant

$$g(n) = g(p_1)^{\alpha_1} g(p_2)^{\alpha_2} \dots g(p_k)^{\alpha_k}.$$

Les condicions (2) es compleixen (amb  $a = 1$ ), i per tant  $g \in S$ . Clarament,  $g(1998) = 120$ , i hem acabat.

---

Com a pont cap a la Geometria veurem ara un exemple d'un problema proposat al Canadà a la IMO de 1995 per la República Txeca. (Seria imperdonable que no posés problemes de geometria en una selecció com aquesta.)

**Problema 8.** Determineu tots els enters  $n > 3$  per als quals existeixen  $n$  punts  $A_1, A_2, \dots, A_n$  en el pla, i nombres reals  $r_1, r_2, \dots, r_n$  que compleixen les següents condicions:

- 1) Entre els punts  $A_1, \dots, A_n$  no n'hi ha tres que estiguin alineats;
- 2) Per a cada terna  $i, j, k$ , ( $1 \leq i < j < k \leq n$ ), el triangle  $A_i A_j A_k$  té àrea igual a  $r_i + r_j + r_k$ .

## Problemes diversos

*Solució.*

Notació: Designarem l'àrea del triangle  $A_i A_j A_k$  per

$$[ijk] = [A_i A_j A_k],$$

i anàlogament per a d'altres polígons.

Vegem que el problema té solució per a  $n = 4$ ; basta considerar el quadrat unitat  $A_1 A_2 A_3 A_4$ , prenent  $r_i = 1/6$  per a tot  $i$ ,  $1 \leq i \leq 4$ .

Més generalment, per quatre punts qualssevol sempre es poden trobar  $r_i$  convenients, per tal com el sistema d'equacions

$$\begin{cases} r_1 + r_2 + r_3 = a \\ r_2 + r_3 + r_4 = b \\ r_1 + r_3 + r_4 = c \\ r_1 + r_2 + r_4 = d \end{cases}$$

sempre té solució única:

$$r_1 = \frac{a - 2b + c + d}{3}$$

$$r_2 = \frac{a + b - 2c + d}{3}$$

$$r_3 = \frac{a + b + c - 2d}{3}$$

$$r_4 = \frac{-2a + b + c + d}{3}.$$

(Això es més del que demanava el problema; un altre exemple per  $n = 4$  s'obté agafant com a  $A_4$  el centre de gravetat del triangle  $A_1 A_2 A_3$  i elegint  $r_1 = r_2 = r_3 = -r_4 = 1/3$ .)

Demostrem que no hi ha solució per a  $n = 5$  la qual cosa implicarà que ja no n'hi ha per a  $n \geq 5$ .

Comencem amb les següents observacions:

*Observació 1.* Si  $A_i A_j A_k A_h$  es un quadrilàter convex, aleshores

$$r_i + r_k = r_j + r_h.$$

La demostració surt d'observar

$$[ijk] + [khi] = [A_i A_j A_k A_h] = [jkh] + [hij], \text{ és a dir}$$

$$2r_i + r_j + 2r_k + r_h = r_i + 2r_j + r_k + 2r_h.$$



Observació 2. Els nombres  $r_i$  han de ser tots diferents.

En efecte, suposem per exemple que  $r_4 = r_5$ . Al menys dos dels punts  $A_1, A_2, A_3$  estaran al mateix costat de la recta  $A_4A_5$ ; suposem que són  $A_1$  i  $A_2$ . Ja que  $r_4 = r_5$ , ha de ser  $[124] = [125]$ , cosa que implica que  $A_4A_5$  és paral·lela a  $A_1A_2$ . Hi ha dos casos a considerar:

a)  $A_3$  és al mateix costat de  $A_4A_5$  que  $A_1$  i  $A_2$ .

El mateix argument d'abans ens diu que  $A_2A_3$  és paral·lel a  $A_4A_5$ . Però aleshores  $A_2A_3$  és paral·lel a  $A_1A_2$ , cosa que és impossible perquè  $A_1, A_2$  i  $A_3$  no estan alineats.


b)  $A_3$  és al costat oposat de  $A_1$  i  $A_2$  respecte de  $A_4A_5$ .

Llavors, com que  $A_1A_2$  és paral·lel a  $A_4A_5$ , tenim que  $[145] = [245]$ , i  $r_1 = r_2$ . Tornem a començar la demostració amb els subíndexs 4 i 5 en lloc de 1 i 2. Aquesta vegada sabem que s'aplicarà el cas a), ja que els punts  $A_3, A_4$  i  $A_5$  estan al mateix costat de  $A_1A_2$ .

Així doncs, tots els  $r_i$  han de ser diferents.

Tornem al problema principal. Considerem l'envolvent convexa dels 5 punts  $A_i$ . Poden presentar-se tres situacions:

I) L'envolvent convexa es un pentàgon  $A_1, \dots, A_5$ .




Els quadrilàters  $A_1A_2A_3A_4$  i  $A_1A_2A_3A_5$  són convexos; per l'observació 1 tenim

$$r_1 + r_3 = r_2 + r_4 \quad \text{i} \quad r_1 + r_3 = r_2 + r_5$$

i per tant ha de ser  $r_4 = r_5$ , impossible per l'observació 2.


Problemes diversos

II) L'envolvent convexa és un quadrilàter  $A_1A_2A_3A_4$ .



Podem suposar que  $A_5$  és a l'interior de  $A_3A_4A_1$ . Aleshores  $A_1A_2A_3A_5$  és un quadrilàter convex i es té la mateixa contradicció d'abans.

III) L'envolvent convexa és un triangle  $A_1A_2A_3$ .



A causa de  $[124] + [234] + [314] = [A_1A_2A_3] = [125] + [235] + [315]$ , tenim  $r_4 = r_5$ , en contra de l'observació 2.


Una de les desigualtats geomètriques més difícils de la IMO va ser proposada per Armènia a l'Olimpiada de 1996 celebrada a Bombay. (Vegeu la observació 2 del final).

**Problema 9.** (Original de Nairi M. Sedrakian). Sigui  $ABCDEF$  un hexàgon convex tal que  $AB$  és paral·lel a  $ED$ ,  $BC$  és paral·lel a  $FE$  i  $CD$  és paral·lel a  $AF$ . Siguin  $R_A, R_C, R_E$  els radis de les circumferències circumscrites als triangles  $FAB$ ,  $BCD$  i  $DEF$ , respectivament; i sigui  $p$  el perímetre de l'hexàgon. Demostreu que

$$R_A + R_E + R_C \geq \frac{p}{2}.$$

*Solució (oficial).* Siguin  $a, b, c, d, e, f$  les longituds de  $AB, BC, CD, DE, EF$  i  $FA$ ,

respectivament. Observeu que els angles oposats del hexàgon són iguals  $\widehat{A} = \widehat{D}$ ,  $\widehat{B} = \widehat{E}$ ,  $\widehat{C} = \widehat{F}$ ). Des de  $A$  i  $D$  es tracen perpendiculars a les rectes  $BC$  i  $EF$  (vegeu la figura)



Es compleixen les relacions

$$KH = AB \sin B + AF \sin F$$

$$LN = DC \sin C + DE \sin E$$

que, mitjançant la igualtat d'angles oposats a l'hexàgon, es converteixen en

$$KH = AB \sin B + AF \sin C$$

$$LN = DC \sin C + DE \sin B.$$

La distància  $KH = LN$  és la distància entre les rectes  $BC$  i  $EF$ , i per tant

$$BF \geq KH = LN,$$

d'on

$$2BF \geq KH + LN = AB \sin B + AF \sin C + DC \sin C + DE \sin B.$$

El teorema dels sinus aplicat a  $ABF$  dona  $BF = 2R_A \sin A$ , d'on surt

$$4R_A \sin A = 2BF \geq AB \sin B + AF \sin C + DC \sin C + DE \sin B$$

i, anàlogament

$$4R_C \sin C = 2BD \geq FA \sin A + FE \sin B + CB \sin B + CD \sin A$$

$$4R_E \sin B = 2DF \geq BC \sin C + BA \sin A + ED \sin A + EF \sin C$$

### Problemes diversos

Dividint aquestes desigualtats respectivament per  $\sin A$ ,  $\sin B$ ,  $\sin C$  i sumant, s'obté

$$4(R_A + R_C + R_E) \geq DC \left( \frac{\sin C}{\sin A} + \frac{\sin A}{\sin C} \right) + CB \left( \frac{\sin B}{\sin C} + \frac{\sin C}{\sin B} \right) +$$

$$+ BA \left( \frac{\sin B}{\sin A} + \frac{\sin A}{\sin B} \right) + AF \left( \frac{\sin C}{\sin A} + \frac{\sin A}{\sin C} \right) +$$

$$+ FE \left( \frac{\sin B}{\sin C} + \frac{\sin C}{\sin B} \right) + ED \left( \frac{\sin B}{\sin A} + \frac{\sin A}{\sin B} \right),$$

i ja l'únic que falta per a obtenir el resultat és utilitzar la desigualtat (ben coneguda)  $x/y + y/x \geq 2$ , ja que resulta

$$4(R_A + R_C + R_E) \geq 2p \iff R_A + R_C + R_E \geq \frac{p}{2}.$$

*Observació 1.* Sedrakian ha publicat a *Mathematics Competitions*, vol. 9, núm. 2, 1996, un article titulat *The Story of creation of a 1996 IMO problem*, en el qual explica el procés d'obtenció del problema.

*Observació 2.* Aquest problema va ser el més difícil de la IMO de Bombay; només el van resoldre 6 concursants: dos romanesos i 4 armenis (!!). Els sis concursants xinesos hi van obtenir zero punts.

En una ocasió, un problema proposat per Espanya va estar a prop de resultar elegit a la IMO. Va ser el 1993; el comitè seleccionador de problemes l'havia senyalat amb \*\*\*\*\* (molt difícil) i amb !! (altament recomanat), ja que no s'havia pogut trobar cap solució diferent de la proposada bastant llarga, per cert; com que és meua, ningú no s'ofendrà per aquest comentari). Però el Cap de la Delegació d'Holanda, Johannes Notemboom, va trobar la següent, molt més curta i elegant.

**Problema 10.** Al triangle  $ABC$ , siguin  $D$ ,  $E$  punts del costat  $BC$  tals que  $\widehat{BAD} = \widehat{CAE}$ . Si  $M$ ,  $N$  són, respectivament, els punts de tangència amb  $BC$  dels cercles inscrits a  $ABD$  i  $ACE$ , proveu que

$$\frac{1}{MB} + \frac{1}{MD} = \frac{1}{NC} + \frac{1}{NE}.$$

*Solució.* Reformularem el problema en els següents termes: Donat el triangle  $ABC$ , amb  $\hat{A}$  constant i  $h_a$  constant, si el cercle inscrit es tangent a  $BC$  a  $M$ , demostreu que

$$\frac{1}{BM} + \frac{1}{CM}$$

es constant.

En efecte, si indiquem per  $p$  el semiperímetre del triangle  $ABC$ , tenim les igualtats

$$\begin{aligned}
 (*) \quad \frac{1}{BM} + \frac{1}{CN} &= \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} = \frac{a}{(p-b)(p-c)} \\
 &= \frac{4a}{(a+b-c)(a-b+c)} = \frac{4a}{a^2 - (b-c)^2} \\
 &= \frac{4a}{2bc(1 - \cos A)}
 \end{aligned}$$

Però

$$ah_a = bc \sin A = 2S \iff \frac{a}{bc} = \frac{\sin A}{h_a},$$

així que si ho portem a (\*) resulta

$$\frac{1}{BM} + \frac{1}{CN} = \frac{2 \sin A}{h_a(1 - \cos A)},$$

que és constant perquè  $A$  i  $h_a$  ho són.

El següent exemple va ser un problema molt bonic proposat el 1997 a Mar del Plata (no en tinc referència del país d'origen). Les tres solucions presentades al Jurat eren molt llargues i bastant complicades. El representant hindú, Shailesh Shirali, va obtenir una solució molt curta, però usava coordenades trilineals (proporcionals a les distàncies d'un punt als costats del triangle de referència), un instrument poc conegut, però que transforma difícils problemes de colinealitat en exercicis d'anul·lació de determinants. No va agradar gaire a la concurrència, com, aparentment, tampoc la solució que jo mateix vaig trobar, i que presento a continuació:

**Problema 11.** En el triangle acutangle  $ABC$ ,  $AD$  i  $BE$  són altures, i  $AP$ ,  $BQ$  bisectrius interiors. Si  $I$ ,  $O$  són, respectivament, l'incentre i el circumcentre de  $ABC$ , demostreu que  $D$ ,  $E$ ,  $I$  estan alineats si i només si  $P$ ,  $Q$ ,  $O$  estan alineats.


*Solució.* Com que  $AD$  i  $BE$  són altures,

$$(1) \quad \frac{BD}{DC} = \frac{c \cos B}{b \cos C}; \quad \frac{AE}{EC} = \frac{c \cos A}{a \cos C}$$

Com que  $AP$  i  $BQ$  són bisectrius interiors,

$$(2) \quad \frac{BP}{PC} = \frac{c}{b}; \quad \frac{AQ}{QC} = \frac{c}{a}.$$

Problemes diversos



D'altra banda, la condició necessària i suficient per tal que la transversal  $EF$  passi per l'incentre  $I$  de  $ABC$  és

$$(3) \quad \frac{EA}{EC} a + \frac{DB}{DC} b = c;$$

i la condició necessària i suficient per tal que la transversal  $PQ$  passi pel circumcentre  $O$  del triangle acutangle  $ABC$  és

$$(4) \quad \frac{QA}{QC} \sin 2A + \frac{PB}{PC} \sin 2B = \sin 2C.$$

Substituint (2) a (3) i (1) a (4) s'obté, respectivament,

$$(3) \iff \frac{\cos A}{\cos C} + \frac{\cos B}{\cos C} = 1$$

$$(4) \iff (\text{usant el teorema del sinus}) \frac{\sin C \sin A \cos A}{\sin A \sin C \cos C} + \frac{\sin C \sin B \cos B}{\sin B \sin C \cos C} = 1$$


que són clarament equivalents.

Nota: (3) i (4) són casos particulars de l'anomenat teorema de la transversal, o teorema de Cristea (1953); per a un tractament d'aquest teorema, vegeu [2].

El nostre darrer exemple de geometria plana és el problema proposat per l'Índia el 1992, però que no fou elegit. Quan fou rebutjat, la representant de Colòmbia comentà: "S'ha eliminat el més bell problema de tota aquesta Olimpíada". Hi estic d'acord.

**Problema 12.** Les circumferències  $G, G_1, G_2$  estan relacionades de la següent manera:  $G_1$  i  $G_2$  són tangents exteriors en el punt  $W$ ; totes dues són, además, tangents interiors a  $G$ . Els punts  $A, B$  i  $C$  de la circumferència  $G$  es determinen de la següent forma:  $BC$  és la tangent exterior comuna a  $G_1$  i  $G_2$ ; i  $WA$  és la tangent comuna interior a  $G_1$  i  $G_2$ , de manera que  $W$  i  $A$  estan en un mateix costat de la recta  $BC$ .

Demostreu que  $W$  és l'incentre de  $ABC$ .



$$\begin{aligned} BE &= x \\ ED &= \beta - x \\ DF &= \gamma - x \\ FC &= y \\ AD &= d \end{aligned}$$

*Solució (oficial).* Sigui  $D$  el punt de tall de  $WA$  amb  $BC$  i siguin  $E, F$  els punts on  $G_1$  i  $G_2$  són tangents a  $BC$ . Definim les longituds  $x, y, \beta, \gamma, d$ , així:

$$x = BE, y = CF, \beta = BD, \gamma = CD, d = AD;$$

aleshores es té

$$DE = \beta - x, \quad DF = \gamma - y$$

i donat que  $DE = DW = DF$ , és  $\beta - x = \gamma - y$ . Además,  $AW = d - \beta + x = d - \gamma + y$ .

Considerarem el sistema de 4 circumferències:

de centre  $A$  i radi 0;

$G_1$ ;

de centre  $B$  i radi 0;

de centre  $C$  i radi 0.

Aquests quatre cercles són tangents a  $G$ ; els considerarem interiors i aplicarem el teorema generalitzat de Ptolomeu (o de Casey) entre les longituds de les tangents comunes exteriors,

### Problemes diversos

que són :

$$\text{entre } (A, 0) \text{ i } G_1 : d - \beta + x$$

$$\text{entre } (A, 0) \text{ i } (B, 0) : c$$

$$\text{entre } (A, 0) \text{ i } (C, 0) : b$$

$$\text{entre } G_1 \text{ i } (B, 0) : x$$

$$\text{entre } G_1 \text{ i } (C, 0) : a - x$$

$$\text{entre } (B, 0) \text{ i } (C, 0) : a.$$

per tant, segons la relació de Ptolomeu,

$$(d - \beta + x)a + bx = c(a - x),$$

que es pot escriure, amb l'habitual notació  $2p = a + b + c$ ,

$$(1) \quad x = \frac{a}{2p}(\beta + c - d).$$

De manera anàloga, considerant  $G_2$  i els tres cercles degenerats anteriors, s'arriba a

$$(2) \quad y = \frac{a}{2p}(\gamma + b - d)$$

Com que  $DE = DW = DF$ , usant (1) i (2), podem escriure

$$\beta - \frac{a}{2p}(\beta + c - d) = \gamma - \frac{a}{2p}(\gamma + b - d),$$

o bé

$$(b + c)\beta - ac = (b + c)\gamma - ab \iff (b + c)(\beta - \gamma) = a(c - b).$$

Com que  $\beta + \gamma = a$ , aquesta última expressió dóna

$$(b + c)(\beta - \gamma) = (\beta + \gamma)(c - b),$$

que se simplifica fins a arribar a

$$c\gamma = \beta b \iff \frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} \iff AD \text{ bisectriu de } \widehat{BAC}.$$

Per a completar la solució del problema hem de provar que  $BW$  és una altra bisectriu; ho farem en el triangle  $ABD$  perquè  $AD$  és tangent a  $G_1$  i  $G_2$  i així no cal buscar expressions per als segments determinats per  $BW$  sobre  $CA$ .



Pel teorema de la bisectriu,

$$\beta = \frac{ac}{b+c}; \quad \gamma = \frac{ab}{b+c},$$

d'on

$$\beta - x = \frac{ad}{2p};$$

i per tant,

$$\frac{d}{\beta - x} = \frac{2p}{a} = \frac{a+b+c}{a},$$

i aleshores

$$\begin{aligned} \frac{AW}{DW} &= \frac{AD}{DW} - 1 = \frac{d}{\beta - x} - 1 = \frac{a+b+c}{a} - 1 \\ &= \frac{b+c}{a} = \frac{c}{\frac{ac}{b+c}} = \frac{BA}{BD} \iff BW \text{ bisectriu de } \widehat{ABC} \end{aligned}$$

La solució és completa.

Com a últim problema d'aquesta selecció, n'inclòiem un de Geometria de l'espai amb desigualtats i matemàtica discreta, una combinació que va resultar "explosiva" per a molts participants a la IMO de 1992 a Moscou, on va ser presentat per Itàlia.

**Problema 13.** Sigui  $S$  un conjunt finit de punts en l'espai tridimensional, amb el sistema de coordenades cartesianes. Siguin  $S_x$ ,  $S_y$ ,  $S_z$  els conjunts formats per les projeccions ortogonals dels punts de  $S$  sobre els plans  $yz$ ,  $zx$ ,  $xy$ , respectivament.

Demostreu que  $|S_x| \cdot |S_y| \cdot |S_z| \geq |S|^2$ , on  $|A|$  representa el nombre d'elements del conjunt finit  $A$ .

*Solució (oficial).* Posem  $a = |S_x|$ ,  $b = |S_y|$ ,  $c = |S_z|$ . Utilitzarem la inducció sobre  $|S|$ . Si el conjunt té un únic punt, la proposició és veritat:  $1 \times 1 \times 1 \geq 1^2$ .

Suposem que la proposició és certa per a  $|S| < N$ .

Considerem un conjunt  $S$  tal que  $|S| = N$ .

És clar que existeix un pla paral·lel a un dels plans de coordenades, que no conté punts de  $S$  i que divideix  $S$  en dos subconjunts no buits,  $S_1$ ,  $S_2$ , de manera que

$$N = |S_1| + |S_2|, \quad |S_1| < N, \quad |S_2| < N.$$

per la hipòtesi d'inducció, se compleixen les desigualtats

$$a_1 b_1 c_1 \geq |S_1|^2, \quad a_2 b_2 c_2 \geq |S_2|^2.$$

### Problemes diversos

Podem suposar, sense perdre generalitat, que el pla divisor es paral·lel al pla  $xy$ . Aleshores

$$a_1 + a_2 = a, \quad b_1 + b_2 = b, \quad c \geq c_1, \quad c \geq c_2.$$

Per la desigualtat de Cauchy-Schwarz,

$$\begin{aligned} abc &= c(a_1 + a_2)(b_1 + b_2) \geq \\ &\geq c\left(\sqrt{a_1 b_1} + \sqrt{a_2 b_2}\right)^2 = \\ &= \left(\sqrt{a_1 b_1} \sqrt{c} + \sqrt{a_2 b_2} \sqrt{c}\right)^2 \geq \\ &\geq \left(\sqrt{a_1 b_1 c_1} + \sqrt{a_2 b_2 c_2}\right)^2 \geq \\ &\geq (|S_1| + |S_2|)^2 = |S|^2, \end{aligned}$$

i hem acabat.

### BIBLIOGRAFIA

- [1] BELLOT, F. i LÓPEZ, M. A., *Cien problemas de Matemáticas: Combinatoria, Álgebra, Geometría*. ICE de la U. de Valladolid, 1994.
- [2] BELLOT, F., *El teorema de las transversales y algunas consecuencias*; SIPROMA, núm. 1, juny 1997. O.E.I.

Resum de bibliografia anglesa

- COFMAN, JUDITA, *What to solve?*, Claredon Press-Oxford, 1990.
- KLAMKIN, M. S., *USA Mathematical Olympiads 1972-1986*, Math. Ass. of Amer., 1988
- KLAMKIN, M. S., *International Mathematical Olympiads 1959-1977*, Math. Ass. of Amer., 1978
- KLAMKIN, M. S., *International Mathematical Olympiads 1978-1985*, Math. Ass. of Amer., 1986
- BIGGS, N. L., *Discrete Mathematics*, Oxford University Press, 1989.
- ROBERTS, F. S., *Applied Combinatorics*, Prentice-Hall, 1984.
- COXETER, H. S. M. i GREITZER, S. L., *Geometry revisited*, The Mathematical Association of America.
- EVES, H., *A survey of geometry*, Allyn and Bacon.
- LARSON, L. C., *Problem-solving through problems*, Springer-Verlag.

Resum de bibliografia castellana

- BELLOT, F., DEBAN, M. V. i LÓPEZ, F., *Olimpiada Matemática Española*, I.C.E., Univ. de Valladolid, 1992
- BELLOT, F. i LÓPEZ CHAMORRO, M. A., *Cien problemas de matemáticas*, I.C.E., Univ. de Valladolid, 1994
- Col·lecció *La Tortuga de Aquiles*, DLS-Editores, Madrid (traduccions dels llibres de la Math. Ass. of America).
- GRIMALDI, R. P., *Matemática Discreta y Combinatoria*, Addison-Wesley Iberoamericana, 1989.
- COXETER, H. S. M., *Fundamentos de Geometría*. Limusa.
- FAURING P. et al., *10 Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas*. Publicaciones de la Organización de Estados Iberoamericanos, 1997.
- PUIG ADAM, P., *Curso de Geometría métrica* (Tomo I - Fundamentos). Gómez Puig Ediciones.

Resum de bibliografia catalana

- 1r FORUM de problemes 93/94, Societat Catalana de Matemàtiques, Institut d'Estudis Catalans.
- 2n FORUM de problemes 94/95, Societat Catalana de Matemàtiques, Institut d'Estudis Catalans.



# ÍNDIX DE GUANYADORS

## A

Abenaza Campodarbe, Rafael; 12C  
Acero Sistach, Lluís; 34C, **FOTO**  
Acuarón Joven, Juan; 21E  
Aguado Martínez, Manuel M.; 28E  
Albiol López, Rubén; 30C, **FOTO**  
Alcázar Moreno, Jesús; 11E, **FOTO**  
Alegre de Miguel, Ignacio; 7C, 7E, **FOTO**  
Alemany Flos, Joan; 36C, **FOTO**  
Aliaga Varea, Ramón José; 34E, 35E, **FOTO**  
Álvarez Royo-Villanova, Pablo; 17E, **FOTO**  
Amorós Torrent, Jaume; 22C, 22E  
Andreu Darrera, Xavier; 17C  
Andreu Pascual, Jaume; 31E  
Ansorena Barasoain, José Luis; 21E  
Aparisi Botella, Miguel; 20E  
Arenas García, Jerónimo; 30E, 31E  
Arregui García, Javier; 26E  
Arso Civil, David; 30C, **FOTO**  
Atienza Riera, José Miguel; 28E

## B

Baeza Oliva, Tomás; 30E  
Ballbé García, Andrés; 6C  
Barberá Sánchez, Salvador; 1C  
Barbero González, Fernando; 17E, **FOTO**  
Barcelona Mas, Simón; 7C  
Barco Moreno, Raquel; 28E  
Barenys García, Óscar; 35C, **FOTO**  
Barreiro Blas, Antonio; 13E, **FOTO**  
Bartolomé Mana, Boris; 24C, 24E  
Begué Aguado, Álvaro; 28E, 29E  
Benítez Giménez, Pablo; 23E  
Bermúdez Carro, Miguel A.; 30E  
Bernstein Obiols, Max; 32C, 33C, 33E, **FOTO**  
Bonet Solves, José; 9E, **FOTO**  
Bosch Llovet, Magí; 17C  
Brandt Sanz, Miguel; 20E  
Bravo de Mansilla Jiménez, Alberto; 27E  
Bresson Carvallo, Roman; 23C  
Burillo Puig, Josep; 19C, 19E  
Bustos Puche, Jorge; 6E, **FOTO**

## C

Caballero Guerrero, Javier; 18E  
Cabello Justo, Sergio; 31C, **FOTO**  
Calbet Rebollo, Francisco; 2C  
Calsina Ballesta, Àngel; 11C  
Campins Pascual, Javier; 24C, 24E  
Campins Pascual, Jordi; 24C  
Canela Campos, Miguel; 8C  
Cantarero López, José M.; 36E, **FOTO**  
Carmona Doménech, Juan J.; 10C

Carrillo Gallego, Dolores; 6E, **FOTO**  
Carrión Álvarez, Miguel; 29E  
Carrión Rodríguez de Guzmán, Pedro; 16E, **FOTO**  
Casacuberta Vergés, Carles; 15C, 15E, **FOTO**  
Casaña Barle, Antonio; 3C  
Casas Pla, Jordi; 25C  
Casdal Casas, Jorge; 3C  
Castaño Gracia, Miguel; 10E, **FOTO**  
Castell Burgaleta, David; 29E  
Castrillón López, Marco; 26E  
Catalina Gallego, Miguel; 30E  
Colet Rafecas, Pere; 18C  
Coll Francés, Roberto; 26C  
Company Ferrer, Vicente; 21C  
Conde Font, Miguel; 4C  
Conejero Cárcels, Antoni; 34C, **FOTO**  
Corella Monzón, Francisco J.; 7E, **FOTO**  
Corella Monzón, M. Isabel; 8E, **FOTO**  
Costa Cuadrench, Alfonso; 1C  
Cuco Pardillos, Federico; 12E, **FOTO**  
Cuenca González, Juan; 22E

## D

De Mier Vinué, Anna; 31C, **FOTO**  
Díez Vegas, Francisco J.; 19E  
Doménech Plana, Jaime; 14C  
Domingo Magaña, José Ramón; 30C, **FOTO**  
Doumenç, Thomas; 31C, **FOTO**  
Draper Fontanales, Cristina; 25E  
Durántez Gamzuko, Marcos; 27E

## E

Elduque Palomo, Alberto; 14E, **FOTO**  
Elías García, Joan; 11C  
Elizalde Torrent, Sergi; 32C, 32E, **FOTO**  
Espel Llima, Roger; 27C, 27E  
Esteban Romero, Ramón; 24E  
Esteve Comas, Jorge; 10C  
Etayo Gordejuela, Fernando; 17E, **FOTO**

## F

Fabiani Bendicho, Luis; 31E  
Falivene Raboso, Julio; 4C, 4E, **FOTO**  
Faus Tomás, Àngel; 34C, **FOTO**  
Fernández Galván, Ignacio; 31E  
Fernández Sánchez-Reyes, Luis M.; 13C  
Fraile Pérez, Arturo; 4C, 4E, **FOTO**  
Francés Tortosa, Vicente; 8E, **FOTO**  
Frau Picó, Enrique; 10C, 10E, **FOTO**  
Frigola Sala, Joaquim; 8C

## G

Gabàs Masip, Joel; 32C, **FOTO**  
 Galve Mauricio, Fernando; 23E  
 Gamella Bacete, Manuel; 3E, **FOTO**  
 García Fernández, Antonio; 10E, **FOTO**  
 García Gil, Alejandro; 31E  
 García López, Enrique; 25C, 25E  
 García Martínez, Alberto; 25E  
 García Martínez, Luis Emilio; 36E, **FOTO**  
 García Parrilla, Andrés; 20E  
 García Roig, Jaume Lluís; 6C, 6E, **FOTO**  
 Garijo Amilburo, Ignacio; 21E  
 Garrido Arribas, Alberto; 22E  
 Gassó Minguet, Francesc; 30C, **FOTO**  
 Gelonch Anyé, Josep; 9C, 9E, **FOTO**  
 Génova Fuster, Gonzalo; 20E  
 Gil Martínez, José M.; 8E, **FOTO**  
 Giner Bosch, Vicente; 28E  
 Gomà Nasarre, Antoni; 3C  
 Gómez Amigo, Antonio; 21E  
 Gómez Rodríguez, Carlos; 36E, **FOTO**  
 González Cobas, Juan David; 22E  
 González Pellicer, Edgar; 34C, 35C, **FOTO**  
 Gordillo Arias de Saavedra, José M.; 26E  
 Gracia Saz, Alfonso; 30E  
 Gratal Martínez, Xavier; 33C, 34C, **FOTO**  
 Güeto de la Rosa, Edgar; 32C, **FOTO**  
 Guinjoan Francisco, Marc; 29C, **FOTO**  
 Gutiérrez Serrés, Pere; 18C

## H

Haro Provinciale, Àlex; 3C  
 Hernández, Bruno; 23C  
 Hernández García, Francisco; 28C  
 Herrador Barrios, José F.; 26E  
 Herrero Buj, Fernando; 6C  
 Herrero Izquierdo, Alberto; 25C

## J

Jara de las Heras, Antonio; 32E  
 Jiménez Figuera, Josep M.; 17C

## L

Lago Esteban, Alejandro; 27C  
 Lasoosa Medarde, Daniel; 26E  
 Lesaffre, Fabrice; 36C, **FOTO**  
 Lesaffre, Stephan; 36C, **FOTO**  
 Llerena Achutegui, Agustín; 12E, **FOTO**  
 Llopart Miquel, Fèlix; 35C, **FOTO**  
 Llorens Tubau, Antonio; 14C  
 Llorente Saguer, Aniol; 34C, **FOTO**

Lobo López, Miguel; 33E  
 López Blázquez, José Fernando; 16E, **FOTO**  
 López Melero, Bernardo; 4E, **FOTO**  
 Lucio Fernández, Carlos A.; 5E, **FOTO**

## M

Mallafre Torra, Josep R.; 21C  
 Manrique Catalán, Santiago; 5C  
 Marañón Mora, José; 19E  
 Marcos Primo, Ignacio; 27E  
 Marín Muñoz, Leandro; 25E  
 Marquès Solé, Daniel; 29C, **FOTO**  
 Martín Álvarez, Raúl; 32C, **FOTO**  
 Martín Clavo, David; 34E  
 Martín Martínez, Domènec; 35C, **FOTO**  
 Martínez Palau, Xavier; 36C, **FOTO**  
 Martínez Puente, Fernando; 24E  
 Martínez de Albéniz Margalef, Marc; 34C, **FOTO**  
 Martínez de Albéniz Margalef, Víctor; 32C, 32E, **FOTO**  
 Mas Trullenque, Jorge; 15C, 15E, **FOTO**  
 Masip Treig, Ramon; 12C  
 Menal Ferrer, Pere; 35C, **FOTO**  
 Méndez Rutllán, Andrés; 2E, **FOTO**  
 Milián Masana, Antonio; 8C  
 Miranda Palacios, Eugenio J.; 1E, **FOTO**  
 Molera Vidal, Joaquim; 35C, **FOTO**  
 Mondelo González, José M.; 28C  
 Montes García, Mario Andrés; 33E, 34E  
 Montornés Ferret, Gerard; 26C  
 Mora Portela, Darío; 35C, **FOTO**  
 Moral Callejón, Serafín; 13E, **FOTO**  
 Moriyón Salomón, Roberto; 5C, 5E, **FOTO**  
 Múgica de Ribera, Javier; 35E, **FOTO**  
 Mundet Riera, Ignasi; 27C, 27E  
 Muñoz Velázquez, Vicente; 25E

## N

Narváez Macarro, Luis; 11E, **FOTO**  
 Navarro Tobar, Álvaro; 35E, **FOTO**  
 Nieves Espuelas, Jesús; 15E, **FOTO**  
 Nogueira Coriba, José Ignacio; 24E  
 Novaes Ledieu, Pablo; 20E

## O

Ogando Serrano, Francisco; 26E  
 Oliu Barton, Miquel; 36C, **FOTO**  
 Oliva Cuyàs, Antoni; 1C, 1E, **FOTO**  
 Ortega Cerdà, Joaquim; 22C, 22E

## P

Palacios Gutiérrez, Tomás; 32E  
Palma Molina, Francisco J.; 14E, **FOTO**  
Paredes Galán, Ángel; 31E  
Parra Kaiser, Mario; 30C, **FOTO**  
Pe Pereira, María; 34E  
Peña Gamarra, José; 14E, **FOTO**  
Pérez Giménez, Xavier; 33C, 33E, **FOTO**  
Pérez Jiménez, Carlos J.; 23E  
Pérez Marco, Ricardo; 21C, 21E  
Pérez Molina, Manuel; 36E, **FOTO**  
Pérez-Cacho Fernando-Argüelles, Santiago; 24E  
Portela Lemos, Javier; 25E  
Pozo Tortosa, Diego; 32C, **FOTO**  
Puig Espinosa, Luis; 2E, **FOTO**  
Puig Sadurní, Joaquim; 31C, **FOTO**

## Q

Querol Bravo, José I.; 9E, **FOTO**

## R

Rambla Blanco, Fernando; 32E  
Ras Sabidó, Antoni; 13C  
Rebull Camarasa, Ramon; 22C  
Reguera López, Ana José; 21E  
Revilla Domingo, Ferran; 31C, **FOTO**  
Revilla Domingo, Roger; 29C, **FOTO**  
Ribón Herguedas, Javier; 28E  
Rius Pascual, Jordi; 36C, **FOTO**  
Rodríguez Belmar, Andrés; 18C  
Rodríguez Bono, Enrique; 7E, **FOTO**  
Rodríguez de la Cruz, Antonio J.; 13E, **FOTO**  
Rojas León, Antonio; 29E  
Román Jiménez, José A.; 14C  
Rozas Rodríguez, Guillermo; 16E, **FOTO**  
Rubio de Francia, José Luis; 3E, **FOTO**  
Rubio Núñez, Roberto; 36E, **FOTO**  
Rué Perna, Juanjo; 36C, **FOTO**

## S

Sánchez Esguevillas, Antonio; 29E  
Sánchez Lacuesta, José; 18E  
Sánchez Royo, Carmen; 15C  
Sancho Bejarano, Néstor; 35E, **FOTO**  
Santallúcia Esbert, Xavier; 19C  
Sanz Merino, Beatriz; 34E  
Sebastián Celorrio, Patricia; 32E  
Segura Vélez, Anatoli; 33E  
Selva Gomis, Roberto; 19E  
Sevilla González, David; 29E, 30E  
Simonetta, Patrik; 18E

Solé Subiela, Josep Oriol; 2C  
Solares Girón, Ángel; 26C  
Suárez Real, Alberto; 36E, **FOTO**  
Sueiro Bal, Juan M.; 11C, 11E, **FOTO**

## T

Tallos Tanarro, Andrés; 35E, **FOTO**  
Tarafa Mate, Lluís; 32C, **FOTO**  
Tejera Gómez, Agustín Rafael; 20E  
Tiñena Salvañá, Francesc; 13C  
Torre Rodríguez, Alberto de la; 1E, **FOTO**  
Torrego Solana, José Manuel; 30C, **FOTO**  
Trepal Sorribes, Alberto; 7C  
Turull Crexells, Alejandro; 9C

## U

Ueno Jacue, Carlos; 22E  
Uriarte Tuero, Ignacio; 27E  
Uzábal Amores, Enrique; 12E, **FOTO**

## V

Vado Vázquez, Emilio; 9C  
Valderrama Alcalde, Juan R.; 23E  
Vallejo Gutiérrez, Enrique; 35E, **FOTO**  
Vallés Brau, José Lorenzo; 12C  
Vázquez Rodríguez, Antonio; 3E  
Vila Doncel, Santiago; 23E  
Viladesau Franquesa, Eduard; 34C, **FOTO**  
Villate Bejarano, Joseba; 33E  
Villegas Barranco, Salvador; 23E  
Vinuesa del Río, Jaime; 34E  
Vinuesa Tejedor, Jaime; 2E, **FOTO**  
Vinyes Raso, Marc; 35C, **FOTO**  
Vives Arumí, Francisco J.; 5C, 5E, **FOTO**

## W

Welters Dyhdalewicz, Gerald; 2C







