

NÒTULES FLORÍSTIQUES

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. A Montserrat ha estat citada per molts botànics a Sant Jeroni: Turó del Moro. Recentment PANAREDA, NUET i ROSELL (1981) han trobat la boixerola prop d'aquesta localitat: Montgròs, 1110 m i a l'Aubarda Castellana, 1140 m. Nosaltres l'hem trobada prop del Camell dels Ecos, més amunt de la Font del Llum, 1050 m aproximadament, freqüent al W i més escàs i dispers al S (DG 0006).

Jasonia glutinosa (L.) DC. Serra de l'Obac, al camí de La Porquerissa, al SE de la cova, 760 m, exposició S-SW. CADEVALL (in BOLÒS, 1950) va trobar aquesta espècie a la Torrota de l'Obac.

FRANCESC VILANOVA i TUÀ — Castellbell i El Vilar, Barri Burés, n° 20, 4, 4ª

BIBLIOGRAFIA

BOLÒS, A. de i BOLÒS O. de 1950. *Vegetación de las comarcas barcelonesas*. Instituto Español de Estudios Mediterráneos. Barcelona.

FONT QUER, P. 1914. *Ensayo Fitotopográfico de Bages*. Mahón.

MARCET, A. p. 1948-1954. Flora montserratina. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)* 46.51.

PANAREDA, J.M., NUET, J. i ROSELL, A. 1981. Notes sobre la flora de la terra baixa catalana. *Coll. Bot.* XII: 147-152.