

PRIMERA OBSERVACIÓ DE POLIT CANTAIRE (*NUMENIUS PHAEOPUS*) A LA COMARCA DEL BAGES

El passat 4 d'Abril de 1981 vam observar al capvespre un Polit cantaire, el qual passà volant molt baix sobre la riba dreta del Llobregat, podent observar molt bé i amb tot detalls les seves principals característiques (especialment la franja fosca al cap i el bec torçat cap avall) a les proximitats de Sallent. Segons BORRÀS (1980), l'espècie no s'havia citat mai al Bages. Possiblement aquest exemplar passà la nit pels contorns, puix que l'endemà s'observà un exemplar també de Polit cantaire al mateix indret, posat al riu (R. Solà, com. per.)

BERNAT SOLER

NIDIFICACIÓ DEL BALLESTER (*APUS MELBA*) EN EDIFICACIONS HUMANES AL BAGES

La predilecció del Ballester per edificis i ponts per tal d'instal·lar-hi el niu és un fenomen ben constatat a Marroc, Suïssa i també a la Península Ibèrica (Extremadura i la Rioja). A Catalunya MESTRE (1978, *Ardeola* 24) donà algunes referències del Vallès. Independentment, Angel Vidal (com. per.), el controlà també a Terrassa, un mínim de dos anys (1977 i 78), niant en edificis col·lidants al seu propi domicili, enmig de la població. Ens referí unes observacions d'*Apus melba*, entrant i sortint de les façanes d'edificis prop de la cèntrica via de la Diagonal a Barcelona ciutat, que per la data podrien tractar-se de parelles reproductores.

Pel que fa al motiu de la nostra nota, la primera dada de possible cria del Ballester en edificacions humanes, l'efectuàrem a Rajadell (Bages). Dos exemplars entren i surten repetidament d'una esclatxa de la façana de l'església. L'observació fou efectuada el 9.06.1979.

Dades segures de cria les obtinguérem a l'estiu de 1981, al sud de la comarca, en el terme de Castellbell i el Vilar. En un pont sobre el riu Llobregat trobarem una colònia d'*Apus melba* amb un mínim de quinze parelles reproductores. Segons comentaris de M. Puigdemívol, la colònia s'instal·là quatre anys enrera, el 1977. Els nius estan repartits per sota les arcades del pont que miren a migdia, però es concentren en un dels extrems on hi ha una esclatxa grossa. Veure'ls a la zona és habitual i enguany se n'observaren inclús fins al setembre, quan presumiblement es tractava de migrants en trànsit.

No gaire lluny del riu, una zona amb cingles presenta la colònia més gran de les rodalies, estimada en un mínim de 25 parelles, per bé que la inaccessibilitat i intrincada situació dels nius, dificulta aquesta apreciació. Aquesta colònia és coneguda de fa anys. S'ha argumentat que la manca de zones acinglerades (principalment calcàries i fortament asolellades) propiciaria l'emplaçament dels nius en edificacions humanes. Caldria considerar la possibilitat que la colònia de Castellbell derivés de la del cingle en el devenir expansiu de l'espècie, per manca de rocams favorables a les rodalies o per superpoblació de la mateixa.

ANTONI BORRÀS i HOSTA

JOSEP ESCALES i PELLICER

Grup Autònom de Manresa de la ICHN

Universitat Politècnica. Manresa.