

que era la mateixa cosa en dos estats larvaris, ço és, primera larva, exàpoda, més blanca, i segona, nimfal, oetòpoda, més groga, però després se n'ha fet una separació específica: la primera, de groc taronja en tots els estadis, viu en els femers, i es fixa en les larves dels insectes que hi nien; la segona és blanca i viu en el llimac o cargol. Aquesta és una espècie cosmopolita i que no ocasiona la més petita molèstia al seu client per tal com s'ha de considerar simplement com a comensal. — A. CODINA.

Sur quelques Collemboles de Pozuelo de Calatrava (Ciudad-Real, Espagne). J. R. DENÍS (Banyuls s. mer). Boletín de la Sociedad Entomológica de España. T. XIII, Junio-Octubre de 1930, n.º 6-8, pp. 82-98 (figs. 1-9, 10-13), Zaragoza.

Els colombolels saltan, i d'un bot es van posant, ací a l'altura dels de les nacions veïnes, degut a no haver mancat material ni estudiosos de dintre i forans que se n'ocupen, mercès, en part, a la diligència dels qui procuren, com ara, en províncies, enaltir les nostres coses. En l'article, ultra una espècie i forma noves, de la Mancha, acompanyades d'extensa bibliografia i clau analítica, l'autor abunda en una llista dels treballs que concerneixen especialment la fauna espanyola amb una sinopsi per a la determinació de les espècies molt pràctica. — A. CODINA.

Cecidia nova seu quae hucusque in Peninsula Ibérica non innotuerant. Prof. Joaquim da SILVA TAVARES. "Brotèria" Sèrie Zoològica, vol. XXVI-1930, fasc. 11 (Publicado a 1 de Octubre) pp. 69-96. Lisboa. L'autor, incansable per tenir al dia l'estudi de les Cecídies que li comuniquen, descriu ara les novetats gallegues, castellanès, basques, aragoneses, valencianes, catalanes i portugueses rebudes entretant. Pel que afecte Catalunya, trobem com himenòptero-cecidies l'*Andricus Villarrubiae*, n. sp. de Balenyà (Vich-Barcelona) en *Quercus Robur* L., és notable, és una Cinipidocecidia dins d'una Cinipidocecidia de *Cynips coriariae* HAYMH. de la fàcia com una ampolla està ficada en una garrafa per tal que no es malmeti amb el transport. *Callirhytis Villarrubiae* n. sp., Torrellebrera, Balenyà, cecidia en forma de barril, adés isolada adés agrupada en 4-5, sota les fulles de *Quercus Tozae* Bosc, és la quarta espècie europea coneguda. *Cynips polycera* Gir. (Tipus) en *Quercus Robur* L. de les Guàrdies (Seva-Barcelona). En Dipterocecidies hi ha *Lasioptera eryngii* Vallot de la Garrotxa (San Aniol de Finestres-Girona) en *Eryngium* sp. *Perrisia capitigena* Breuni en *Euphorbia Cyparissias* L. de Ribera de Cardós (Pallars-Lleida), *Perrisia lithospermi* H. Low. en *Lithospermum* sp. de la Comarca de Vich.

Oligotrophus Solmsii KIEFF. en *Viburnum Lantana* L. de Seva. *Cecidomyidarum*, sp. n. en *Ephedra fragilis* DESF. (Cornicabra) de Barcelona. *Cecidomyidarum* sp. en *Knautia arvensis* COULT. de Catalunya. — A. CODINA.

Os Cynípides da Península Ibérica. Prof. Joaquim DA SILVA TAVARES. "Brotéria" Sèrie Zoològica, Vol. XXVI-1930 Fase. 11. (Publicado a 1 de Octubre) pp. 49-53. Lisboa. Amb el *Dryocosmus australis* MAYR. de la Europa meridional i que a Catalunya hi ha cites de Terrassa, Montseny, Gualba, Hostalets de Bas, acaba, com la última paraula de tant preclar mestre, en l'estudi de les nostres Cinípidocecidies. — A. CODINA.