

# ANOMALÍA D'ORIGEN DE LES ARTERIES TIROIDEA INFERIOR DRETA I VERTEBRAL ESQUERRA

per

J. BASSEDAS

Vosaltres sabeu com són nombroses les anomalies en el cos humà i el valor científic que té la seva interpretació. «Deixeu-me recollir i aplegar en un sol les anomalies totes observades en el cos humà i us faré un ser ben allunyat de l'home», deia Buffon; en la llum que en sorgeix Lamarck i Darwin hi han fonamentat tota una doctrina sobre l'origen de l'home. Cal, doncs, buscar-les, recollir-les i estudiar-les sempre.

Si no són freqüents, són nombroses, les varietats que es troben en l'origen, trajecte i distribució dels vasos pròxims al cor. N'hi ha algunes que són reproducció de disposicions d'espècies inferiors en l'escala zoològica: no les esmentaré ni tan sols, puix em portarien molt lluny.


La vertebral i la tiroidea inferior són dues artèries que neixen comúment de la subclàvia en sa primera porció; són les dues col·laterals que s'anomenen ascendents. La vertebral acostuma a ser la que neix més aprop de la línia mitja; a voltes surt d'un tronc comú junt amb la tiroidea inferior, la mamària interna o una cervical; en



alguna ocasió se l'ha vist eixir de la caròtida, del tronc braqui-cefàlic i fins de la mateixa aorta (raríssimament) ja entre el tronc braqui-cefàlic i la caròtida primitiva esquerra, ja entre aquesta i el tronc braquial esquerra. Vet-aquí en la pessa que tinc el gust de presentar-vos, un cas d'aqueixos raríssims que es pot afegir a la literatura.

L'origen i trajecte normals de la arteria tiroidea inferior que en la preparació aquí present feta per l'intern Sr. Rojas, poden veure, se modifiquen. L'origen pot tenir lloc unes vegades junt amb la vertebral (com deia més amunt), i altres, més freqüents, junt amb una cervical, constituint el tronc tiro-cervical; també pot néixer isolada del tronc braqui-cefàlic, de l'aorta, de la tiroidea del cantó contrari (venint aleshores a ocupar son lloc passant per darrera de l'esofag). El seu calibre pot ésser reduït. A voltes fins no existir i en aquest cas pot ésser suplerta totalment o parcialment per una altra tiroidea que per raó de sa topografia reb el nom de *mitja* o de Neubauer. En la pessa anatòmica que contempleu se conserva la tiroidea inferior dreta reduïda, pero, a un calibre insignificant i agotant-se a poc de sa neixença; en canvi veieu una tiroidea de Neubauer robusta, que neix de la cara anterior del tronc braqui-cefàlic a un centímetre devall de la bifurcació del mateix i dirigint-se cap a dalt i enrera fins a trobar la tràquea, i ascendint pel seu devant, gairebé per la línia mitja fins a trobar el cos tiroides.

*Departament anatòmic. Hospital de la Santa Creu.*



*a.* Pulmonar amb les seves branques. — *b.* Crossa aòrtica. —  
*c.* Tronc braqui-cefàlic. — *d.* Caròtida primitiva esquerra. —  
*e.* Vertebral esquerra anòmala. — *f.* Tronc braquial esquerre.  
— *g.* Caròtida primitiva dreta. — *h.* Tronc braquial dret. —  
*i.* Tiroidea inferior rudimentaria. — *l.* Vertebral dreta nor-  
mal. — *m.* Tiroidea de Neubauer. — *p.* Mamaria interna. —  
*q.* Intercostal superior.