

En esmentar les espècies trobades pels Srs. ESPAÑOL, VENTALLÓ i VILARRÚBIA donarem la sinonímia amb què són citades en el treball de BOFILL i POCH i HAAS i farem les reflexions que la troballa llur ens suggereixi.

1. *Eobania vermiculata* (Müll.) — Lés, un sol exemplar: aquesta espècie, no citada a la Vall d'Aran per BOFILL i HAAS i de distribució eminentment circummediterrània, cal tornar-la a trobar, ja que potser ha estat importada accidentalment.

2. *Cepaea nemoralis* (L.) = *Tachea nemoralis* L. — Lés, 29 exemplars, 12 de la forma típica amb les cinc faixes, 3 de la varietat *libellula* Risso, i 4 amb diverses combinacions de faixes.

3. *Cepaea hortensis* (Müll.) = *Tachea hortensis* Müll. — Lés, 3 exemplars: BOFILL i POCH i HAAS creien que GOURDON i FAGOT havien pres per *hortensis* exemplars de *nemoralis* amb el llavi blanc. La forma i les dimensions i la fàcies general basten per a determinar l'espècie sense necessitat de recórrer a examinar la forma del dard que discrimina perfectament ambdues espècies.

4. *Helicigona lapicida lapicida* (L.) = *Chilotrema lapicida lapicida* L. — Lés, 1 exemplar.

5. *Fruticicola hispida* (L.) — Lés, 1 exemplar.

6. *Monacha incarnata* (Müll.) — Lés, 7 exemplars. Aquesta espècie és nova, no solament per a la Vall, sinó també per a tot Catalunya, car F. HAAS, en l'obra ja citada no la porta entre les espècies pròximes. Els exemplars estudiats són exactament com els trobats als Pirineus cantàbrics i estudiats per BOFILL i HAAS (Naranco, Avilés, Covadonga).

7. *Hygromia limbata* (Drap.) — Lés, 4 exemplars.

8. *Helicella ericetorum* (Müll.) = *Xerophila ericetorum* Müll. — Lés, 15 exemplars, tots ells clarament *ericetorum* sense cap caràcter semblant a *nubigena* Charp.

9. *Clausilia dubia gallica* (Bgt.) = *Kuzmicia dubia* Drap. — Lés, 1 exemplar. Creiem que *gallica* Bgt. és la forma local de *dubia* Drap. que hom troba a tots els Pirineus.

10. *Clausilia parvula parvula* Stud. — Lés, 1 exemplar. Espècie no citada fins ara amb aquesta denominació de la Vall d'Aran; potser confosa amb alguna forma de *rugosa* Drap.?

11. *Clausilia rugosa oreina* Käuf. — Lés, 3 exemplars. Les *Clausilia rugosa* Drap., *pyrenaica* Charp. i *abietina* Dup., citades per BOFILL i POCH i HAAS deuen referir-se a *rugosa oreina* Käuf.

12. *Zebrina detrita* (Müll.) — Arties, 1 exemplar sota una pedra. GOURDON dona aquesta espècie com trobada entre la Bordeta i Viella, i FAGOT diu que l'exemplar fou trobat a la carretera en un raïm, i per això BOFILL i HAAS no inclouen aquesta espècie en llur fauna malacològica. La troballa d'un altre exemplar sota una pedra i en una altra localitat fa creure que viu realment a la Vall.

13. *Abida pyrenaearia* (Mich.) = *Modicella pyrenaearia* Boub. — Salardú, 2 exemplars.

14. *Chondrina avenacea farinesi* (Des Moul.) = *Modicella avenacea* Brug. — Salardú, 1 exemplar.

15. *Ancylus fluviatilis* Müll. = *Ancylus simplex* Buch. — Lés, 6 exemplars.

Poques són les espècies trobades, i, malgrat llur escàs nombre, n'hi ha una, *Monacha incarnata* Müll., nova per a la malacofauna catalana, 4 de noves per a la fauna de la Vall (*Eobania vermiculata* Müll., *Cepaea hortensis* Müll., *Monacha incarnata* Müll., i *Clausilia parvula parvula* Stud.). Una altra de notable és *Zebrina detrita* Müll., l'existència dubtosa de la qual a la Vall sembla ésser del tot confirmada.

La faunula local de Lés passa de 3 a 13 espècies; la d'Arties és augmentada amb *Zebrina detrita* (Müll.), i la de Salardú amb *Abida pyrenaearia* (Mich.) i *Chondrina avenacea farinesi* (Des Moul.).

Són resultats prou notables per a una excursió de recollecció no malacològica. Cal, doncs, preveure algunes altres excursions dirigides més principalment a investigacions sobre la malacofauna de la Vall d'Aran.

*Laboratori de Malacologia del Museu
de Ciències Naturals*